

Handwritten: 1901-1940

Separat-Abdruck aus dem XXVI. Bande
der
ANNALEN
des
k. k. Naturhistorischen Hofmuseums.

WIEN, 1912.

Alfred Hölder,

k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler
Buchhändler der kais. Akademie der Wissenschaften
I., Rotenturmstraße 13.

1901-1940

602

945

1166

1194

1478

Schedae ad «Kryptogamas exsiccatas»

editae a Museo Palatino Vindobonensi.

Auctore

Dre. A. Zahlbruckner.

Centuria XX.

Unter Mitwirkung der Frau Lily Rechinger und der Herren J. A. Bäumler, Dr. E. Bauer, J. Baumgartner (Muscī), Prof. Fr. Blechschmidt, Abate J. Bresadola, Prof. Dr. V. F. Brotherus, Prof. Dr. Fr. Bubák, Dr. A. v. Degen, Dr. F. Filárszky, M. Fleischer, Dr. St. Györffy, Prof. Dr. H. H. Gran, Dr. H. E. Hasse, Prof. D. A. C. Herre, Prof. Dr. F. v. Höhnelt, Prof. Dr. L. Hollós, † J. Jack, Dr. K. v. Keißler (Fungi), G. Lång, Prof. K. Loitlesberger, Prof. Dr. P. Magnus, W. A. Maxon, Dr. G. Moesz, Prof. G. v. Nießl, F. Pfeiffer v. Wellheim, Prof. Dr. M. Raciborski, Dr. K. Rechinger (Algae), Dr. H. Rehm, H. Sandstede, † Dr. K. Schiedermayr, Prof. Dr. V. Schiffner, Dr. J. Schiller, Dr. C. Schliephacke, Prof. J. Schuler, † J. Sikora, Hofrat Dr. Fr. Steindachner, Prof. Dr. J. Steiner, Dr. S. Stockmayr, P. P. Strasser, P. Sydow, Prof. Dr. J. Tuzson, J. Vleugel, Dr. A. Zahlbruckner (Lichenes)

herausgegeben

von der botanischen Abteilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums
in Wien.

Fungi (Decades 74—77).

✓ 1901. *Ustilago bromivora*.

Fisch. de Waldh., Aperçu syst. Ustilag. Paris (1877), p. 22; Winter apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. I, Bd. I (1884), p. 91; Sacc., Syll. fung., vol. VII/2 (1888), p. 461. — *Ustilago Carbo* var. *vulgaris* a. *bromivora* Tul. in Ann. sc. natur., Botan., sér. III, T. VII (1847), p. 81.

Hungaria: in floribus *Bromi sterilis* L. ad collem «Gellérthegy» prope Budapest, m. Jun.

det. F. Bubák.

leg. J. Tuzson.

✓ 1902. *Uromyces Lespedezae-procumbentis*.

Lagerh., Ured. Herb. El. Fries in Tromsø Mus. Aarsh., vol. XVI, 1893 (1894), p. 194; Sydow, Monogr. Ured., vol. II (1910), p. 108. — *Puccinia Lespedezae-procumbentis* Schw., Syn. Fung. Carol. super. (1822), p. 73, nr. 497. — *Puccinia Lespedezae-polystachyae* Schw., l. c., n. 73, nr. 498. — *Uromyces Lespedezae* Peck in Ellis, North

Americ. Fungi, nr. 245 (1879); Sacc., Syll. Fung., vol. VII/2 (1888), p. 549. — *Uredo Lespedeziae* Thuem. in Mycoth. univ., nr. 643 (1877). — *Aecidium leucostictum* Berk. et Curt. in Grevillea, vol. III (1874), p. 61; Sacc., Syll. Fung., vol. VII/2 (1888), p. 787.

America borealis (United States, N. Y.): ad folia *Lespedezae* spec. prope Ithaca, m. Oct. leg. P. Magnus.

1903. *Uromyces Hedysari-obscuri*.

Carestia et Piccone in Erb. critt. ital., ed. II, fasc. IX, nr. 447 (1871); Bubák, Pilzfl. Böhm., 1. T. Rostpilze in Arch. naturw. Landesdurchf. Böhm., Bd. XIII, nr. 5 (1908), p. 42; Sydow, Monogr. Ured., vol. II (1910), p. 99. — *Puccinia Hedysari-obscuri* DC., Synops. (1806), p. 46. — *Uredo Hedysari-obscuri* DC. et Lam., Fl. franç., vol. VI (1815), p. 64; Duby, Bot. Gall., vol. II (1830), p. 897. — *Uromyces Hedysari* Fuck., Symb. mycol., Nachtr. III (1875), p. 15; Sacc., Syll. Fung., vol. VII/2 (1888), p. 560. — *Uromyces Haßlinskii* De Toni in Sacc., Syll. Fung., vol. VII/2 (1888), p. 565. — *Uromyces borealis* Peck in Botan. Gaz., vol. VI (1881), p. 276; Syll. Fung., vol. VII/2 (1888), p. 561.

Helvetia: ad folia viva *Hedysari obscuri* L., Fextal in valle Engadin, m. Aug. leg. P. Magnus.

1904. *Puccinia Thwaitesii*.

Berk. in Journ. Linn. Soc., vol. XIV (1873), p. 91; Sacc., Syll. Fung., voll. VII/2 (1888), p. 720; Racib., Paras. Alg. u. Pilze Javas, pars I (1900), p. 21; Sydow, Monogr. Ured., vol. I (1904), p. 233. — *Puccinia Thwaitesii* Berk. var. *novo-guineensis* P. Henn. in Engl., Botan. Jahrb., Bd. XV (1892), p. 5; Sacc. Fung., vol. XVI (1902), p. 301; Sydow, Monogr. Ured., vol. I (1904), p. 233. — Exsicc.: Racib., Crypt. paras. Java, nr. 27.

Insula Java: ad folia *Justiciae Gendarussae* L. in horto botanico Buitenzorgensi, autumno. leg. F. de Höhnelt.

1905. *Peniophora obscura*.

Bresad., Hym. Hung. Kmet. in Atti R. Acc. Sc. e Lett. e Arti Agiati Rovereto, sér. III, T. III (1897), p. 113; Höhn. et Litschauer, Z. Kenntn. d. Cortic. II in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 116, Abt. 1 (1907), p. 784 et 791. — *Thelephora obscura* Pers., Mycol. eur., vol. I (1822), p. 146. — *Corticium obscurum* Fries, Hymen. Europ. (1874), p. 653; Sacc., Syll. Fung., vol. VI (1888), p. 624. — *Peniophora Ellisii* Massee in Journ. Linn. Soc., vol. 25 (1889), p. 144. — Exsicc.: Ellis and Everh., Fungi Columb. exs., nr. 611. — Ellis, North Amer. Fungi, sér. I, Nr. 606 sec. v. Höhnelt (pro *Stereo papyrino* Mont.) et sér. II, nr. 3209 sec. v. Höhnelt (pro *Peniophora Ellisii* Massee).

Austria inferior: ad corticem siccum *Abietis pectinatae* DC. in monte Sonntagberg prope Rosenau, vere.

det. v. Höhnelt.

leg. P. P. Strasser.

1906. *Gloeocystidium polygonium*.

v. Höhn. et Litschauer, Österr. Cortic. in Wiesner-Festschr. (1908), p. 69. — *Thelephora polygonia* Pers. apud Fries, Syst. mycol., vol. I (1821), p. 444. — *Corticium polygonium* Pers., Tent. dispos. fung. (1797), p. 30; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. I (1884), p. 332; Sacc., Syll. fung., vol. VI (1888), p. 627.

Austria inferior: ad ramos siccos *Betulorum* (?), in monte Sonntagberg prope Rosenau, m. Apr.
det. v. Höhnelt. leg. P. P. Strasser.

✓ **1907. Polystictus microloma.**

Leveill. in Ann. sc. natur., Botan., sér. III, T. 2 (1844), p. 183; Sacc., Syll. Fung., vol. VI (1888), p. 221.

«Forma ad *P. carneo-nigrum* Berk. transiens.»

Madagascaria: ad truncos prope Antananarivo.
det. Bresadola.

leg. J. Sikora.

✓ **1908. Fomes subferreus.**

Murr. in North Amer. Fl., vol. IX (1908), p. 97 et in Mycologia, vol. II (1910), p. 194.

America (Insula Cuba): ad truncos arborum in montibus prope Jaguey (province of Oriente), altitud. 460 m s. m., m. Apr. (coll. nr. 4234). leg. W. R. Maxon.

✓ **1909. Ganoderma (Amauroderma) Sikorae.**

Bres. n. sp.

Pileo suberoso, tenui, laterali, subreniformi, lobato, ruguloso, concentrice subsulcato, castaneo fusco, cute crustacea, opaca, glabra tecto, $2\frac{1}{2}$ —4 cm lato, contextu fulvello, 1—2 mm crasso ex hyphis, intertextis ex parte crasse tunicatis et ex parte tenuibus et irregularibus, 2—10 μ , conflato; tubulis concoloribus, 2—3 mm longis; poris subpentagonis, demum fuscescentibus, 6—7 pro mm; stipite laterali, verticali pileo concolori, cute opaca tecto, radicato, intus fulvello, 6—10 cm longo, 3—5 mm crasso; sporis luteis, subglobosis, interdum angulatis, laevibus, 9—10 = 8—9 μ ; hyphis contextus tubulosum crassa tunicatis, luteis, 2—10 μ crassis.

Madagascaria: ad truncos prope Antananarivo.
Ganodermati praeterviso Pat. proximam.

leg. J. Sikora.
Bresadola.

✓ **1910. Trametes avellanea.**

Bres. n. sp.

Pileo applanato, suberoso-coriaceo, suborbiculari, basi effusa adnato, e pubescente glabrato, zonato-subsulcato, subruguloso, postice tuberculoso, luride avellaneo, 8—9 cm lato, 4—4 $\frac{1}{2}$ cm longo, basi 2—3 cm effusa, substantia luride isabellina, 3—4 mm crassa, ex hyphis homogenis 2—4 μ crassis conflata; tubulis concoloribus, 2—3 mm longis; poris pallidis, subpentagonis, 4—5 pro mm; sporis non visis; hyphis contextus hymenii, homogeneis, stramineis 1 $\frac{1}{2}$ —3 raro 4 μ crassis.

Madagascaria: ad truncos.

Trameti aphanopodae Reichardt affinis.

leg. J. Sikora.
Bresadola.

✓ **1911. Merulius lacrymans.**

Wulf. apud Fries, Syst. mycol., vol. I (1821), p. 328; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. I (1884), p. 394; Sacc., Syll. Fung., vol. VI (1888), p. 419.

Stiria: ad trabes doliarum (del.) in Aussee, m. Aug.

leg. C. Rechinger.

✓ **1912. Lenzites Palisoti.**

Fries, Syst. mycol., vol. I (1821), p. 335 et Epicr. syst. mycol. (1836—1838), p. 404; Sacc., Syll. Fung., vol. V (1887), p. 650. — *Daedalea amanitoides* Palis., Fl.

Owar. et Ben., vol. I (1804), p. 44, Tab. 25. — Icon.: Fries, Fungi Guin., Tab. XI, Fig. 23.

Madagascaria: ad truncos prope Antananarivo.
det. Bresadola.

leg. J. Sikora.

✓ 1913. *Lepiota procera*.

Sacc., Syll. Fung., vol. V (1887), p. 27. — *Agaricus procerus* Scop. apud Fries, Syst. mycol., vol. I (1821), p. 20; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., Abt. 1, Bd. 1 (1884), p. 842.

Hungaria: in silvaticis «Kamaraerdő» ad Budapest, m. Sept.

leg. F. Filárszky.

✓ 1914. *Geaster Schmideli*.

Vittad., Monogr. Lycoperd. in Mem. d. Real. Accad. Torino, ser. II, vol. V (1842), p. 157, Tab. I, Fig. 7; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. I (1884), p. 910; Sacc., Syll. Fung., vol. VII/1 (1888), p. 76. — *Geaster nanus* Hollós, Gasteromyc. Ung. (1904), p. 55 u. 152, Tab. IX, Fig. 7—11; Petri in Fl. ital. crypt., pars I, Fungi (1909), p. 76. — *Geastrum nanum* Pers., Mém. in Journ. de Botan., Tom. II (1809), p. 27, Tab. II, Fig. 3. — *Geaster Rabenhorstii* Kunze apud Rabenh., Fungi eur., Nr. 2011 (1875).

Hungaria: in arenosis dictis «Nyir» prope Kecskemét, m. Sept.

leg. L. Hollós.

Da nach den Bestimmungen des Internationalen botanischen Kongresses Brüssel 1910 Fries, Syst. mycologicum (1821—1832) als Ausgangspunkt für die Nomenklatur der Pilze anzusehen ist, kann die von Hollós auf Grund des Persoonschen Namens *Geastrum nanum* (1809) vollzogene Namensänderung in *Geaster nanus* nicht aufrecht erhalten werden, sondern muß der Vittadinische Name «*G. Schmideli*» in Verwendung kommen.

Keißler.

✓ 1915. *Geaster Bryantii*.

Berk., Outl. (1860), p. 300; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. I (1884), p. 911; Sacc., Syll. Fung., vol. VII/1 (1888), p. 75; Hollós, Gasteromyc. Ung. (1904), p. 53 u. 151, Tab. IX, Fig. 1—4; Petri in Fl. ital. crypt., pars 1, Fungi (1909), p. 85, Fig. 47. — *Tylostoma atrum* Bolla in Mathem. Természettud. Közlem., vol. 12 (1876), p. 132. — *Geaster orientalis* Hazsl. in Grevillea, vol. VI (1878), p. 108, Tab. 98, Fig. 15. — *Geaster Rabenhorstii* Kunze β *orientalis* Hazsl. in Mathem. Természettud. Közlem., vol. XV (1878), p. 9. — *Geaster Bryantii* Berk. var. *minor* Berk. apud Masee, Brit. Gasteromyc. (1889), p. 78.

Hungaria (comit. Pest): in *Robinetis* prope Félegyháza, ad «Szent Kút», m. Aug.

leg. L. Hollós.

✓ 1916. *Myriostoma coliforme*.

Cordea, Anleit. Stud. Mykol. (1842), p. LXXXI + 105, Tab. D 43, Fig. 16—17; Hollós, Gasteromyc. Ung. (1904), p. 46 et 149, Tab. VII, Fig. 1—10, Tab. VIII, Fig. 8, Tab. XXIX, Fig. 18. — *Geaster coliformis* Fries, Syst. mycol., vol. III/1 (1829), p. 12; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. I (1884), p. 909; Sacc., Syll. Fung., vol. VII/1 (1888), p. 73; Petri in Fl. ital. crypt., pars 1 (1909), p. 88, Fig. 1, 2.

Hungaria: in *Robinetis* prope Kecskemét, m. Nov.

leg. L. Hollós.

✓ 1917. *Sphaerotheca tomentosa*.

Oth., Fünft. Nachtr. Schweiz. Pilze in Mitteil. Naturf. Gesellsch. Bern (1865), p. 168; Sacc., Elench. fung. nov. in Hedwigia, Bd. 35 (1896), p. XXIII et Syll. Fung., vol. XIV (1899), p. 462; D. Sacc., Contrib. Fl. Schemnitz. in Atti Soc. Venet.-Trent. Padova, sér. II, T. III (1897), p. 184, Tab. V, Fig. 1. — *Erysiphe gigantiasca* Thüm. et Sorok. in Thüm., Mycoth. univ., nr. 645 (1877); Sacc., Syll. Fung., vol. I (1882), p. 18. — *Sphaerotheca gigantiasca* Bäuml. apud Rehm in Hedwigia, Bd. 30 (1891), p. 261 et Beitr. Crypt.-Fl. Preßburg, Pilze in Verhandl. Ver. Natur- u. Heilk. Preßb., N. F., Heft 9 (1897), p. 132, nr. 1110. — Exsicc.: Thüm., Mycoth. univ., nr. 645; Rehm, Ascom. exs., nr. 1049.

Hungaria (comit. Pozsony): ad folia viva *Euphorbiae palustris* L., in silva «Schurwald» prope Szt. György, m. Sept.
leg. J. A. Bäumler.

✓ 1918. *Stigmatea Pongamiae*.

Racib., Parasit. Alg. u. Pilze Javas, fasc. III (1900), p. 96; Sacc., Syll. Fung., vol. XVI (1902), p. 479.

Insula Sundaicae: ad folia viva *Pongamiae glabrae* Vent. in insula Noesa Kam-bangan.
leg. Dr. M. Raciborski.

✓ 1919. *Sphaerella innumerella*.

Karst., Fungi Fenn. exs., nr. 965 sec. Karst., Mycol. Fenn., pars II (1873), p. 182; Sacc., Syll. Fung., vol. I (1882), p. 506; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. I (1887), p. 370. — *Mycosphaerella innumerella* Schröt. apud Cohn, Kryptfl. v. Schles., Bd. III/2, Pilze (1893), p. 337. — *Sphaerella maculaeformis* f. *Comari palustris* Rabenh., Fungi Europ., ed. II, nr. 1042 (1856).

Hungaria (comit. Háromszék): in foliis emarcidis *Comari palustris* in consocio speciei *Stilbacearum* indeterminatae, in turfosis «Retyi Nyir», m. Maio.

leg. G. Moesz.

Ich behalte den Genusnamen «*Sphaerella*» bei, nachdem einerseits die Umtaufung der zahlreichen *Sphaerella*-Arten in «*Mycosphaerella*» eine sehr mißliche Sache ist, anderseits der Gattungsnamen «*Sphaerella*» auf algologischem Gebiete ohnedies gegenwärtig nicht mehr zu Recht besteht. In neuester Zeit setzt sich wieder W. B. Grove für die Einführung des Namens «*Mycosphaerella*» ein (vgl. dessen Aufsatz *Sphaerella* v. *Mycosphaerella* in Journ. of Botany, vol. 50 [1912], p. 89).
Keißler.

✓ 1920. *Gnomonia leptostyla*.

Ces. et De Not., Schema Sfer. in Comm. Soc. Crittog. Ital., vol. I, pt. IV (1863), p. 235; Sacc., Syll. Fung., vol. I (1882), p. 568; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. 1 (1885), p. 580.

Hungaria: ad folia putrida *Juglandis regiae* L. in horto ad Pozsony, m. Febr.
leg. J. A. Bäumler.

✓ 1921. *Rebentischia unicaudata*.

Sacc., Syll. Fung., vol. II (1883), p. 12; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. II (1887), p. 439. — *Sphaeria unicaudata* Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist., sér. II, vol. IX (1852), p. 383, Tab. 11, Fig. 31.

Stiria: ad ramulos siccos *Clematidis Vitalbae* L. prope Graz, m. Aug.

leg. G. de Nießl.

✓ 1922. *Eutypa Acharii*.

Tul., Sel. Fung. Carpol., vol. II (1863), p. 53; Sacc., Syll. Fung., vol. I (1882), p. 163. — *Sphaeria Eutypa* Fries, Syst. Mycol., vol. II/2 (1823), p. 478. — *Valsa Eutypa* Nitschke, Pyren. Deutschl. (1870), p. 130; Winter apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. II (1887), p. 674.

Austria inferior: ad ramos siccos *Aceris pseudoplatani* L. in monte Sonntagberg prope Rosenau. leg. P. P. Strasser.

✓ 1923. *Phacidium infestans*.

Karst., Symb. mycol. Fenn. XIX in Medd. Soc. Fauna Flora Fenn., vol. XIV (1887), p. 87; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1889), p. 714.

Suecia: ad acus *Pini silvestris* L. prope Umeå, m. Nov.

leg. J. Vleugel, comm. F. Bubák.

✓ 1924. *Coccophacidium Pini*.

Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. III (1888), p. 98. — *Phacidium Pini* Fries, Syst. Mycol., vol. II/2 (1823), p. 573. — *Coccomyces Pini* Karst., Mycol. Fenn., pars I (1871), p. 254; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1889), p. 748.

Hungaria (comit. Pozsony): ad ramos *Pini Strobi* L. in horto urbis Pozsony, hieme.

leg. J. A. Bäumler.

✓ 1925. *Ocellaria ocellata*.

Schröt. apud Cohn, Kryptfl. v. Schles., Bd. III/2, Pilze (1893), p. 153; Magn. in Kerner, Schedae ad fl. exs. austro-hung. IX (1902), p. 137, nr. 3567. — *Stictis ocellata* Fries, Syst. mycol., vol. II/1 (1822), p. 193. — *Habrostictis ocellata* Fuck., Symb. Mycol., Nachtr. I (1869), p. 326. — *Propolis ocellata* Sacc., Fungi Ital. Delin. (1882), p. 1407. — *Stictis Lecanora* Fries, Syst. Mycol., vol. II/1 (1822), p. 193. — *Ocellaria aurea* Tul., Sel. Fung. Carpol., vol. III (1863), p. 129; Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. III (1888), p. 134; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1889), p. 654.

Stiria: ad corticem ramorum siccorum *Salicis grandifoliae* Ser., in valle fluminis Enns dicto «Gesäuse» inter Gstatterboden et Johnsbach, m. Jun.

leg. C. de Keißler.

✓ 1926. *Tapesia fusca*.

Fuck., Symb. Mycol. (1869), p. 302; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1891), p. 374; Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. III (1891), p. 579. — *Peziiza fusca* Pers. apud Fries, Syst. Mycol., vol. II/1 (1822), p. 109. — *Mollisia fusca* Karst., Mycol. Fenn., pars I (1871), p. 207. — *Phialea fusca* Gill., Champ. Franç., Discom. (1879), p. 113.

Austria inferior: ad ramulos putridos *Alni incanae* L. in insula Danubii (Donau) «Prater» prope Vindobonam (Wien).

leg. Dr. A. Zahlbruckner.

✓ 1927. *Helotium serotinum*.

Fries, Summa Veget. Scand., sect. poster. (1849), p. 355; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1889), p. 222; Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. III (1893), p. 781. — *Peziiza serotina* Pers. apud Fries, System. Mycol., vol. II/1 (1822), p. 119. — *Hymenoscypha serotina* Phill., Man. Brit. Discom. (1887), p. 125.

Hungaria: ad ramulos putridos *Fagi silvatici* L. prope Pozsony, autumnus.

leg. J. A. Bäumler.

✓ 1928. *Helotium sulphuratum*.

Phill., Man. Brit. Discom. (1893), p. 161; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1889), p. 226.
 — *Peziiza sulphurata* Schum. apud Fries, Syst. Mycol., vol. II/1 (1822), p. 72. — *Helotium epiphyllum* ♂ *acarium* Karst., Mycol. Fenn., pars I (1871), p. 123. — Exsicc.:
 Phill., Elv. Brit., nr. 189.

Stiria: ad acus putrescentes partim arena obtectas *Abietis excelsae* DC. ad lacum
 «Leopoldsteiner See» prope Eisenerz, m. Nov.

det. H. Rehm.

leg. C. de Keißler.

Nach Rehm sind die oben ausgegebenen Exemplare nur durch zitrongelbe
 Farbe und die nicht deutlich spindelförmigen Sporen von *H. sulphuratum* Phill.
 etwas abweichend. Keißler.

✓ 1929. *Sclerotinia baccarum*.

Rehm in Hedwigia, Bd. XXIV (1885), p. 9 et apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl.,
 2. Aufl., Abt. 1, Bd. III (1893), p. 807; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1889), p. 199. —
Rutstroemia baccarum Schröt. in Hedwigia, Bd. XVIII (1879), p. 177.

Sclerotium (sogenannte «weiße Heidelbeere»).

Stiria: ad baccas *Vaccinii Myrtilli* L. prope Landl ad Hieflau, m. Jul.

leg. C. de Keißler.

Anfangs Juli kann man neben den sich zur Reife anschickenden und schwarz sich
 färbenden Heidelbeeren eine größere Zahl solcher finden, die sich bläulichgrau ver-
 färben, schließlich fast weißlich werden und abfallen, worauf sie unter dem Einfluß
 des sich kräftig entwickelnden *Sclerotium* eine etwas schwärzliche Farbe annehmen.
 Vgl. Ascherson und Magnus, Die weiße Heidelbeere. Ber. deutsch. bot. Gesellsch.,
 Bd. 7 (1889), p. 10. Keißler.

✓ 1930. *Pyronema omphalodes*.

Fuck., Symb. Mycol. (1869), p. 319; Sacc., Syll. Fung., vol. VIII (1889), p. 107;
 Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. III (1894), p. 964. —
Peziiza omphalodes Bull. apud Fries, Syst. Mycol., vol. II/1 (1822), p. 73. — *Aleuria*
omphalodes Gill., Champ. France, Discom. (1879), p. 48, Pl. 51. — *Pyronema Marianum*
 Carus in Nova Acta Leopold., vol. XVII/1 (1835), p. 369, Tab. 27. — Icon.: Boudier,
 Icon. Fung., vol. II, Tab. 419.

Litorale austriacum: ad terram locis deustis in silva «Ternovaner Wald» supra
 Görz, m. Jun. leg. C. Loitlesberger.

✓ 1931. *Phoma minutella*.

Sacc. et Penz. in Michelia, vol. II (1882), p. 618; Sacc., Syll. Fung., vol. III (1884),
 p. 121; Allesch. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. VI (1899),
 p. 313. — *Phoma Meliloti* Allesch., Verz. Südbayern Pilze III in 12. Ber. Botan. Ver.
 Landshut (1892), p. 193; Sacc., Syll. Fung., vol. XI (1895), p. 488; Allesch. apud
 Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. VI (1899), p. 306.

Austria inferior: ad caules siccos *Meliloti officinalis* L., prope Edelstal, m. Apr.
 leg. C. Rechinger.

Sporen $4 \times 0.5 \mu$, jedoch meist gerade.

Keißler.

✓ 1932. *Phoma rubiginosa*.

P. Brun. in Act. Soc. Linn. Bordeaux, vol. LII (1897), p. 140; Sacc. et Sydow, Syll. Fung., vol. XIV (1899), p. 873; Allesch. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. VII (1903), p. 824.

Var. *maior*.

Sydow in Hedwigia, Bd. XXXVIII (1899), p. (136); Sacc. et Sydow, l. c., vol. XVI (1902), p. 860; Allesch., l. c.

Austria inferior: ad fructus siccos *Rosae caninae* L., prope Retz, m. Majo.

leg. C. Reehinger.

Sporen, wie angegeben, länglich, ca. $7-8 \times 3 \mu$ messend, ohne Öltropfen. Von Sydow auf Früchten von *Rosa inodora* bei Berlin beschrieben. Keißler.

✓ 1933. *Phyllosticta latemarensis*.

Kabát et Bubák in Österr. botan. Zeitschr., Bd. 55 (1905), p. 77; Sacc., Syll. Fung., vol. XVI (1906), p. 243; Bubák in Növény. Közlem., vol. VI (1907), p. 102 et (21).

Hungaria inferior: ad folia viva *Colchici pannonici* Gris. et Sch., in pratis ad cacumen montis Suskuluji ad confines Romaniae, m. Jun.

leg. J. Tuzson.

✓ 1934. *Septoria Kalchbrenneri*.

Sacc., Syll. Fung., vol. III (1884), p. 515; Allesch. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. IV (1900), p. 779. — *Septoria Euphorbiae* Kalchbr. in Hedwigia, Bd. IV (1865), p. 158 (nec Guep.). — *Septoria media* Sacc. et Brun. apud Brun., Champ. ajout. Fl. Saint. in Bull. de la Soc. Botan. France, Tom. XXXVI (1889), p. 339.

Hungaria (comit. Pozsony): ad folia viva *Euphorbiae palustris* L., in silva Schurwald prope Szt. György, m. Sept.

leg. J. A. Bäumler.

Nach den Angaben von Bäumler sind die Sporen gerade, gebogen oder hin- und hergebogen, $30-45 \times 2-2.5 \mu$ messend. Ganz ähnlich sind auch die Sporen von *S. media*, die Saccardo und Brunand, l. c., gleichfalls auf *Euphorbia palustris* beschreiben. Nach Bäumler befinden sich die Gehäuse in ausgebleichten Flecken, die erst hellrot, dann blutrot, endlich dunkel gesäumt sind. Bei *S. media* heißt es «Flecken braun, im Zentrum endlich weißlich, mit schwärzlich-blutrotem Saume». Nachdem also auch in der Beschaffenheit der Flecke ein markanter Unterschied nicht zu bestehen scheint, ziehe ich *S. media* Sacc. et Brun. als Synonym zu *S. Kalchbrenneri* Sacc.

Keißler.

✓ 1935. *Septoria Senecionis*.

Westend. in Bull. Acad. Royal Belg., T. XIX, part I (1852), p. 64 (sine descript.) et part III (1853), p. 120; Sacc., Syll. Fung., vol. III (1884), p. 549; Allesch. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. VI (1900), p. 854.

Stiria: ad folia viva *Senecionis sarracenici* L. in monte «Polster» prope Prebichl, 1300 m s. m., m. Julio.

leg. C. de Keißler.

Sporen ohne Querwände, während gewöhnlich drei bis vier undeutliche Querwände angegeben sind. Keißler.

1936. *Hendersonia vagans*.

Fuck., Symb. Mycol. (1869), p. 392; Sacc., Syll. Fung., vol. III (1884), p. 419; Allesch. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. VI (1901), p. 208. — *Hendersonia Piri* Fuck., Enum. Fung. Nassov. (1860), p. 50, nr. 415, Fig. 17.

Austria inferior: ad aculeos *Rosae caninae* L., in valle Irenental prope Tullnerbach in silva «Wiener Wald», m. Mart. leg. C. de Keißler.

Vorliegende Exemplare glaube ich am ehesten mit obigem Pilz identifizieren zu können, der sich durch seine länglichen Gehäuse und gelben Sporen auszeichnet, wie dies auch die hinausgegebenen Stücke (Sporen mit zwei bis drei Wänden, die ungleich sind, $12-14 \times 5-6 \mu$ messend) zeigen. *H. vagans* Fuck. wurde ursprünglich für *Pirus*, *Prunus*, *Sorbus* etc. angegeben, kommt aber nach Saccardo, Syll. Fung., vol. XII, p. 304 und vol. XIII, p. 1056 auch auf *Rubus* vor, was mich darin bekräftigt, meinen Pilz auf *Rosa* hieher zu ziehen, der allerdings nicht die von Fuckel erwähnten «sporidia longe-stipitata» besitzt (wahrscheinlich bleibt gelegentlich ein Stück des Sporenträgers an der Spore haften). Die übrigen für *Rosa* und *Rubus* beschriebenen *Hendersonia*-Arten stimmen durchwegs nicht auf den von mir gesammelten Pilz, da sie vor allem nie gelbe, sondern dunkler gefärbte Sporen besitzen, von deren Zellen gewöhnlich eine hyalin bleibt. Über Kulturversuche mit *Hendersonia*-Arten etc. vgl. die interessante Arbeit von E. Voges, Über die Pilzgattung *Hendersonia* in Bot. Zeit. (O.-A.), 1911, p. 87. Keißler.

1937. *Naemospora croceola*.

Sacc. in Michelia, vol. II (1880), p. 120 et Syll. Fung., vol. III (1884), p. 746; Allesch. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 1, Bd. VII (1902), p. 537. — Icon.: Sacc., Fungi Ital. Delin., nr. 1086.

Austria inferior: ad corticem *Quercuum* in monte Eichberg prope Purkersdorf (in silva «Wiener Wald»), m. Oct. leg. C. de Keißler.

1938. *Passalora bacilligera*.

Fries apud Fresen., Beitr. z. Myk., Heft 3 (1863), p. 93, Tab. XI, Fig. 55-58; Sacc., Fungi Ital. Delin. (1881), nr. 788 et Syll. Fung., vol. IV (1886), p. 345; Lindau apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Abt. 3, Bd. VIII (1907), p. 790. — *Cladosporium bacilligerum* Mont. et Fries in Ann. Sc. Natur., Botan., sér. II, Tom. VI (1836), p. 31, Tab. XII, Fig. 5.

Hungaria (comit. Pozsony): ad folia viva *Alni glutinosae* L. in valle Groß-Weidritztal ad Pozsony, m. Aug. leg. J. A. Bäumler.

Die meisten Autoren zitieren *Passalora bacilligera* Mont. et Fries in Ann. Sc. Natur., Botan., sér. II, Tom. VI (1836), p. 31. An dieser Stelle ist aber von einer Gattung *Passalora* nichts zu finden, sondern nur ein neues *Cladosporium*, *Cl. bacilligerum*, beschrieben. Die Gattung *Passalora* selbst wurde von Fries in Summa Veget. Scand., sect. poster. (1849), p. 500, aufgestellt, daselbst aber die Kombination *P. bacilligera* nicht gegeben, überhaupt keine Spezies angeführt. *P. bacilligera* erscheint das erstmal rechtsgültig publiziert in Fresenius, Beitr. z. Mykol. Keißler.

1939. *Diplococcium resinae*.

Sacc., Syll. Fung., vol. IV (1886), p. 374; Magnus apud Dalla Torre et Sarnth., Fl. v. Tir., Bd. III, Pilze (1905), p. 556; Lindau apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl.,

2. Aufl., Abt. 1, Bd. VIII (1907), p. 840. — *Dendryphium resinae* Corda, Icon. Fung., vol. VI (1854), p. 10, Fig. 29.

Austria inferior: ad resinam *Abietis excelsae* DC. in monte «Kleiner Wienerberg» prope Tullnerbach, m. Dec. leg. C. de Keißler.

Dieser Pilz wird von Lindau, l. c., für Böhmen (Corda), für den Sachsenwald bei Hamburg (Jaap), Thüringen (Jaap), Rhöngelbirge (Jaap, etwas abweichende Exemplare) und Tirol (Bail) angegeben. Nach meinen Beobachtungen scheint er im Wiener Wald sowie im Bereiche der nördlichen Kalkalpen und ihrer Vorberge in Österreich nicht selten auf Fichtenharz aufzutreten. An der Lokalität, von der hier dieser Pilz ausgegeben ist, habe ich die Wahrnehmung gemacht, daß das ausgeflossene Fichtenharz zunächst von dem Mycel *Sirococcus conorum* Sacc. et Roum. (vgl. das von mir für diese Exsikkaten gesammelte Exemplar nr. 1832) grünlich, dann schwärzlich verfärbt wird. Die Ausbildung der zugehörigen Pyknidengehäuse erfolgt von Dezember bis gegen Anfang März; es scheint sich also um einen typischen Winterpilz zu handeln. Sobald die Gehäuse von *Sirococcus* entleert sind und kollabieren, siedelt sich auf dem Harz das Mycel von *Diplococcium resinae* an, welches das von den Resten des Mycels von *Sirococcus* durchzogene Harz erst schmutzigbraun, später braun färbt. Die Ausbildung von Sporen erfolgt bei *Diplococcium* das ganze Jahr hindurch. Auf dem von *Diplococcium* befallenen Harz siedelt sich dann gelegentlich *Dendrostilbella baeymycioides* Lindau an (vgl. das von mir für diese Exsikkaten gesammelte Exemplar nr. 1838). Keißler.

✓ 1940. *Physoderma Schröteri*.

Krieger in Hedwigia, Bd. XXXV (1896), p. (144); Sacc., Syll. Fung., vol. XIV (1899), p. 447. — Exsicc.: Krieger, Fungi Saxon., nr. 546 (1890), ubi nomen nud.

Hungaria (comit. Fejér): ad scapos *Heleocharidis palustris* L. prope pagum Nadap, m. Jul.

det. G. Moesz.

leg. F. Filárszky.

Die von Krieger beschriebene Art dürfte sich kaum wohl als eigene Spezies von *Ph. Eleocharidis* Schröt. trennen lassen; sie stellt wohl nur eine Form derselben mit meist kleineren Flecken und etwas größeren Dauersporangien dar. Keißler.

Addenda:

✓ 602. *Peronospora calotheca*.

De Bary.

b) **Austria inferior:** ad folia *Asperulae odoratae* L. in silva Pfaffenwald prope Purkersdorf, m. Majo. leg. F. de Höhnelt.

✓ 945. *Polyporus sulphureus*.

Fries.

Mycelium.

a) **Austria inferior:** ad truncum *Pyri Mali* L. prope Kritzendorf, m. Nov.

leg. C. Rechinger.

✓ 1166. *Belonium pineti*.

Rehm.

b) **Germania** (Brandenburg): ad acus putrescentes *Pini silvestris* L. ad Sophientädt prope Ruhlsdorf in ditone Nieder-Barnim, m. Jul. leg. P. Sydow.

✓ 1194. *Fusarium heterosporum*.

Nees ab Esenb.

b) Hungaria (com. Pozsony); ad sclerotium *Clavicipitis purpureae* Tul. in spicis *Festucae giganteae* Vill. in valle Groß-Weidritzal prope Pozsony, m. Aug.
leg. J. A. Bäumler.✓ 1478. *Gloeosporium Tiliae*.

Oudem.

Var. *maculicolum*.

Allesch.

b) Austria inferior: ad folia viva *Tiliae parvifoliae* Ehrh. inter Rekawinkl et Finsterleithen in silva «Wiener Wald».
leg. F. de Höhnel.

Algae (Decas 29).

1941. *Oscillatoria princeps*.Vaucher, Histoire de Conferv. (1803), p. 190, Tab. XV, Fig. 2; Endlicher, Mantissa bot. altera, Suppl. III (1843), p. 13; Gomont, Monogr. des Oscill. (1894), p. 206, Tab. VI, Fig. 9; De Toni, Syllog. Algar., vol. V (1907), p. 150. — *Oscillaria maxima* Kütz., Phyc. Gener. (1843), p. 190; Idem, Phyc. German. (1845), p. 161; Idem, Tabul. Phycol., vol. I (1846), p. 32, Tab. XLIV, Fig. 11; Idem, Spec. Algar. (1849), p. 248. — *Lyngbya princeps* Hansgirg, Prodr. Algenfl. Böhmen II (1892), p. 119.Parce immixta: *Oscillatoria formosa* Gomont.Die vorliegende Form der *Oscillatoria princeps*, deren Dicke nach Gomont zwischen 16 und 60 μ schwankt, ist eine besonders kleine Quantitätsform, sie ist nur 13—14 μ breit. Der Mangel der Granula an den Scheidewänden charakterisiert *Oscillatoria princeps* und *Oscillatoria proboscidea*. Durch die geringe Fadendicke nähert sich unsere Form letzterer Spezies, aber die Form der Fadenenden ist ganz die für *Oscillatoria princeps* so charakteristische.

Austria inferior: in superficie fluminis «Kamp» prope Gars.

leg. C. de Keißler, det. S. Stockmayer.

1942. *Cymbella microcephala*.

Grunow in Cleve, Synops. of the Naviculoid Diatoms, vol. I, p. 160; Van Heurck, Synops. Diatom. (1880), p. 63, Tab. 3, Fig. 36—39; De Toni, Syll. Alg., vol. II (1891), p. 353.

Eine etwas größere, meist 25 μ , mitunter aber bis zu 34 μ lange Form.*Cymbella lanceolata* Ehrenb. in Cleve, Synops. of the Naviculoid Diatoms, vol. I, p. 174; Van Heurck, Synops. Diatom. (1880), p. 63, Tab. 2, Fig. 7.

Chromatophoren gebaut, wie es A. Schmidt, Atlas der Diatomeenkunde, Tab. 72, Fig. 22—24 zeigen.

Austria inferior: in paludibus rivi «Reisenbach» prope Unterwaltersdorf, m. Maio.

leg. et det. S. Stockmayer.

1943. *Myrionema strangulans*.Grev., Cryptog. Flora (1826), Tab. 300; Kütz., Spec. Algar. (1849), p. 540; De Toni, Syll. Alg., vol. III (1895), p. 399. — *Myrionema maculiforme* Kütz., Phyc.

German. (1847), p. 264; Idem, Tab. Phycol., vol. VII (1859), Tab. 93, Fig. 2. — *Myriomenema vulgare* Thuret in Le Jol. List. Alg. Cherb. (1880), p. 82 ex parte.

Dalmatia: *Ulvae Lactucae* Linné insidens in mari prope Spalato, m. Maio.

det. J. Schiller, com. F. Steindachner.

1944. *Sphacelaria tribuloides*.

Menegh., Alg. Italian. (1842), p. 336; Kütz., Spec. Algar. (1849), p. 464; Idem, Tabul. Phycol., vol. V (1855), Tab. 89, Fig. 2; De Toni, Syll. Alg., vol. III (1895), p. 502.

Istria: in mari adriatico prope Lussinpiccolo.

leg. J. Schiller.

1945. *Ectocarpus paradoxus*.

Mont. in Moris et de Notaris., Flor. Caprar. (1839), nr. 175, Tab. V, Fig. 1—3; Ardissonne, Phycol. Mediterr., vol. II (1886), p. 73; De Toni, Syll. Alg., vol. III (1895), p. 541. — *Ectocarpus caespitulus* J. Agardh, Alg. Mediterr. (1842), p. 26; Kütz., Spec. Alg. (1849), p. 455; Idem, Tab. Phycolog., vol. V (1855), Tab. 62, Fig. 2.

Dalmatia: in mari adriatico prope insulam Pelagosa.

leg. J. Schiller.

1946. *Phormidium tinctorium*.

Kütz., Tab. Phycol., vol. I (1845), p. 35, Tab. 49, Fig. 3; Idem, Spec. Algar. (1849), p. 255; Gomont, Monogr. (1894), p. 162, Tab. IV, Fig. 11 forma stratosae; De Toni, Syll. Algar., vol. V (1907), p. 218.

Die Lager sind zart und bilden tief dunkelgrüne Belege auf dem Grunde und an den Seitenwänden. Häufig lösen sich — wohl vornehmlich infolge des Gehaltes an Gasblasen — Stücke los und bilden in stilleren Ecken sich anhäufende, an der Oberfläche schwimmende Häute, welche in der Regel viel heller grün sind und denen auf der Unterseite reichlich eine gelbliche, lehmig-kotige Masse anhängt, die aus leeren Scheiden, mineralreichen Detritus und Eisenoxydhydrat (aus dem sehr eisenreichen Wasser, das auch radiumhältig ist) bestehen. Desgleichen finden sich im ganzen Verlaufe des Abflusses ca. 500 Schritte weit reichlich Metastasen von *Phormidium tinctorium* teils auf dem Grunde in Form jener zarten, fast *Oscillaria*-artigen Häute, teils an der Oberfläche in Form der festen lederigen Häute. Erstere (Grund- oder *Oscillaria*-ähnliche Form) zeigt hie und da Andeutungen von Fasciculi, aber nur undeutlich, letztere hingegen ist ein sehr ausgeprägtes *Phormidium*.

Die forma *stratosae* ist wohl nur eine Standortsform, bei rascherem Gefälle wird sich wohl die von Gomont als Typus beschriebene faszikulierte Form ausbilden.

Immixtae sunt: *Oscillatoria tenuis* Ag. var. *natans* Gomont, *Oscillatoria splendida* Grev. diatomaceae variae.

Hungaria (comitatus Sopron): in aqua thermali (14° R) in balneo prope Lajtha-Pordany, m. Oct.

leg. et det. S. Stockmayer.

1947. *Phormidium laminosum*.

Gomont in Journ. de Botanique, vol. IV (1890), p. 355; Gardner in Coll. Hald. et Setch. Phycotheca Bor. Amer., Nr. 1003; De Toni, Syll. Algar., vol. V (1907), p. 225.

— *Oscillatoria laminosa* Ag. in Flora, Bd. 10 (1827), p. 633. — *Oscillatoria laminosa* Ag., l. c. — *Leptothrix lamellosa* Kütz., Phyc. Gen. (1843), p. 199 — *Leptothrix compacta* Kütz., Tab. Phycol., Bd. I (1846), Tab. 66, Fig. 1. — *Leptothrix Braunii* Kütz., Phycol. gener. (1843), p. 198; Idem, Phyc. German. (1845), p. 166; Idem, Spec. Alg.

(1849), p. 266; Idem, Tab. Phycol., vol. I (1846), p. 40, Tab. 66, Fig. 1. — *Lyngbya laminosa* Thur., Essai (1857), p. 8; Hansgirg, Prodr. Alg. Fl. v. Böhmen II (1892), p. 88 (exclus. synon.). — *Lyngbya laminosa* b. *amphibia* Hansgirg, Alg. Fl. v. Böhmen II (1892), p. 89. — *Lyngbya compacta* Hansgirg, Alg. Fl. v. Böhmen II (1892), p. 88.

Bedeckt die Mauer in der nächsten Nähe der Ausflußöffnung des «kleinen Sprudels» und wird fortwährend vom dampfenden Thermalwasser bespült.

Bohemia: in aqua thermali in muris «kleiner Sprudel» Karlsbad, m. Sept.

det. S. Stockmayer, leg. K. Rechinger.

1948. *Microcoleus Chthonoplastes*.

Thuret, Essai in Annal. de Scienc. Nat. Botanique, sér. VI, vol. I (1875), p. 378; De Toni, Syll. Alg., vol. V (1907), p. 371; Gomont, Monogr. Oscill. I (1894), p. 91. — *Lyngbya aestuarii* Liebmann, Bemerk. og Tillæg. til danske Algfl. Krøyers Tidskr. (1841), p. 492; De Toni, Syll. Alg., vol. V, p. 262; Gomont, Monograph. II (1894), p. 147.

Immixtum est: *Closterium Dianae* Ehrenb.

Hungaria (comitatus Mosoni): ad ripas lacus Peisonis inter pagos «Neusiedl am See» et «Weiden» in terra salsa humida, m. Sept. leg. et det. Stockmayer.

1949. *Chamaesiphon minutus*.

Lemmermann, Algenfl. v. Brandenburg, Bd. III (1907), p. 98. — *Sphaerogonium minutum* Rostafinski, Bericht d. Krakauer Akadem., Bd. X (1883), p. 305; De Toni, Syll. Algar., vol. V (1907), p. 141.

Dicht überziehend die Scheiden von *Tolypothrix penicillata* Thuret.

Dieses Specimen ist besonders interessant durch das fast vollständige Fehlen von Heterocysten, was bei *Tolypothrix* insbesondere bei *T. penicillata* nicht so selten der Fall ist. An Stelle der Heterocysten treten Spaltkörper an der Basis der «pseudorami solitarii» auf (Übergang zu *Plectonema*).

Sehr häufig finden sich «pseudorami gemini» (Anlehnung an *Scytonema*). Die pseudorami solitarii sind nicht selten eine Strecke lang in der gemeinsamen Scheide eingeschlossen (Anlehnung an den *Rimularia*- und *Schizothrix*-artigen Pseudorami-fikationstypus).

Carniolia: in fonte parvo lapidibus insidens prope Kronau, m. Junio.

leg. K. de Keißler, det. S. Stockmayer.

Glaspräparat:

1950. *Ceratium tripos*.

Nitzsch, Beitr. z. Infusorienkunde in neuen Schriften d. naturforsch. Gesellsch. zu Halle, Bd. III (1817), p. 4; Lemmermann, Phytoplankton d. Meeres, Beiheft z. bot. Zentralbl., Bd. XIX, 2 (1906), p. 24; Karsten, Phytoplankt. d. Atl. Oz. nach d. Mater. d. deutsch. Tiefsee-Exped. 1898–1899 (1906), Bd. II, 2. Teil, 2. Lief., p. 140. — *Cercaria tripos* O. F. Müller, Zoologiae Danicae Prodr. (1776), p. 206.

Insunt insuper: *Ceratium furca* Claparede et Lachm. et *C. fusus* Claparede et Lachm.

Norvegia: in mari prope Dröbak, «Kristianfjord», m. Sept. (Planktonfang).

leg. H. H. Gran, praepar. R. Pfeiffer de Wellheim.

Präparation: Venezianischer Terpentin, Eisenkarminfärbung, Alkoholmaterial.

Addenda:

424 b. *Phormidium subfuscum*.

Gom.

Stiria superior: in lacu «Leopoldsteiner See», m. Julio.

leg. K. de Keißler, det. S. Stockmayer.

637 b. *Vaucheria dichotoma*.

(L.) Ag.

Fäden 200—288 μ dick, Antheridien bis zu 192 dick, 240 μ lang, Oogonien 360—420 μ dick, 400—450 μ lang.

Romania: in rivis prope Campulung.

leg. A. Loitlesberger.

Teodorescu, Matériaux pour la flore algologique de la Roumanie in Beil. zum Botan. Zentralblatte, Bd. XXI, 1908, Heft II, p. 157, sagt: «Si les organes qu'ont vus la plupart des auteurs, étaient vraiment des oogones et si ceux-ci ne possédaient qu'un diamètre de 100 μ , il faudra peut-être considérer la plante que Solms et moi avons étudiée, comme une nouvelle forme: *ampla*, qui diffère du type par les dimensions des oogones reproducteurs et de la forma marina Hauck par son habitat ainsi que par les dimensions de toutes ses parties.»

Die vorliegende Form, die ebenso wie die von Teodorescu beschriebene aus Rumänien stammt, hat noch größere Oogone als die forma *ampla* Teodorescus und die Pflanze Solms, die Antheridien unserer und der Exemplare Teodorescus sind ziemlich gleich und fast $1\frac{2}{3}$ mal so groß, als Solms sie angibt; die Fäden sind auch oft noch dicker, als Solms und Teodorescu und auch Heering (s. u.) angeben.

Mit Heering (Die Süßwasseralgen Schleswig-Holsteins, Jahrb. der Hamburg. Wissenschaftl. Anstalten XXIV, 3. Beiheft, p. 139, 1907) glaube ich, daß solche reine Quantitätsformen nicht benannt werden sollen, auch nicht mit dem Epitheton «forma».

S. Stockmayer.

1513 c. *Lemania fluviatilis*.

C. A. Ag.

Stiria superior: lapidibus insidens in fluvio «Enns» prope Landl ad Hietlau, m. Julio.

leg. K. de Keißler.

Vorliegende Form entspricht der forma α Bornemanns (Beiträge z. Kenntnis der Lemnaceen, 1887, p. 42), nähert sich aber durch die stark entwickelten Antheridialpapillen der forma β , die Färbung aber entspricht der von α . Nach den Nomenklaturregeln hat die Pflanze jetzt *Sacheria fluviatilis* Sirodot in Ann. Scienc. Nat. Bot., sér. 5, Tom. XVI (1872), p. 70, zu heißen.

S. Stockmayer.

1760 b. *Chamaesiphon polonicus*.

Hansgirg.

Stiria superior: ad ostium lacus «Leopoldsteiner See», m. Julio.

leg. K. de Keißler, det. S. Stockmayer.

1850 b. *Tolypothrix penicillata*.

Thur.

Stiria superior: in lacu «Leopoldsteiner See».

leg. K. de Keißler, det. S. Stockmayer.

Lichenes (Decades 47—49).

1951. *Verrucaria praetermissa*.

Anzi in Comment. Societ. Crittogam. Italian., vol. II, Fasc. 1 (1864), p. 64 (sed non Anzi, Lich. Langob. exsicc.). — *Leiothloea praetermissa* Trevis., Conspect. Verrucar. (1860), p. 101. — *Verrucaria laevata* Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 349 non Ach.

Die Flechte ist trotz der durch Trevisan erfolgten Umtaufung noch nicht klar gestellt und ihr Verhalten zu den übrigen Arten der *Hydrelia*-Gruppe wird erst näher präzisiert werden müssen. Wenn sie unter der vielleicht nur provisorischen Benennung Trevisans schon jetzt zur Ausgabe gelangt, so geschieht dies, um das gleichmäßige und instruktiv gesammelte Material den Lichenologen zugänglich zu machen.

Zahlbruckner.

Hungaria: ad saxa arenacea ad flumen Rečina prope Tanovica, 300—320 m s. m.
leg. F. Blechschmidt et J. Schuler.

1952. *Cyphelium californicum*.

A. Zahlbr. apud Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1* (1903), p. 84; Herre in Proceed. Washington Acad. Sc., vol. XII (1910), p. 61. — *Trachylia californica* Tuck. in Proceed. Americ. Acad. Arts and Sc., vol. VI (1866), p. 263. — *Acolium californicum* Tuck., Lich. of California (1866), p. 27 et Genera Lichen. (1872), p. 237; Reinke in Pringsh., Jahrbüch. f. wissensch. Botan., XXIX (1896), p. 195, Fig. 198.

America Borealis (California): Oakland Hills prope Oakland, ± 1200' s. m., ad saxa arenacea.
leg. A. C. Herre.

1953. *Schismatomma pluriloculare*.

A. Zahlbr. apud Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1* (1905), p. 116. — *Platygrapha plurilocularis* A. Zahlbr. in Beihefte zum Botan. Zentralbl., vol. XIII (1902), p. 156.

America Borealis (California): Catalina Island, ad corticem *Rhoidis integrifoliae*.
(Locus classicus.)
leg. H. E. Hasse.

1954. *Lecidea parasema*.

Arn. in Flora, vol. LXVII (1885), p. 559 et Zur Lichentl. Münchens in Berichte Bayr. Botan. Gesellsch., vol. I (1891), Anhang p. 79.

Ich fasse die Art im engeren Sinne Arnolds: «thallus cinerascens, C—; hypothecium fulvescens» und sehe von anderen Zitaten, welche sich nur zum Teil auf die Flechte beziehen, ab.

Planta lignicola.

Austria inferior: ad scandulas in monte Sonntagberg prope Rosenau.

leg. P. P. Strasser.

1955. *Lecidea* (sect. *Biatora*) *mollis*.

Nyl., Lichen. Scand. (1861), p. 223; Leight., Lich.-Flora Great Britain (1871), p. 277 et edit. 3^a (1879), p. 280; Th. Fries, Lichgr. Scand., vol. I (1874), p. 451; Hue in Revue de Botan., vol. VI (1887—1888), p. 39 et in Nouv. Archiv. du Museum, sér. 3^a, vol. III (1891), p. 129; Wainio in Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennic., vol. XIII, nr. 6 (1896), p. 18; A. L. Smith, Monogr. Brit. Lich., vol. II (1911), p. 89. — *Lecidea rimulosa*

β. mollis Wahlb., Flora Lappon. (1812), p. 472 et Flora Suecic., vol. II (1826), p. 863. — *Biatora rivulosa β. mollis* Th. Fries in Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsal., ser. 3^a, vol. III (1861), p. 298; Tuck., Synops. North Americ. Lich., vol. II (1888), p. 24. — *Biatora mollis* Stein apud Cohn, Kryptg.-Flora von Schlesien II, 2. Heft (1879), p. 200; Arn. in Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien, vol. XXV (1875), p. 441.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Karesuando, in summo monte Vuokavaara, ca. 600 m s. m., ad saxa granitica. leg. G. Lång.

1956. *Gyrophora rugifera* var. *stipitata*.

G. Lång. — *Umbilicaria stipitata* Nyl., Scand. (1861), p. 289, Synops. Meth. Lichen., vol. II (1863), p. 15 et in Flora, vol. XLVIII (1865), p. 604 not. et vol. LII (1869), p. 388. — *Gyrophora stipitata* Branth et Grönl., Grönlands Lich.-Flora (1887), p. 491; Hue in Revue de Bot., vol. V (1886—1887), p. 15 (erron. sub «*G. stipitata*»); Oliv. in Mém. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 261. — *Gyrophora hirsuta* Darb., Report Second. Norwég. Arctic Expedit., Lichens (1909), p. 24 saltem pr. p. secund. specim. origin. ex Ellersmerelandie in muscis Helsingforsiae et Lundae.

Auf demselben Standorte wachsen vollkommen normale *Gyrophora cylindrica* var. *Delisei* mit *Gyrophora rugifera* var. *stipitata* gemischt, ohne daß Übergänge vorkommen. Die Exemplare aus Ellesmereland stimmen genau mit meinen Stücken überein. *Gyrophora cylindrica* var. *Delisei* hat gerillte Apothezien und einen nabellosen Thallus. G. Lång.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Karesuando, in latere rupis infra cacumen australe montis Pältsä, ca. 1250 m s. m. leg. G. Lång.

1957. *Gyrophora reticulata*.

Th. Fries, Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 166; Arn. in Verh. zool.-botan. Gesellsch. Wien, vol. XXV (1875), p. 439, vol. XXVI (1876), p. 362 et vol. XXVIII (1878), p. 266; Lamy in Bull. Soc. Botan. France, vol. XXX (1883), p. 365; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. III (1891), p. 35; Harm. in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 2^a, vol. XXXI ([1896] 1897), p. 266; Jatta, Sylloge Lich. Italic. (1900), p. 157 et in Flora Italic. Cryptog., Fasc. III (1911), p. 706; Goffart in Bull. Herb. Boissier, sér. 2^a, vol. II (1902), p. 961, Tab. X, Fig. 4; Oliv. in Mém. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 258; Lynge in Bergens Mus. Aarbog (1910), nr. 9, p. 56; Herre in Contrib. U. S. Nation. Museum, vol. XIII (1911), p. 316, Tab. 69. — *Gyrophora polymorpha* c. *G. reticulata* Schaer. in Naturwiss. Anzeiger d. allgem. schweizerisch. Gesellsch. Naturw., vol. I (1818), p. 7. — *Umbilicaria atropuinososa* var. *reticulata* E. Fries, Lichgr. Europ. Reform. (1831), p. 351; Dietrich, Lichgr. German. (1832—1837), p. 21, Tab. 94; Nyl., Lich. Scand. (1861), p. 114 et Synops. Meth. Lichen., vol. II (1863), p. 6. — *Umbilicaria reticulata* Nyl. in Flora, vol. LII (1869), p. 389.

Exsicc.: Anzi, Lich. Ital. Super., nr. 80; Arnold, Lich. Exsicc., nr. 657; Rabh., Lichen. Europ., nr. 424.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Karesuando, in monte Guåbnetjåkko, ca. 560 m s. m. leg. G. Lång.

1958. *Gyrophora leiocarpa*.

Steud., Nomencl. Botanic. (1824), p. 194. — *Umbilicaria leiocarpa* DC., Fl. Franç., vol. II (1805), p. 410 et Synops. Plant. (1806), p. 88; Wainio in Voyage S. Y.

Belgica, Botan. (1903), p. 9. — *Umbilicaria anthracina* Hoffm., Deutschl. Flora (1796), p. 110; Schaer., Enumer. Crit. Lich. Europ. (1850), p. 27; Mass., Ricerch. sull'auton. Lich. (1852), p. 62, Fig. 114; Nyl. in Botanisk. Notiser (1853), p. 159; Linds. in Transact. Linn. Soc. London, vol. XXVII (1869), p. 335, Tab. XLIX, Fig. 9; Tuck., Synops. North Americ. Lich., vol. I (1882), p. 84. — *Umbilicaria atropruinosa* var. *anthracina* E. Fries, Lichgr. Europ. Reform. (1831), p. 351. — *Gyrophora anthracina* Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 99 et Parerg. Lich. (1859), p. 39; Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 165; Hazsl., Magy. Birod. Zuzmóflor. (1884), p. 75; Sydow, Flecht. Deutschl. (1887), p. 66; Jatta, Sylloge Lich. Italic. (1900), p. 168 et in Flora Italic. Cryptog., Fasc. III (1911), p. 702; Goffart in Bull. Herb. Boissier, sér. 2^a, vol. II (1902), p. 961, Tab. X, Fig. 1; A. Zahlbr. apud Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., Bd. I, Abt. 1^{*} (1906), p. 148, Fig. 69, D; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Math. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 259; Lyngé in Bergens Museum Aarbog (1910), nr. 9, p. 51. — *Gyrophora heteroidea* & *cinerascens* Ach., Lichgr. Univ. (1810), p. 220. — *Gyrophora tessellata* var. *cinerascens* Ach., Synops. Lich. (1814), p. 64. — *Umbilicaria atropruinosa* var. *cinerascens* Nyl., Lich. Scand. (1861), p. 113 et Synops. Meth. Lichen., vol. II (1863), p. 7.

Exsicc.: Arnold, Lich. exsicc., nr. 1650, 1785; Th. Fries, Lich. Scand., nr. 38; Malmé, Lich. exsicc., nr. 153; Univ. Itiner. Cryptog., nr. 12.

Gyrophora anthracina Ach., Method. Lich. (1803), p. 102 (= *Lichen anthracinus* Wulf.). ist nach Ach., Synopsis *Gyrophora glabra* und mit *Gyrophora anthracina* Körb. und der späteren Autoren nicht identisch. Mithin ist das Binom für alle Fälle vergeben und darf im Sinne der Wiener Nomenklaturregeln vom Jahre 1905 nicht wieder zur Verwendung gelangen. Wir müssen auf die De Candollesche Benennung zurückgreifen.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Jukkasjärvi in monte Kattarak, ca. 650 m s. m. leg. G. Lång.

1959. *Gyrophora erosa*.

Ach., Method. Lich. (1803), p. 103 et Lichgr. Univ. (1810), p. 224 (α); Sm. et Sowerb., Engl. Botan., vol. XXIX (1809), Tab. 2066; Schaer. in Naturwiss. Anzeiger der allgem. schweizer. Gesellsch. f. Naturw., vol. I (1818), p. 7; Tul. in Annal. Sc. Nat., Bot., sér. 3^a, vol. XVII (1852), p. 206; Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 96 et Parerg. Lichgr. (1859), p. 40; Mudd, Manual Brit. Lich. (1860), p. 117; Rabh., Kryptog.-Flora v. Sachsen, 2. Abt. (1870), p. 278; Arn. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, vol. XXV (1875), p. 438; Stein apud Cohn, Kryptog.-Flora von Schlesien, Bd. II, 2. Heft (1879), p. 94; Th. Fries in Journ. Linn. Soc. London, Bot., vol. XVII (1879), p. 355; Sydow, Flecht. Deutschl. (1887), p. 66; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. III (1891), p. 37; Cromb., Monogr. Lich. Britain, vol. I (1894), p. 329; Harm. in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 2^a, vol. XXXI [1896] 1897, p. 269; Jatta, Sylloge Lich. Italic. (1900), p. 156 et in Flora Italic. Cryptog., Fasc. III (1911), p. 707; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 255; Lyngé in Bergens Museum. Aarbog (1910), nr. 9, p. 52; Herre in Contrib. U. S. Nation. Herbar., vol. XIII (1911), p. 320. — *Lichen erosus* Web., Spicil. Florae Goetting. (1778), p. 259; Ach. in Kgl. Vetensk.-Akad. Nya Handling., vol. XV (1794), p. 87, Tab. II, Fig. 1 et Lichgr. Suec. Prodr. (1798), p. 145. — *Umbilicaria erosa* Hoffm., Deutschl. Flora (1796), p. 111 et Descript. et Adumbr. Plant. Lichen., vol. III (1801), p. 7, Tab. LXX, Fig. 1–5; Hoppe apud Sturm, Deutschl. Flora, 2. Abt., Heft 7 (1805), p. 10, Tab. XXIV, Fig. 7; E. Fries, Lichgr. Europ. Reform. (1831), p. 354; Schaer., Enum. Crit. Lich. Europ. (1850), p. 29;

Mass., Ricerch. sull'auton. Lich. (1852), p. 62, Fig. 116; Linds. in Transact. Roy. Soc. Edinburgh, vol. XXII (1859), p. 187, Tab. IX, Fig. 22—23; Nyl. in Actes Soc. Linn. Bordeaux, vol. XXI (1856), p. 310, Lich. Scand. (1861), p. 118, Synops. Method. Lich., vol. II (1863), p. 15, Tab. IX, Fig. 12 et in Flora, vol. LII (1869), p. 388; Leight., Lich.-Flora Great Britain (1871), p. 158 et edit. 3^a (1879), p. 145; Wainio in Meddel. Soc. pro Fauna et Flora Fennic., vol. VI (1881), p. 138 et in Arkiv för Botan., vol. VIII, nr. 4 (1909), p. 12; Tuck., Synops. North Americ. Lichen., vol. I (1882), p. 86; Harm., Lichens de France, Fasc. IV ([1909] 1910), p. 702. — *Gyrophora erosa* α *normalis* Th. Fries, Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 159; Flagey in Mémoir. Soc. d'Émul. Doubs (1882), p. 475. — *Gyrophora Koldeweyi* Körb. in Zweite Deutsche Nordpolf., vol. II (1874), p. 77.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Jukkasjärvi, ad rivulum Rautajski prope pagum Junusuando masugnsby. leg. G. Lång.

1960. *Gyrophora arctica*.

Ach., Method. Lich. (1803), p. 106, Tab. II, Fig. 6, in Kgl. Vet.-Akad. Nya Handl. (1808), p. 274 et Lichgr. Univ. (1810), p. 221; Flk. in Gesellsch. naturf. Freunde Berliner Magazin, vol. IV (1810), p. 65; Sm. et Sowerb., Engl. Botany, vol. XXXV (1813), Tab. 2485; S. Gray, Natur. Arrang. Brit. Plant., vol. I (1821), p. 477; Sydow. Flecht. Deutschl. (1887), p. 66; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. III (1891), p. 36; Cromb., Monogr. Lich. Britain, vol. I (1894), p. 331; Arn., Labrador (1896), p. 6; Jatta, Sylloge Lich. Italic. (1900), p. 155 et in Flora Italic. Cryptog., Fasc. III (1911), p. 707; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 255; Herre in Contrib. U. S. Nation. Herbar., vol. XIII (1911), p. 311. — *Gyromium proboscidea* β . *arcticum* Wahlbg., Flora Lappon. (1812), p. 483. — *Gyrophora proboscidea* var. *arctica* Ach., Synops. Lich. (1814), p. 65; Mann., Lich. in Bohem. observ. dispos. (1825), p. 67; Hook. in Sm., Engl. Flora, vol. V (1844), p. 221; Körb., Parerg. Lich. (1859), p. 40. — *Umbilicaria proboscidea* var. *arctica* E. Fr., Lichgr. Europ. Reform. (1831), p. 355; Tuckm., Synops. North Americ. Lich., vol. I (1882), p. 84. — *Umbilicaria polymorpha* γ . *arctica* Schaer., Enum. critic. Lichen. Europ. (1850), p. 27. — *Umbilicaria varia* δ . *arctica* Leight. in Annals and Magaz. Natur. Hist., ser. 2^a, vol. XVIII (1856), p. 283, Tab. X, Fig. 6. — *Umbilicaria arctica* Nyl., Herb. Musei Fennic. (1859), p. 84; Lich. Scand. (1861), p. 116, Synops. Meth. Lichen., vol. II (1863), p. 13 et in Flora, vol. LII (1869), p. 389; Linds. in Transact. Linn. Soc. London, vol. XXVII (1869), p. 333, Tab. XLIX, Fig. 8; Leight., Lich.-Flora Great Brit. (1871), p. 157 et ed. 3^a (1879), p. 145.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Jukkasjärvi, in monte Njutum, saxicola. leg. G. Lång.

1961. *Cladonia rangiferina* f. *major*.

Flk.; Wainio, Monogr. Cladon. Univ., vol. I (1887), p. 15.

Germania: in montibus «Osenberge».

leg. H. Sandstede.

1962. *Cladonia acuminata*.

(Ach.) Norrl. — Wainio, Monogr. Cladon. Univ., vol. II (1894), p. 73 et vol. III (1897), p. 250.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Karesuando, in latere collis Mustavaara prope pagum Närvä, in loco subhumido regionis sylvaticæ. leg. G. Lång.

1963. Cladonia strepsilis.

(Ach.) Wainio, Monogr. Cladon. Univ., vol. II (1894), p. 403 et vol. III (1897), p. 261.

Germania: in turfosis «Ostermoor» prope Zwischenahn, Oldenburg.

leg. H. Sandstede.

1964. Ephebe solida.

Bornet in Annal. Scienc. Nat., Bot., ser. 3^a, vol. XVIII (1852), p. 169; Nyl., Synops. Lichen., vol. I (1858), p. 90; Tuckerm., Synops. North Americ. Lich., vol. I (1882), p. 132; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 226; Reinke in Pringsh., Jahrbüch. f. wiss. Botan., vol. XXVIII (1895), p. 422, Fig. 140, V; A. Zahlbr. in Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., vol. I, Abt. 1* (1906), p. 155, Fig. 76, B; Herre in Proceed. Washingt. Acad. of Scienc., vol. XII (1910), p. 130.

America borealis (California): Santa Cruz Mts. prope New Almaden, ad saxa arenaria.

leg. A. C. Herre.

1965. Heppia Zahlbruckneri.

Hasse in Bryologist, vol. XIV (1911), p. 100.

America borealis (California): Rubi Cañon in montibus San Gabriel, Los Angeles Co., ad saxa quartzosa (Specimina originalia).

leg. H. E. Hasse.

1966. Nephroma expallidum.

Nyl. in Flora, vol. XLVIII (1865), p. 428 et vol. LII (1869), p. 412; Leight. in Annal. and Magaz. Natur. Hist., ser. 4^a, vol. V (1870), p. 39; Rabh., Flecht. Europ., Fasc. 34 (1871), nr. 911; Arn. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, vol. XXVI (1876), p. 371; Tuckerm., Synops. North Americ. Lich., vol. I (1882), p. 103; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 312; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Nat. et Mathém., vol. XXXVI (1907), p. 212; Lynge in Bergens Mus. Aarbog (1910), nr. 9, p. 113, Tab. IV, Fig. 2—3. — *Nephronium expallidum* Nyl. in Öfvers. Kgl. Vet.-Akad. Förhandl., vol. XVII (1860), p. 295, Synops. Lichen., vol. I (1860), p. 318 et Lich. Scand. (1861), p. 86. — *Opisteria expallida* Wainio in Arkiv för Botan., vol. VII, nr. 4 (1909), p. 93 et 94.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Jukkasjärvi, in monte Luossavaara, ca. 659 m s. m., loco subhumido.

leg. G. Lång.

1967. Nephroma resupinatum.¹⁾

Ach., Lichgr. Univ. (1810), p. 522; S. Gray, Natur. Arrang. Brit. Plants, vol. I (1821), p. 426; Mérat, Nouv. Flor. Envir. Paris, ed. 2^a, vol. I (1826), p. 200; Chevallier, Flore Génér. Envir. Paris, vol. I (1826), p. 616, Tab. XIV, Fig. 8; Link, Grundr. d. Kräuter., vol. III (1833), p. 176; DNotrs. in Memor. R. Accad. Sc. Torino, nr. 2^a, vol. XII (1851), p. 135, Tab. II, Fig. XI; Tul. in Annal. Sc. Natur., Bot., ser. 3^a, vol. XVII (1852), p. 201, Tab. IX, Fig. 18—23; Mass., Memor. Lichenogr. (1853), p. 23, Fig. 10 et Schedul. critic., Fasc. III (1856), p. 57; Oliv., Flore Lich. de l'Orne, vol. I (1882), p. 89; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 4, vol. II (1900), p. 104; A. Zahlbr. in Engl.-Prantl,

¹⁾ Das Wort «Nephroma» wurde in der älteren Literatur mitunter als weibliches Hauptwort betrachtet und dementsprechend der Speziesnamen in der weiblichen Form angewendet. Ich habe bei den obigen Zitaten darauf keine Rücksicht genommen und auch dort die neutrale Form angewendet, wo im ursprünglichen Text die weibliche Form steht.

Natürl. Pflanzenf., vol. I, Abt. 1* (1907), p. 194, Fig. 101, D et Fig. 102, F; Lynge in Bergens Mus. Aarbog (1910), nr. 9, p. 112, Tab. IV, Fig. 4. — *Lichen resupinatus* Linn., Spec. Plant. (1753), p. 1148; Müller, Icon. Plant. Danicae, vol. V, Fasc. 13 (1778), Tab. DCCCXIV; Wulf. apud Jacq., Collect. Botan., vol. IV (1790), p. 257, Tab. XII, Fig. 1; Sm. et Sowerb., Engl. Botan., vol. V (1796), Tab. 305. — *Nephromium resupinatum* Arn. in Flora, vol. LXVII (1884), p. 231 et Zur Lich.-Flora München in Bericht Bayr. Botan. Gesellsch., vol. I (1891), Anhang, p. 36; Wainio in Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennic., vol. XIV (1888), p. 23; Dalla Torre et Sarnth., Flecht. v. Tirol (1902), p. 80; Harm., Lich. de France, Fasc. IV ([1909] 1910), p. 677, Tab. XV, Fig. 9. — *Opisteria resupinata* Wainio in Arkiv för Botan., vol. VIII, nr. 4 (1909), p. 93. — *Peltigera tomentosa* Hoffm., Deutschl. Flora (1796), p. 108. — *Nephroma tomentosum* Fw. in Jahresber. schlesisch. Gesellsch. f. Naturk., vol. II (1850), p. 122; Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 56 et Parerga Lich. (1859), p. 23; Nyl. in Actes Soc. Linn. Bordeaux, vol. XXI (1856), p. 295; Rabh., Flecht. Europ., Fasc. 3 (1856), nr. 69 et Kryptog.-Flora v. Sachsen, 2. Abt. (1870), p. 312; Th. Fr. in Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsal., ser. 3^a, vol. III (1861), p. 141; Schwenden. in Nägeli, Beitr. zur wiss. Botan., 3. Heft (1863), p. 173, Tab. IX, Fig. 8; Br. et Rostr. in Botan. Tidsskrift, vol. III (1869), p. 178; Leight. in Annal. and Magaz. Nat. Hist., ser. 4^a, vol. V (1870), p. 40; Tuckerm., Synops. North Americ. Lich., vol. I (1882), p. 103; Hazsl., Magy. Birod. Zuzmó-Flor. (1884), p. 54; Jatta, Monogr. Lich. Italiae Merid. (1889), p. 98, Tab. II, Fig. 24—25; Harris in Bryologist, vol. VI (1903), p. 77, Fig. 1; Fink in Contrib. U. S. Nation. Museum, vol. XIV (1910), p. 165. — *Nephromium tomentosum* Nyl. in Mémoir. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, vol. V (1857), p. 101, Synops. Lich., vol. I (1860), p. 319 et Lich. Scand. (1861), p. 86; Malbr. in Bull. Soc. Ann. Sc. Natur. Rouen, vol. III (1867), p. 453; Linds. in Trans. Roy. Soc. Edinb., vol. XXII (1859), p. 172, Tab. IX, Fig. 28—34; Leight., Lich.-Flora Great Brit. (1871), p. 105 et edit. 3^a (1879), p. 99; Stein apud Cohn, Kryptg.-Flora v. Schlesien, Bd. II, 2. Heft (1879), p. 86; Flagey in Mémoir. Soc. d'Émul. Doubs (1882), p. 416; Sydow, Flecht. Deutschl. (1887), p. 60; Hue in Nouv. Arch. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 310; Crb., Mongr. Lich. Brit., vol. I (1894), p. 283; Harm. in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 2^a, vol. XXXI ([1896] 1897), p. 242, Tab. XI, Fig. 34 et Tab. XIV, Fig. 2; Schneider, Guide Study Lich. (1898), p. 196; Jatta, Sylloge Lich. Italic. (1900), p. 113 et in Flora Italic. Cryptog. (1909), p. 183; Boist., Nouv. Flore Lich., 2. partie (1903), p. 83; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 213.

Tirolia: ad corticem truncorum *Acerum* prope Hochfilzen, ca. 1000 m s. m.

leg. A. Zahlbruckner.

1968. *Lecanora boligera*.

Hedl. in Bihang till K. Svensk. Vet.-Akad. Handl., vol. XVIII, afd. III, nr. 3 (1892), p. 42. — *Lecidea fuscescens* f. *boligera* Norm. apud Th. Fries, Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 461; Wainio in Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennic., vol. X (1883), p. 44.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Jukkasjärvi, in turfosis prope pagum Merasjärvi, ad ramulos *Betularum*.

leg. G. Lång.

1969. *Lecanora coerulea*.

Nyl. apud Stzbgr. in Jahresber. St.-Gallisch. naturw. Gesellsch., 1880—1881 (1882), p. 384; Schuler, Flechtfl. v. Fiume (1902), p. 55; Jatta in Flora Italic. Cryptog., Fasc. III (1910), p. 133. — *Verrucaria coerulea* DC., Flore Franç., vol. II (1805), p. 318. — *Biatora coerulea* Flagey, Lich. Franche-Comt., vol. II (1894), p. 438. — *Hymenelia*

Prevostii γ. *coerulescens* Krph. in Flora, vol. XXXV (1852), p. 25. — *Manzonia Cantiana* Garov. in Memor. Soc. Italian. Sc. Natur., vol. II, nr. 8 (1866), p. 4, Tab. I, Fig. 1. — *Lecanora coerulea* f. *Cantiana* Nyl. apud Stzbg., l. s. c. — *Lecanora Cantiana* A. Zahlbr. in Wissensch. Mitteil. aus Bosn. u. d. Hercegov., vol. III (1895), p. 604.

Wie schon Arnold gezeigt hat (Flora, vol. LII, 1869, p. 257), herrscht bezüglich der Nomenklatur der vorliegenden Flechte die größte Verwirrung, die sich aber leicht beheben läßt, wenn man auf De Candolles Beschreibung seiner *Verrucaria coerulea* zurückgeht. *Verrucaria coerulea* DC. ist identisch mit Garovaglios *Manzonia Cantiana*, der De Candolle nicht zitiert und sich daher für berechtigt hielt, einen neuen Speziesnamen zu schaffen. Verschieden von unserer Flechte ist die «*Hymenelia coerulea*» Massalongos, Körbers und Arnolds, ihr fehlt das weiße, mehr weniger strahlende Vorlager, die Apothezien sind in das Substrat versenkt, die Scheibe liegt in der Höhe der Lageroberfläche und wird zu keinem wulstigen Rand, welchen De Candolle für seine Art beschreibt und ihn veranlaßte, sie bei der Gattung *Verrucaria* unterzubringen. Die Flechte Körbers und Arnolds, welche sich durch die angeführten Merkmale von *Lecanora coerulea* (DC.) Nyl. unterscheidet, braucht unbedingt einen Namen als eigene Art; ich schlage vor, sie *Lecanora pseudocoerulea* zu nennen. Zu diesen wären als Synonym zu zitieren: *Hymenelia coerulea* Mass., Geneal. Lichen. (1854), p. 12 et Symmict. Lichen. (1855), p. 25; Beltr., Lichen. Bassan. (1858), p. 153; Körb., Parerg. Lich. (1860), p. 115; Arn. in Flora, vol. LII (1869), p. 257 et in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch., vol. XX (1870), p. 537, vol. XLVII (1897), p. 223; Hazsl., Magy. Birod. Zuzmóflor. (1884), p. 141; Jatta, Monogr. Lich. Ital. Merid. (1889), p. 149.

Zahlbruckner.

Croatia: ad saxa calcarea in monte Fratar, ca. 1200 m s. m. leg. J. Schuler.

1970. *Parmelia fraudans*.

Nyl., Lich. Scand. (1861), p. 100 et in Flora, vol. LII (1869), p. 292; Th. Fries, Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 115; Hue in Revue de Botan., vol. IV (1885—1886), p. 379 et in Bull. Soc. France, vol. XXXV (1885), p. 44 et in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 288; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 192.

Fennia: *Tavastia australis*, Evo, supra saxa erratica loco aprico prope pagum Iso-Evo. leg. G. Lång.

1971. *Parmelia minuscula*.

Nyl. in Bull. Soc. Linn. Normandie, ser. 4^a, vol. I (1887), p. 205; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 291; Wainio in Arkiv för Botan., vol. VIII, nr. 4 (1909), p. 29. — *Alectoria minuscula* Nyl. in Flora, vol. LII (1871), p. 299. — *Parmelia lanata* = *minuscula* Nyl. in Notis. ur Sällsk. pro Fauna et Flora Fennic. Förh., Ny Serie, vol. V (1866), p. 121 et in Flora, vol. LXII (1879), p. 354; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 201. — *Alectoria lanata* f. *minuscula* Leight., Lich.-Flora Great Brit., ed. 3^a (1879), p. 81. — *Alectoria lanata* = *A. minuscula* Nyl. apud Norrl. in Notis. ur Sällsk. pro Fauna et Flora Fennica Förh., vol. XIII (1873), p. 322. — *Imbricaria lanata* f. *minuscula* Arn. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, vol. XXVI (1876), p. 361 et vol. XXVIII (1878), p. 293.

Fennia: Lapponia enontekiensis, in monte Jorpavaara prope Naimakka, ca. 450 m s. m., saxicola. leg. G. Lång.

1972. *Ramalina homalea*.

Ach., Lichgr. Univ. (1810), p. 598, Tab. XIII, Fig. 5 et Synops. Lich. (1814), p. 294; Eaton, Manual of Bot., ed. 7^a (1836), p. 646; Linds. in Transact. Roy. Soc. Edinb., vol. XXII (1859), p. 131; Nyl., Synops. Lich., vol. I (1860), p. 289 et in Bullet. Soc. Linn. Normandie, ser. 4^a, vol. IV (1870), p. 107; Tuckerm., Synops. North Americ. Lich., vol. I (1882), p. 21; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 260; Herre in Proceed. Washingt. Acad. Sc., vol. VII (1906), p. 332 et vol. XII (1910), p. 217. — *Desmaziera homalea* Mont. in Annal. Scienc. Nat., Bot., ser. 3^a, vol. XVIII (1852), p. 304, apud Gay, Histor. Fisic. y polit. Chile, Botan., vol. VIII (1852), p. 70 et Sylloge Gener. et Spec. Cryptog. (1856), p. 318; Trevis. in Flora, vol. XLIV (1861), p. 51.

America borealis (California): Catalina, Island. ad saxa. leg. A. C. Herre.

1973. *Cetraria nigricans*.

Nyl., Herbar. Mus. Fennic. (1859), p. 109, Synops. Lich., vol. I (1860), p. 299, Lich. Scand. (1861), p. 79 et in Flora, vol. LII (1869), p. 443; Th. Fries in Nova Act. Reg. Soc. Scient. Upsal., ser. 3^a, vol. III (1861), p. 136 not. et Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 100; Hue in Revue de Botan., vol. IV (1885—1886), p. 372 et in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 273; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 168. — *Cetraria odontella* var. *nigricans* Lynge in Bergens Mus. Aarbog (1910), nr. 9, p. 79.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Jukkasjärvi, in monte Auroktjälko, inter saxa minora et lapides supra muscos ad terram, ca. 1100 m s. m. leg. G. Lång.

1974. *Cetraria odontella*.

Ach., Synops. Lich. (1814), p. 230; Schaer., Enumer. Critic. Lich. Europ. (1850), p. 15; Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 48; Schwend. in Nägeli, Beitr. zur wissensch. Botan., 2. Heft (1860), p. 153; Nyl., Synops. Lich., vol. I (1860), p. 301 et Lich. Scand. (1861), p. 136; Th. Fries in Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsal., ser. 3^a, vol. III (1861), p. 136 et Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 99; Hepp, Flecht. Europ., nr. 487 (1867); Tuckerm., Synops. North Americ. Lich., vol. I (1882), p. 29; Hue in Revue de Bot., vol. IV (1885—1886), p. 372; Wainio in Meddel. Soc. pro Fauna et Flora Fennic., vol. XIII (1886), p. 255; Sydow, Flecht. Deutschl. (1887), p. 35; Cromb., Monogr. Lich. Brit., vol. I (1894), p. 219; Jatta, Sylloge Lich. Italic. (1900), p. 107 et in Flora Italic. Cryptog., Pars III (1909), p. 174; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 167; Lynge in Bergens Mus. Aarbog (1910), nr. 9, p. 79. — *Lichen odontellus* Ach., Lichgr. Suec. Prodr. (1798), p. 213. — *Cornicularia spadicea* β. *C. odontella* Ach., Method. Lich. (1803), p. 301 et Lichgr. Univ. (1810), p. 611.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Karesuando, in ripa lacus Rostojahre, supra saxa in regione alpina, ca. 635 m s. m. leg. G. Lång.

1975. *Cetraria tenuissima* var. *muricata*.

Dalla Torre et Sarnth., Flecht. von Tirol (1902), p. 104; Navás, Liquen. de Aragón (1908), p. 27. — *Lichen muricatus* Ach., Lichgr. Suec. Prodr. (1798), p. 214. — *Cornicularia muricata* Ach., Method. Lich. (1803), p. 303, Tab. VI, Fig. 2. — *Cetraria aculeata* var. *C. muricata* Ach., Lichgr. Univ. (1810), p. 612; Hepp, Flecht. Europ., nr. 359 (1857); Nyl., Synops. Lich., vol. I (1860), p. 300 et Lich. Scand. (1861), p. 80; Leight., Lich.-Flora Great Brit. (1871), p. 98 et edit. 3^a (1879), p. 93; Th. Fries, Lichgr. Scand.

vol. I (1871), p. 101; Arn. in Flora, vol. LXIX (1881), p. 200; Oliv., Flore Lich. de l'Orne, vol. I (1882), p. 66 et in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Nat. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 169; Harm. in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 2^a, vol. XXXI (1896), p. 200 et Lich. de France, pars III (1907), p. 423. — *Cornicularia aculeata* β . *stuppea* Fw. in 47. Jahresber. schles. Gesellsch. für Kultur (1849), p. 101; Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 8.

Germania (Oldenburg): in turfosis dictis «Ostermoor» prope Zwischenahn.

leg. H. Sandstede.

1976. *Alectoria nidulifera*.

Nyl. in Flora, vol. LVIII (1875), p. 8; Stzbgr. in Annal. naturh. Hofm. Wien, vol. VII (1892), p. 127; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 91; Lyng. in Bergens Mus. Aarbog (1910), nr. 9, p. 63.

Diese Art ist zirkumpolar, aber, wie es scheint, wenig bekannt. Außer Norrlin, nr. 15, ist sie auch noch in einigen anderen Exsikkaten verteilt; so ist mein Exemplar von Elenkins, Lich. Flor. Rossiae, nr. 14 *Alectoria nidulifera*, desgleichen Cummings, Williams and Seymour, Lich. Americ., nr. 16, allerdings nur pro parte, pro alia parte *A. chalybeiformis* (L.), aber nicht *A. proluxa* Ach. Wahrscheinlich liegt die Flechte unter dem Namen «*Alectoria chalybeiformis*» in vielen Herbarien. Sie ist ohne Zweifel eine gute Art.

G. Lång.

Fennia: Tavastia australis, ad Evo, ad truncos et ramos *Pinorum* in pineto arenoso siccoque.

leg. G. Lång.

1977. *Alectoria nidulifera* var. *simplicior*.

Wainio in Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennic., vol. VI (1881), p. 115; Stzbgr. in Annal. naturhist. Hofmus. Wien, vol. VII (1892), p. 127; Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 91.

Suecia: Lapponia torneensis, paroch. Jukkasjärvi, prope lacum Aptasjärvi, ad ramulos *Pini* desiccatos.

leg. G. Lång.

1978. *Caloplaca* (sect. *Fulgensia*) *fulgida*.

A. Zahlbr. in Österr. Botan. Zeitschr., vol. LVII (1907), p. 72. — *Placodium fulgidum* Nyl. in Flora, vol. XLVIII (1865), p. 212; Arn. in Flora, vol. LIII (1870), p. 468. — *Icanora fulgida* Hue in Revue de Botan., vol. V (1886–1887), p. 21; Nyl., Lich. Pyren. Orient. (1891), p. 15. — *Squamaria fulgida* Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVII (1909), p. 43.

Istria: prope Drenova versus Klana, ca. 300–500 m s. m., in fissuris rupium calcariorum, supra muscos et ad terram.

leg. F. Blechschmidt et J. Schuler.

1979. *Xanthoria parietina* var. *imbricata*.

Beltr., Lich. Bassan. (1858), p. 102; Müll. Arg. in Bullet. Soc. Natur. Moscou, vol. LIII (1878), p. 103; Arn. in Flora, vol. LXVII (1884), p. 243 (pro f.); Oliv. in Mémoir. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 228; Jatta in Flora Italic. Cryptog., pars III (1909), p. 226. — *Physcia parietina* f. *imbricata* Mass., Schedul. Critic., Fasc. II (1855), p. 41; Jatta, Sylloge Lich. Italic. (1900), p. 148; Harm., Lich. de France, pars IV ([1909] 1910), p. 607 (pro var.).

Carniolia: in colle »Straža» prope Veldes, ad ramos *Laricum*.

leg. J. Steiner.

1980. *Physcia grisea*.

A. Zahlbr. — *Lichen griseus* Lam., Encycl. Méthod., Botan., vol. III (1789), p. 480. — *Imbricaria grisea* DC., Flor. Franç., vol. II (1805), p. 387 et Synops. Plant. (1806),

p. 83; Mérat, Nouv. Flor. Envir. Paris, éd. 2^a, vol. I (1821), p. 191. — *Parmelia pulverulenta* var. *grisea* Schaer., Enumer. Critic. Lichen. Europ. (1850), p. 38. — *Physcia pulverulenta* var. *grisea* Rabh., Kryptog.-Flora v. Sachsen, 2. Abt. (1870), p. 285; Berdau, Lischajin. isled varschavskag. utsch. (1876), p. 84; Flagey in Mém. Soc. d'Émul. Doubs (1882), p. 462. — *Lichen pityreus* Ach., Lichgr. Suec. Prodr. (1798), p. 124. — *Parmelia pityrea* Ach., Lichgr. Univ. (1810), p. 483. — *Physcia pulverulenta* var. *pityrea* Nyl. in Actes Soc. Linn. Bordeaux, vol. XXI (1856), p. 308; Synops. Lich., vol. I (1860), p. 420 et Lich. Scandin. (1861), p. 110; Malbr. in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, vol. III (1867), p. 480; Th. Fries, Lichgr. Scand., vol. I (1871), p. 136; Leight., Lich.-Flora Great Brit. (1871), p. 146 et ed. 3^a (1879), p. 135; Oliv., Flore Lich. de l'Orne, vol. I (1882), p. 78; Stein apud Cohn, Kryptg.-Flora v. Schlesien, vol. II, 2. Heft (1879), p. 81; Sydow, Flecht. Deutschl. (1887), p. 48; Hue in Nouv. Archiv. du Muséum, sér. 3^a, vol. II (1890), p. 240; Jatta in Flora Italic. Cryptog., pars III (1909), p. 240; Lyngé in Bergens Mus. Aarbog (1910), nr. 9, p. 104. — *Physeia pityrea* Lamy in Bull. Soc. Botan. France, vol. XXV (1878), p. 383; Cromb., Monogr. Lich. Brit., vol. I (1894), p. 308; Harm. in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 2^a, vol. XXXI ([1896] 1897), p. 258; Mong. in Bullet. Acad. Intern. Géogr. Botan., vol. VIII (1899), p. 254; Oliv. in Mém. Soc. Nation. Sc. Natur. et Mathém. Cherbourg, vol. XXXVI (1907), p. 237. — *Physcia pulverulenta* subsp. *pityrea* Boist., Nouv. Flore Lich., 2. part. (1903), p. 73. — *Lobaria pulveracea* Hoffm., Deutschl. Flora (1796), p. 153. — *Physcia farrea* f. *pityrea* Wain. in Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, vol. VI (1881), p. 132; Harm., Lich. de France, pars IV ([1909] 1910), p. 640; B. de Lesd., Recherch. Lich. Dunkerque (1910), p. 105. — *Physcia pulveracea* Wainio in Act. Soc. Fauna et Flora Fennica, vol. XIII, nr. 6 (1896), p. 14.

Von mehreren Autoren (Harmand, Olivier u. a.) wird zu unserer Flechte als ältestes Synonym *Lichen lanuginosus* Hoffm., Enum. Lich. (1784), p. 82, Tab. X, Fig. 4 zitiert. Würde Hoffmanns Pflanze tatsächlich mit *Physcia grisea* zusammenfallen, so müßte man daraus auch in nomenklatorischer Beziehung die Konsequenzen ziehen. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß Hoffmanns *Lichen lanuginosus* nicht zu *Physcia grisea* gehört; der Passus in Hoffmanns Beschreibung: «foliola subtus dense lanugineo atra obducta» steht in direktem Gegensatz zu den Verhältnissen bei *Physcia grisea*; ferner passen auch die Ausdrücke «foliola cervina» und «scutellae disco rufescente» nicht. Arnold wird die Hoffmannsche Pflanze richtig gedeutet haben, indem er sie in seinem Handexemplare der «Enumeratio» als *Pannaria conoplea* bezeichnet.

Nachdem Ehrharts «Plantae Cryptog.» nach den Wiener Nomenklaturregeln nicht zu jenen Exsikkatenwerken gehören, welche für die Feststellung des ältesten Namens herangezogen werden können, muß der Speziesnamen Lamarcks zur Benennung der vorliegenden Flechte herangezogen werden. Zahlbruckner.

Austria inferior: ad truncos *Laricum* prope Neuhaus ad Weißenbach a. d. Triesting, ca. 450 m s. m. leg. L. et C. Rechinger.

Addenda:

1051 b. *Usnea florida*.

Hoffm.

Litorale austriacum: in sylva dicta «Trnovaner Wald» supra Görz, ca. 1000 m s. m., ad ramos arborum. leg. C. Loitlesberger.

1528 b. *Platygrapha hypothallina*.

A. Zahlbruckner.

America borealis (California): ad saxa granitica maritima prope Monterey, ca. 50 m s. m. leg. A. C. Herre.

Thallus hypothallo mox evanescente demum crassiusculus, usque 2.4 mm altus, tartareus, verrucoso-plicatus vel subcerebrinus, superne albo-suffusus, pulverulentus, sorediis et isidiis destitutus. Apothecia adpresso-sessilia vel subimmersa. Epithecium crassiusculum, pulverulentum, sordidum; paraphyses ad 18 μ crassae, eseptatae, in parte superiore ut plurimum breviter ramosae; asci 8 spori; sporae in ascis \pm biseriales, verticales, bacillari-digitiformes, utrinque subrotundatae, subrectae, 8 loculares, loculis cylindricis, 26—30 μ longae et 3—5 μ latae. Conceptacula pycnoconidiorum immersa, globosa, vertice punctiformi nigro vix emergentia, perifulcrio decolore, fulcris exobasidiis, pycnoconidiis bacillaribus, rectis, utrinque rotundatis, 5—8 μ longis.

Die Beschreibung, insbesondere diejenige des Lagers mußte erweitert werden, da mir ursprünglich mehr jugendliche Stücke vorlagen. A. C. Herre macht in den Schedae die Bemerkung, daß die Flechte identisch ist mit *Platygrapha pinguis* Tuckerm. in Herb. Eine nomenklatorische Umänderung kann auf Grund dieser Konstatierung nicht erfolgen.

Zahlbruckner.

Musci (Decades 44—45).**1981. *Lophozia Wenzeli*.**

Steph., Spec. Hep., vol. II (1902), p. 135; K. Müll. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2, vol. VI (1910), p. 675. — *Jungermannia Wenzeli* N. ab Esenb., Naturg. d. eur. Leberm. (1836), vol. II, p. 58.

Austria superior: in turfosis retro lacum «Laudachsee» prope Gmunden, sociis *Lophozia ventricosa* var. *uliginosa* et *Kantia Trichomanis*, m. Aug.

leg. C. Loitlesberger.

1982. *Anthelia julacea*.

Dum., Rec. d'obs. (1835), p. 18. — *Jungermannia julacea* Linn., Spec. pl., ed. 1 (1753), p. 1135; N. ab Esenb., Naturg. d. eur. Leberm. (1836), vol. II, p. 306.

Bohemia septentrionalis: loco «Wörlichgraben» montium «Riesengebirge», ad rupes madidas, m. Sept.

leg. V. Schiffner et E. Bauer.

1983. *Radula pallens*.

Dum., Rec. d'obs. (1835), p. 14; Synop. Hepat. (1845), p. 256. — *Jungermannia pallens* Swartz, Prodr. Fl. Ind. occ. (1788), p. 143.

Insula Cuba: Farallones ad La Perla, Gaguey ad septentrionem, provincia orientalis, ad truncos in fauce silvatica, 585 m s. m., m. Majo.

leg. W. M. Maxon.

1984. *Dicranum Bergeri*.

Blandow, Musc. frond. exs. III, nr. 114 (1804); Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Bd. IV, Abt. 1, p. 345 (1886); Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. II (1904), p. 36.

Hungaria septentrionalis: ad pedem montium «Tátra Magna», loco turfoso dicto «Rohrwiesen» ad urbem Szepesbela, ca. 690 m s. m., m. Jul.

leg. E. Györffy.

1985. *Dicranum congestum*.

Brid., Spec. musc. I (1806), p. 176; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Bd. IV, Abt. 1, p. 357 (1886); Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. II (1904), p. 40.

Hungaria septentrionalis: montes «Tátra Magna», ad saxa calcarea humosa montis «Stierberg», ca. 1700 m s. m., m. Aug. leg. E. Györfy.

1986. *Dicranum fulvum*.

Hook., Musc. exot., Tab. 149 (1820); Jur., Laubmfl. v. Öst.-Ung. (1882), p. 42; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Bd. IV, Abt. 1 (1886), p. 370; Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. II (1904), p. 45.

Austria superior: Pechgrabental prope Groß-Raming, fruct.

leg. † F. Schiedermaier, com. A. de Degen.

1987. *Trematodon ambiguus*.

Hornsch. in Flora (1819), I, p. 88; Jur., Laubmfl. v. Öst.-Ung. (1882), p. 29; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Bd. IV, Abt. 1 (1887), p. 415; Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. V (1906), p. 65. — *Dicranum ambiguum* Hedw., Descr. musc. III, p. 87, Tab. 36 (1792).

Galicia occidentalis: in pratis turfosis pr. Cieszkowicze, m. Jun., fruct.

leg. C. Schliephacke, com. A. de Degen.

1988. *Pottia lanceolata*.

C. Müll., Synops. I (1849), p. 548; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Bd. IV, Abt. 1 (1888), p. 533; Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. IV (1905), p. 92. — *Leersia lanceolata* Hedw., Descr. musc. II, p. 66, Tab. 23 (1789).

Germania (Ducatus Badensis): pr. Salem, m. Mart. et Apr., fruct.

leg. † J. Jack, com. A. de Degen.

1989. *Heterocladium squarrosulum*.

Lindb., Musci scand. (1879), p. 37; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl., Bd. IV, Abt. 2, p. 817 (1895); Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. II (1904), p. 311. — *Hypnum squarrosulum* Voit in Sturm, D. Fl., II. Abt., 3. Bändchen, Fasc. 11 (1810), Tab. XXIV, 5.

Istria: Monte Maggiore, ad terram in fagitis, ca. 1200 m s. m., m. Apr., fruct.

leg. C. Loitlesberger.

1990. *Wilsoniella Jardini*.

Besch., Fl. bryol. Taiti (1894), p. 54; Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. (1906), p. 134. — *Trematodon Jardini* Schpr. in Jardin, Enum., p. 20.

Samoa (insula Upolu): in silvaticis prope Vailima, ad viarum declivitates, m. Jul., fruct.

leg. K. et L. Rechinger, det. F. Brotherus.

1991. *Trachyloma indicum*.

Mitt., Musc. Ind. or. (1859), p. 91; Bryol. Jav. II, p. 82, Tab. 197 (1863); Fleisch., Musc. d. Fl. v. Buitenz. III, p. 716 (1906); Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. V (1906), p. 62.

Java occidentalis: in montibus Gedeh prope Kandang-Badak, ad arbores, ca. 2500 m s. m., m. Mart.

leg. M. Fleischer.

1992. *Trachypus bicolor*.

Rw. et Hornsch. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. XIV, II. Suppl., p. 708, Tab. 39 (1829); Bryol. Jav. II, p. 98, Tab. 241 (1865); Fleisch., Musc. d. Fl. v. Buitenz. III, p. 738 (1906); Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. V (1906), p. 63.

Java occidentalis: in montibus Gedeh prope Kandang-Badak, ad arbores, ca. 2500 m s. m., m. Mart. part. fruct. leg. M. Fleischer.

1993. *Trachypus bicolor*.

Rw. et Hornsch. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. XIV, II. Suppl., p. 708, Tab. 39 (1829).

Var. *hispidus*.

Card., Mouss. d. Formose in Beiheft v. Bot. Zentralbl., Bd. XIX (1905), p. 116; Fleisch., Musc. d. Fl. v. Buitenz. III, p. 740 (1906). — *Neckera hispida* C. Müll. in Bot. Zeitg. (1854), p. 579. — *Trachypus hispidus* Paris, Ind. bryol., ed. 1, p. 1303 (1897) und ed. 2, vol. V (1906), p. 63.

Insula Ceylon: Wattacalla prope Kandy, ad arbores, ca. 1300 m s. m., m. Febr. leg. M. Fleischer.

1994. *Thuidium tamariscellum*.

v. d. B. et Lac. in Bryol. Jav. II, p. 20 (1865); Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. V (1906), p. 22. — *Hypnum tamariscellum* C. Müll. in Bot. Zeit., XII (1854), p. 573.

Java occidentalis: Gegerbintang in montibus Gedeh, ad arborum truncos, ca. 1300 m s. m., m. Dec. fruct. leg. M. Fleischer.

1995. *Sematophyllum secundum*.

Fleisch. in Musc. Archip. Ind. exsicc., nr. 322 et 323; Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. IV (1905), p. 253. — *Leskea ? secunda* Reinw. et Hornsch. in Nov. Act. Caes. Leop. Acad. XIV, Suppl., p. 717 (1828).

Java occidentalis: montes Gedeh prope Tjibodas, ad arbores in silva primigenia, ca. 1500 m s. m., m. Jun. leg. M. Fleischer.

1996. *Taxithelium turgidellum*.

Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. IV (1905), p. 358. — *Hypnum turgidellum* C. Müll. in Engl., Bot. Jahrb. (1883), p. 87.

Java: Buitenzorg, in viis horti botanici, ca. 280 m s. m., m. Apr. c. fr. vet.

leg. M. Fleischer.

1997. *Isopterygium Teysmanni*.

Jaeg., Adumbr. II (1875—1876), p. 499; Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. III (1905), p. 126. — *Hypnum Teysmanni* Bryol. jav. II, p. 192 (1861—1870).

Insula Ceylon: Peradeniya Garden, ad terram, ca. 800 m s. m., m. Febr.

leg. M. Fleischer.

1998. *Ectropothecium Chamissonis*.

Jaeg., Adumbr. II (1877—1878), p. 528; Paris, Ind. bryol., ed. 2, vol. II (1904), p. 105. — *Hypnum Chamissonis* Hornsch. in Hor. phys. Berol., p. 66, Tab. 13; Bryol. Jav. II, p. 198 (1868).

Var. tepidum.

Fleisch. in Musc. Archip. Ind. exsicc., nr. 341.

Java occidentalis: montes Gedeh, in saxis andesiticis ad thermas, ca. 2000 m s. m., m. Jul. leg. M. Fleischer.

1999. Hyocomium polychaetum.

Fleisch. in Musc. Archip. Ind. exsicc., nr. 346. — *Hypnum polychaetum* v. d. B. et Lac. in Bryol. Jav. II, p. 154 (1866).

Java occidentalis: in montibus Gedeh prope Tjiburum, in silva primigenia, ad fruticum ramos et folia, ca. 1800 m s. m., m. Jul. leg. M. Fleischer.

2000. Hypnodendron Junghuhnii.

Lindb. in Öfv. af K. Vet. Akad. Förh. (1861), p. 374; Bryol. jav. II, p. 132, Tab. 231 (1861—1870); Paris in Ind. bryol., ed. 2, vol. II (1904), p. 373. — *Hypnum Junghuhnii* C. Müll., Syn. II (1851), p. 506.

Java occidentalis: in montibus Gedeh supra Tjiburum, ad terram in silva primigenia, ca. 1800 m s. m., m. Jul. leg. M. Fleischer.

Register zu Centurie I—XX.

Verfaßt von

Dr. F. Ostermeyer.

Die erste Zahl bezieht sich auf die Nummer, unter welcher die Art in den «Kryptogamae exsiccatae» zur Ausgabe gelangte; die zweite auf den Band, beziehungsweise die Seite der «Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien», wo die dazu gehörige Scheda publiziert wurde.

Abrothallus Parmeliarum Arn., 957, XIX, 393.

— *Ricasolii* Mass., 266, XII, 93.

— *Smithii* Tul., 957, XIX, 393.

Acarospora (?) *Velana* Mass., 580, XV, 211.

Acarospora (sect. *Maronea*) *berica* Jatta, 1043, XIX, 417.

— *chlorophana* Mass., 45, IX, 130.

— *cineracea* Lahm, 249, XII, 89.

— *fuscata* var. *cineracea* Oliv. 249, XII, 89.

— *glaucocarpa* var. *distans* 400, XV, 185.

— *pruinosa* Jatta, 1658, XXIII, 227.

Acetabula calyx Sacc., 1825, XXV, 228.

— *leucomelas* Boud., 1824, XXV, 228.

— *sulcata* Fuck., 1824, XXV, 228.

— Pers., 1825, XXV, 228.

— *vulgaris* Fuck., 139, XI, 89.

Achnanthes brevipes var. *intermedia* Cleve, 1206, XX, 25.

— *Haynaldi* Schaarschm., 1008, XIX, 406.

— *lanceolata* Bréb., 1008, XIX, 405.

— — Grunow, 1844, XXV, 235.

— — Bréb. var. *Haynaldi* Cleve 1008, XIX, 406.

— *quadricauda* Turp., 638, XVI, 75.

Achnanthidium flexellum Bréb., 534, XV, 201.

— *lanceolatum* Cleve, 1008, XIX, 405.

Acidium griseum Wallr., 1833, XXV, 230.

Acolea concinnata Dum., 691, XVI, 88.

Acolium Bolanderi Tuck., 1647, XXIII, 224.

— *californicum* Tuck., 1952, XXVI, 169.

— *inquinans* Mass., 352, XIII, 461.

— *lucidum* Rabh., 172, XI, 96.

— *tympanellum* De Not., 352, XIII, 461.

— — *a. inquinans* Körb., 352, XIII, 461.

— *viridulum* De Notar., 1872, XI, p. 96.

Acrocordia biformis Stein f. *dealbata* Sydow, 375, XIII, p. 466.

Acrocordia conoidea Körb. f. *cuprea* Anzi, 376, XIII, 467.

— — *a. vulgaris* Garov., 376, XIII, 467.

— *epipolaea* Mass., 376, XIII, 467.

— *Garovaglii* f. *cuprea* Mass., 376, XIII, 467.

— *macrospora* Mass., 178, XI, 97.

— *polycarpa* Körb., 375, XIII, 467.

— — f. *dealbata* Lahm, 375, XIII, 467.

Acrocladium cuspidatum Lindb., 1284, XX, 45.

Acroporium brevi-cuspidatum Mitt., 1599, XXII, 123.

Acrospermum compressum Tode, 1435, XXII, 89.

Actinobotrys Tulasnei Hoffm., 1195, XX, 22.

Actinonema Crataegi Pers., 1473, XXII, 96.

— *Rosae* Fries, 212, XII, 80; 212b, XXIV, 278.

Actinopelte Theobaldi Stzbg., 43, IX, 130.

Aecidium abietinum Alb. et Schwein., 1132, XX, 10; 1707, XXIV, 271.

— *Annagallidis* Karl, 923, XIX, 385.

— *argentatum* Schultz, 33, IX, 128.

— *Baumannum* P. Henn., 712, XVII, 260.

— *Berulae* Bubák, 910, XIX, 382.

— *bifrons a. Aconiti* *Lycocotoni* DC. et Lam., 1702, XXIV, 270.

— *bifrons* DC. var. *Violarum* Wallr., 1409, XXII, 83.

— *Calystegiae* Desm., 1119, XX, 6.

— *carotinum* Bubák, 910, XIX, 382.

— *Chaerophylli* Kirchn., 1121, XX, 7.

— *Cichoriacearum* DC., 917, XIX, 383.

— — var. *Tragopogi pratensis* Desm., 917, XIX, 383.

— *Clematidis* DC. et Lam., 1705, XXIV, 270.

— — Schwein., 1705, XXIV, 270.

— *columnare* Alb. et Schwein., 816, XVIII, 353.

— *Compositarum* Mart. var. *Prenanthis* Wallr., 1408, XXII, 83.

- Aecidium confertum* β . *Violae odoratae* DC., 1409, XXII, 83.
 — *Convallariae* Schum., 1122, XX, 7.
 — *Convolvulacearum* Ces., 1119, XX, 6.
 — *Convolvuli* Sacc., 1119, XX, 6.
 — *Cytisii* Voss, 1404, XXII, 82.
 — *dubium* Clint., 1119, XX, 6.
 — *Epilobii* DC., 923, XIX, 385.
 — *Erythronii* Corda, 912, XIX, 382.
 — *Euphorbiae* Gmel., 1417, XXII, 85.
 — — *Gerardianae* E. Fischer, 1302, XXI, 205.
 — *Falcariae* Pers., 916, XIX, 383.
 — *flavum* Bon., 1122, XX, 7.
 — *fulgens* Hazsl., 1404, XXII, 82.
 — *fuscum* Pers., 918, XIX, 384.
 — *Gentianae* Jacq., 1118, XX, 6.
 — *Glaucis* Doz. et Molk., 910, XIX, 382.
 — *Hippuridis* Kunze, 910, XIX, 382.
 — *hyalinum* Bon., 1705, XXIV, 270.
 — *leucostictum* Berk. et Curt., 1902, XXVI, 156.
 — *Majanthae* Schum., 1122, XX, 7.
 — *Menthae* DC., 1303, XXI, 205.
 — *nigrum* Bon., 917, XIX, 383.
 — *pallidum* Schneider, 923, XIX, p. 385.
 — *Pastinacae* Rostr., 910, XIX, 382.
 — *Pentastemoniatum* Schw., 1412, XXII, 84.
 — *Pentastemonis* Schw., 1412, XXII, 84.
 — *Peucedani* Voss, 807, XVIII, 351.
 — *Phaseolorum* Wallr., 13, IX, 125.
 — *Phlomidis* Thüm., 928, XIX, 386.
 — *Pirolae* Gmel., 935, XIX, 389.
 — *Podophylli* Schwein., 1414, XXII, 85.
 — *Podospermi* Bunge, 1125, XX, 8.
 — *Prenanthis* β . *Prenanthis purpureae* DC., 1408, XXII, 83.
 — *Primulae* Corb., 913, XIX, 382.
 — — DC., 913, XIX, 382.
 — *Ranunculacearum* DC., 1305, XXI, 205.
 — — var. *Clematidis* DC. et Lam., 1705, XXIV, 270.
 — *Rechingeri* Bubák, 1137, XX, 11.
 — *rhytismoides* Racib., 1709, XXIV, 271.
 — *rhytismoideum* Berk. et Br., 1709, XXIV, 271.
 — *rubellum* Gmel., 1415, XXII, 85.
 — *Scorzonerae laciniatae* DC., 1125, XX, 8.
 — *Scrophulariae* DC., 16, IX, 125.
 — *Sii falcariae* Pers., 916, XIX, 383.
 — *Sii latifolii* Wint., 910, XIX, 382.
 — *strobilinum* Rees, 934, XIX, 388.
 — *Thesii* Desv., 811, XVIII, p. 352.
 — *Thymi* Fuck., 919, XIX, 384.
 — *Tinneae* P. Henn., 711, XVII, 260.
 — *Tragopogii* Pers., 917, XIX, 383.
 — *Urticae* Schum., 1411, XXII, 84.
 — *Valerianearum* Duby, 1103, XX, 2.
 — *Verbasci* Ces., 16, IX, 126; 911, XIX, 382.
 — *verrucosum* Schultz, 803, XVIII, 350.
Aecidium Violae Schum., 1409, XXII, 83.
 — *Violarum* DC., 1409, XXII, 83.
Aegagropila Sauteri Kütz., 636, XVI, 73.
Aerobryopsis longissima Fleisch., 1295, XX, 46.
 — — Fleisch. var. *densifolia*, forma *robusta* Fleisch., 1296, XX, 47.
Aerobryum javanicum C. Müll., 1794, XXIV, 290.
Agaricus alliaceus Jacq., 304, XIII, 444.
 — *alneus* L., 1604, XXIII, 214.
 — *alternatus* Schum., 306, XIII, 444.
 — *Bryorum* Lasch., 947, XIX, 391.
 — *Campanella* Batsch, 949, XIX, 391.
 — *campanulatus* L., 1424, XXII, 87.
 — *carbonarius* Batsch, 1424, XXII, 87.
 — *caulicinalis* Bull., 1145, XX, 13.
 — *cirrhatum* Pers., 1425, XXII, 87.
 — *cyathiformis* Bull., 1423, XXII, 87.
 — *dealbatus* Sowerb., 1606, XXIII, 214.
 — (trib. *Hypholoma*) *fascicularis* Fries, 610, XVI, 65.
 — *fascicularis* Huds., 610, XVI, 65.
 — (subg. *Hypoloma*) *fascicularis* Wint., 610, XVI, 65.
 — *geotropus* Bull., 1715, XXIV, 272.
 — *laccatus* Scop., 301, XIII, 443.
 — *lepideus* Fries, 1605, XXIII, 214.
 — *mutabilis* Huds., 948, XIX, 391.
 — *mycenopsis* Fries, 947, XIX, 391.
 — *nigripes* Schrad., 1809, XXV, 225.
 — *papilionaceus* Fries, 1424, XXII, 87.
 — *quercinus* L., 312, XIII, 445.
 — *ramealis* Bull., 303, XIII, 444.
 — *Rotula* Scop., 1809, XXV, 225.
 — *Sainsonii* Lév., 1422, XXII, 86.
 — *scabellus* Alb. et Schwein., 1145, XX, 13.
 — *stipularius* Fries, 1145, XX, 13.
 — *tuberosus* β . *cirrhatum* Pers., 1425, XXII, 87.
 — *velutipes* Curt., 948, XIX, 391.
Aglaophyllum delicatulum Kütz., 645, XVI, 77.
 — *ocellatum* Kütz., 645, XVI, 77.
Aglaospora thelebola Tul., 1315, XXI, 207.
Aldona stella-nigra Racib., 1724, XXIV, 274.
Alectorica cana f. *rubescens* Arn., 1048, XIX, 418.
 — *canariensis* Ach., 769, XVII, 276.
 — *chalybeiformis* (L.), 1976, XXVI, 177.
 — *crinalis* Ach., 574, XV, 210.
 — *divergens* Nyl., 1554, XXII, 115.
 — *Fremontii* Tuck., 1878, XXV, 247.
 — *implexa* Ach. var. *fuscidula* Arn., 1048, XIX, 418.
 — — f. *rubens* Kernst., 1048, XIX, 418.
 — *jubata* Nyl., 1879, XXV, 247.
 — — var. *Fremontii* Boist., 1878, XXV, 247.
 — — var. *prolixa* Ach., 1879, XXV, 247.
 — *lanata* * *A. minuscula* Nyl., 1971, XXVI, 175.
 — — f. *A. minuscula* Leight., 1971, XXVI, 175.
 — *minuscula* Nyl., 1971, XXVI, 175.

- Alectoria nidulifera* Nyl., 1976, XXVI, 177.
 — — var. *simplicior* Wain., 1977, XXVI, 177.
 — *prolixa* Nyl., 1879, XXV, 247.
 — — Ach., 1976, XXVI, 177.
 — *taeniata* Fée, 1050, XIX, 419.
 — *thrausta* Ach., 574, XV, 210.
 — *usneoides* Ach., 1050, XIX, 419.
Aleuria aurantia Fuck., 1823, XXV, 228.
 — *cupularis* Gill., 1730, XXIV, 275.
 — *eximia* Gill., 529, XV, 199.
 — *leucoloma* Gill., 1618, XXIII, 217.
 — *leucomelas* Gill., 1824, XXV, 228.
 — *omphalodes* Gill., 1930, XXVI, 161.
 — *pseudotrechispora* Höhn., 1619, XXIII, 217.
 — *xanthomela* Gill., 1449, XXII, 92.
Alicularia compressa Gotsch., 388, XIII, 470.
 — *scalaris* Corda, 91, IX, 141.
Aloina aloides Kindb., 497, XV, 192.
Alphitomorpha comata Wallr., 1311, XXI, 207.
 — *penicillata* Wallr., 128, XI, 87.
 — — *β. grossulariae* Wallr., 125, XI, 86.
 — *tortilis* Wallr., 129, XI, 87.
 — *tridactyla* Wallr., 118, XI, 84.
Amblystegium curvicaule Dix. et Jam., 685, XVI, 87.
 — *filicinum* De Not., 1786, XXIV, 289.
 — *fluviatile* Bryol. Europ., 686, XVI, 88.
 — *riparium* Bryol. Europ., 300, XII, 98.
 — *Sprucei* Bryol. Europ., 1389, XXI, 225.
Amobryum filiforme Huds., 1076, XIX, 424.
Amphidium Mougeotii Schimp., 1084, XIX, 425; 1084 b, XX, 47.
Amphiloma callopismum Körb., 1256, XX, 39.
 — *granulosum* Müll. Arg., 1056, XIX, 420.
 — *plumbeum* Hepp., 357, XIII, 462.
 — *triptophyllum* Hepp., 358, XIII, 462.
Amphisphaeria alpigena Fuck., 1722, XXIV, 274.
Amphoridium Mougeotii Schimp., 1084, XIX, 425.
Anabaena allantospora Montagne, 1004, XIX, 403.
 — (*Trichormus*) *indica* G. Beck, 223, XII, 82.
 — *macrosperma* var. *major* Hansg., 1205, XX, 25.
 — *oscillarioides* Bory, 1204, XX, 24.
 — *torulosa* Lagerh., 1206, XX, 25.
 — *variabilis* Kütz. f. *mareotica* Hansg., 1004, XIX, 403.
Anacolia Webbii Schimp., 1090, XIX, 426.
Ancistrodesmus fusciformis Corda, 80, IX, 139; 534, XV, 201.
Ancylistes Pfeifferi G. de Beck, 201, XII, 75.
Andreaea petrophila Ehr., 886, XVIII, 373.
Anema Notarisii Forss., 380, XIII, 468.
Aneura multifida Dum., 1672, XXIII, 231.
Aneura pinguis Dum., 1671, XXIII, 231.
Anoetangium compactum Schwäg., 487, XV, 190.
 — *Hornschuchianum* Funck, 1263, XX, 41.
 — *Sendtnerianum* Bryol. Europ., 1264, XX, 42.
Anomobryum filiforme Husnot, 1087, XIX, 425.
 — *juliforme* C. de Solms Laub., 1088, XIX, 425.
Anomodon apiculatus Bruch, 600, XV, 214.
 — *attenuatus* Hüb., 1091, XIX, 426.
 — *longifolius* Buch., 1282, XX, 44.
 — *rostratus* Schimp., 896, XVIII, 374.
 — *Rugelii* Keissl., 600, XV, 214.
 — *viticulosus* Hook., 795, XVII, 280.
 — *viticulosus* 1882, XXV, 249.
Antennaria cellaris Fries, 1200, XX, 23.
Anthelia julacea Dum., 1982, XXVI, 179.
Anthoceras laevis L., 882, XVIII, 372.
 — *punctata* L., 881, XVIII, 372.
Anthostoma alpigenum Sacc., 1722, XXIV, 274.
 — *arcophilum* Sacc., 1722, XXIV, 274.
 — *turgidum* Nitschke, 1431, XXII, 88.
Anthracoidea Caricis Brefeld, 908, XIX, 381.
 — *subinclusa* Bref., 1701, XXIV, 269.
Anthracothecium libricolum Müll. Arg., 1357, XXI, 219.
Antithamnion crispum Thur., 648, XVI, 78.
 — *cruciatum* Naeg., 1759, XXIV, 282; 1759 b, XXV, 237.
 — *Plumula* Thur., 1848, XXV, 236.
 — — *β. crispum* Hauck, 648, XVI, 87.
Aongstroemia euphoroclada C. Müll., 1591, XXII, 122.
 — *longipes* Bryol. Europ., 195, XI, 100.
Aphanizomenon flos aquae Ralf., 1005, XIX, 403.
Aphanocapsa cruenta Hansg., 343, XIII, 458.
 — *montana* Cram., 228, XII, 84; 1342, XXI, 213.
 — — Cram. *α. macrococca*, *β. micrococca*, 146, XI, 90.
Aphanothece microspora Rab., 146, XI, 90.
 — *pallida* Rab., 146, XI, 90.
Aplozia cordifolia Dum., 475, XV, 188.
 — *crenulata* Dum., 272, XII, 94.
 — — var. *gracillima* Hook., 273, XII, 94.
 — *lurida* Dum., 1372, XXI, 222.
 — *pumila* Dum., 275, XII, 95.
 — *sphaerocarpa* Dum. var. *flaccida* Schiffn., 1371, XXI, 222.
 — *sphaerocarpoidea* Dum., 692, XVI, 89.
Aporia obscura Duby, 1161, XX, 16.
Arcyria albida Pers., 407, XV, 170.
 — *cinerea* Pers., 407, XV, 170.
 — *punicea* Pers., 408, XV, 170.

- Arthonia* (sect. *Pachnolepia*) *caesia* Arn., 61, IX, 134.
 — *caesiolivens* Nyl., 61, IX, 134.
 — *cinnabarina* Wallr., 1222, XX, 29.
 — *difformis* Nyl., 1857, XXV, 240.
 — *dispersa* f. *rhododendri* Arn., 175, IX, 97.
 — *gibberulosa* Hepp., 1858, XXV, 240.
 — *gregaria* Körb., 1222, XX, 29.
 — *lurida* var. *spadicea* Nyl., 370, XIII, 464.
 — — var. *vulgaris* Almqu., 174, XI, 96; 174 b, XXIII, 231.
 — *mediella* Nyl., 371, XIII, 465; 371 b, XXIII, 231.
 — *punctiformis* f. *quadriseptata* Ohl., 553, XV, 206; 553, XV, 206.
 — *ruanidea* Nyl., 442, XV, 181.
 — *sordaria* Körb., 371, XIII, 465.
 — *spadicea* Leight., 370, XIII, 464.
 — *spectabilis* Fw., 1857, XXV, 240.
Arthopyrenia (sect. *Euarthopyrenia*) *analepta* Arn., 1523, XXII, 108.
 — *analepta* β . *fallax* Bagl. et Carest., 268, XII, 93.
 — *Arnoldi* A. Zahlbr., 656, XVI, 80.
 — *arthonoides* Mass., 68, IX, 136.
 — (sect. *Acrocordia*) *biformis* Müll. Arg., 375, XIII, 467.
 — *cinerascens* Mass., 1764, XXIV, 284.
 — *cinereopruinosa* (Schaer.), 651, XVI, 81.
 — *epidermidis* η . *atomaria* Mudd., 468, XV, 186.
 — *fallax* Arn., 268, XII, 93; 268 b, XIII, 468.
 — — var. *conspurcata* Stnr., 269, XII, 94.
 — — f. *crataeginea* Stnr., 1763, XXIV, 283.
 — *Kelpii* Körb., 469, XV, 187; 469 b, XX, 41.
 — *microspila* Kbr., 67, IX, 136.
 — *myricae* A. Zahlbr., 861, XVIII, 365.
 — *nitida* H. Oliv., 862, XVIII, 366.
 — — var. *nitidella* H. Oliv., 1854, XXV, 238.
 — *oxyspora* Oliv., 1353, XXI, 218.
 — (sect. *Euarthopyrenia*) *platypyrenia* A. Zahlbr., 1355, XXI, 218.
 — *punctiformis* var. *atomaria* A. Zahlbr., 468, XV, 186; 468 b, XXIV, 287; 468 c, XXII, 117.
 — *rhyponia* Mass., 1021, XIX, 410.
 — (sect. *Euarthopyrenia*) *tichothecioides* Arn., 1356, XXI, 218.
Arthopyreniella *cinerascens* Stnr., 1764, XXIV, 284.
Arthothelium *ruanideum* Arn., 443, XV, 181.
 — *spectabile* Mass., 1857, XXV, 239.
Arthotrichum *sulcatum* Hook. et Grev., 1593, XXII, 122.
Arthrimum *curvatum* Kze. et Schm., 1627, XXIII, 218.
Arthrodesmus *incus* Hass., 1009, XIX, 406.
Arthrodesmus *incus* Hass. f. *isthmosa* Heimerl, 1009, XIX, 407.
 — *quadricaudatus* Ehrenb., 638, XVI, 75.
Arthrodia *directa* Kuntze, 852, XVIII, 362.
Arthrosiphon *alatus* Rabenh., 746, XVII, 270.
 — *Grevillii* Kütz., 746, XVII, 270.
Ascobolus *carneus* Pers., 952, XIX, 392.
 — *coronatus* Schum., 209, XII, 80.
 — *testaceus* Berk., 1450, XXII, 92.
 — *Trifolii* Bernh., 1438, XXII, 90.
Ascochyta *Caricis* Fuck., 410, XV, 171.
 — *Chelidonii* Lib., 417, XV, 172.
 — *fragariae* Lasch., 1834, XXV, 231.
 — *ribesia* Sacc. et Trautv., 1329, XXI, 210.
Ascophanus *carneus* Bond., 952, XIX, 392.
 — *testaceus* Phill., 1450, XXII, 92.
Ascospora *Aegopodii* de Thüm., 833, XVIII, 357.
 — *carpineae* Fries, 1313, XXI, 207.
 — *pulverulenta* Riess, 934, XIX, 388.
Aspicilia *argillacea* Anzi, 459, XV, 185.
 — *atrocinerea* Mass., 448, XV, 182.
 — *calcareae* * *farinosa* Körb., 1776, XXIV, 286.
 — *farinosa* Arn., 1776, XXIV, 286.
 — *flavida* Arn., 459, XV, 185.
 — *gibbosa* α . *vulgaris* Körb., 164, XI, 94.
 — *micrantha* Körb., 459, XV, 185.
 — *ochracea* Mudd., 459, XV, 185.
 — *psoroides* Anzi, 56, IX, 133.
 — *tenebrosa* Körb., 448, XV, 182.
 — *verrucosa* Körb., 254, XII, 91.
Asterella *fragrans* Trev., 282, XII, 96.
Asteroma *atratum* Chev., 920, XIX, 385.
 — *Rosae* Libert, 212, XII, 80.
 — *Solidaginis* Chev., 920, XIX, 385.
Asteroxanthium *furcatum* Kütz., 639, XVI, 76.
Astomum *crispum* Hampe, 1376, XXI, 223.
Astrodonium *canariense* Schwgr., 792, XVII, 280.
Astroplaca *opaca* Bagl., 54, IX, 133.
Atrichium *angustatum* Bryol. Europ., 1585, XXII, 121.
 — *Hausknechtii* Jur. et Milde, 1785, XXIV, 289.
 — *tenellum* Bryol. Europ., 1889, XXV, 250.
 — *undulatum* P. de Beauv., 1784, XXIV, 288.
Aulacographa *elegans* Leight., 369, XIII, 464.
Aulacomnium *androgynum* Schwgr., 1686, XXIII, 233.
 — *turgidum* Schwgr., 1386, XXI, 224.
Auricularia *ferruginea* Bull., 1307, XXI, 206.
 — *sambucina* Mart., 1419, XXII, 86.
 — *tabacina* Sow., 1141, XX, 12.
Avrainvillea *comosa* Murr. et Bood., 1349, XXI, 216.
Bacidia (sect. *Eubacidia*) *albescens* Zwackh, 1233, XX, 32.
 — *atrosanguinea* β . *muscorum* Th. Fries, 54, IX, 133.

Bacidia coerulea Körb., 753, XVII, 273.
 — (sect. *Eubacidia*) *corticola* Dalla T. et Sarnth., 1234, XX, 33.
 — *endoleuca* Kickx, 258, XII, 91.
 — *Frieseana* Körb., 753, XVII, 272.
 — *holomaelaena* c. *corticicola* Anzi, 1234, XX, 33.
 — (sect. *Eubacidia*) *incompta* Anzi, 1361, XXI, 219.
 — — — *f. prasina* Lahm, 1361, XXI, 220.
 — *mollis* Th. Fries, 1361, XXI, 220.
 — *muscorum* Arn., 54, IX, 133.
 — (sect. *Weitenwebera*) *Nitschkeana* A. Zuhlbr., 1232, XX, 32.
 — *phacodes* Körb., 1233, XX, 33.
 — *rubella* Mass., 558, XV, 207; 558b, XVIII, 373.
 — *umbrina* β. *corticicola* Bausch, 1234, XX, 33.
Bacillaria Ulna Nitzsch., 544, XV, 201.
Baeomyces aeruginosus DC., 360, XIII, 463.
 — *bellidiflorus* Ach., 1032, XIX, 414.
 — *caespiticius* Pers., 153, XI, 92.
 — *calycioides* Mass., 1838, XXV, 232.
 — *ericetorum* DC., 559, XV, 207.
 — — *Wainio*, 360, XIII, 462.
 — *icmadophilus* Nyl., 360, XIII, 463.
 — *roseus* Pers., 559, XV, 207; 243, XII, 88.
 — *turbidatus* ζ. *B. crispatus* Ach., 1362, XXI, 220.
Bambusina Brébissonii Kütz., 78, IX, 138.
Bangia atropurpurea Ag., 741, XVII, 268; 741 c, XX, 28; 741 d, XXV, 237; 744, XVII, 269; 1344, XXI, 215.
 — *ferruginea* Rabenh., 741, XVII, 268.
 — *roseo-purpurea* Rabenh., 741, XVII, 268.
Barbella amoena Broth., 1793, XXIV, 290.
 — *javanica* Broth., 1794, XXIV, 290.
Barbula convoluta Hedw., 495, XV, 191.
 — *crocea* Web. et Mohr, 496, XV, 191.
 — *fallax* Hedw., 1272, XX, 43.
 — *flavipes* Bryol. Europ., 293, XII, 97.
 — *gigantea* Funck, 1270, XX, 43.
 — *javanica* Dozy et Molkb., 1395, XXI, 226.
 — *nervosa* Brid., 498, XV, 192.
 — *nitida* Jur., 889, XVIII, 373.
 — *paludosa* Schleich., 496, XV, 191.
 — *revoluta* Brid., 891, XVIII, 373.
 — *squarrosa* Brid., 196, XI, 101.
 — *subulata* P. de Beauv., 1273, XX, 43.
 — *unguiculata* Hedw., 1271, XX, 43.
Barlaea epichrysea Sacc., 1731, XXIV, 276.
Bartamia calcarea Bryol. Europ., 1886, XXV, 249.
 — *Halleriana* Hedw., 98, IX, 142; 98b, XV, 215.
 — *pomiformis* Roth, 589, XV, 213; 589b, XVI, 90.
Batrachosperma ceratophyta Bory, 1016, XIX, 409.
Batrachospermum affine Kütz., 1016, XIX, 409.
 — *ectocarpum* 744, XVII, 269.

Batrachospermum glomeratum Vauch., 85, IX, 140; 841, XVIII, 359.
 — *moniliforme* Roth, 90, IX, 141.
 — — — var. *condensatum* Kütz., 90, IX, 141.
 — — — var. *confusum* Rabenh., 90, IX, 141.
 — — — var. *giganteum* Kütz., 90, IX, 141.
 — — — var. *helmintorum* Sir., 90, IX, 141.
 — — — var. *pulcherrimum* Kütz., 643, XVI, 77.
 — — — var. *typicum* Sir., 1219, XX, 28.
 — — — var. *vagum* Roth, 1016, XIX, 409.
 — *sporulans* Sir., 643, XVI, 77.
 — *vagum* Ag. var. *ceratophytum* Sir., 1016, XIX, p. 409.
 — *virgato-Decaisneanum* Sir. var. *cochleo-philum* Teod., 1754, XXIV, 281.
Baxxania triangularis Lindb., 477, XV, 189.
 — — — var. *implexa* Nees, 1883, XXV, 249.
 — *trilobata* S. Gray, 386, XIII, 469.
Belonia torulosa Car., 1206, XX, 25.
Belonidium ochroleucum Bres., 722, XVII, 263; 722, XVIII, 359.
 — *pruinum* Rehm, 723, XVIII, 263.
Belonium pineti Rehm, 1166, XX, 17; 1166b, XXVI, 164.
Belonioscypha ciliatospora Rehm, 528, XVIII, 359.
Bérangeria polyspora Trev., 662, XVI, 83.
Bertia moriformis De Not., 615, XVI, 66.
Bescherellea brevifolia Hampe, 1900, XXV, 251.
Biatora aeneofusca Arn., 168, XI, 95.
 — *asserculorum* Arn., 1532, XXII, 110.
 — — — β. *corticola* Hepp, 1234, XX, 33.
 — *atrogrisea* Del., 258, XII, 92.
 — *coerulea* Flagey, 1969, XXVI, 174.
 — *decipiens* E. Fr., 1767, XXIV, 284.
 — *Ehrhartiana* Mass., 1231, XX, 32.
 — *endoleuca* Nyl., 258, XII, 91.
 — *ferruginea* δ. *fuscoatra* Bayrh., 46, IX, 131.
 — — *russula* Eschw., 1030, XIX, 414.
 — *flexuosa* E. Fries, 260, XII, 92.
 — *Frieseana* Hepp, 753, XVII, 273.
 — *gelatinosa* var. *aeneofusca* Flw., 168, IX, 95.
 — *geophana* Th. Fries, 365, XIII, 463.
 — (*Lecanora*?) *Ghisleri* Arn., 1227, XX, 31.
 — *globulosaeformis* Hepp, 371, XIII, 465.
 — *granulosa* Mass., 261, XII, 92.
 — *huxariensis* Beckh., 363, XIII, 463.
 — *hypnophila* β. *chlorococca* Graewe, 752, XVII, 272.
 — *leucoplaca* Hepp, 1650, XXIII, 225.
 — *mollis* Stein, 1955, XXVI, 169.
 — *Nylanderii* Anzi, 167, XI, 95.
 — *olivacea* E. Fries, 864, XVIII, 366.
 — *polytropa* var. *intricata* E. Fries, 762, XVII, 274.
 — *psoroides* Hepp, 56, IX, 133.
 — *pusilla* Norm., 1228, XX, 31.

- Biatora pullata* Norm., 1228, XX, 31.
 — *rivulosa* f. *corticola* E. Fries, 364, XIII, 463.
 — — *β. mollis* Th. Fries, 1955, XXVI, 169.
 — *russula* Tuck., 1030, XIX, 414.
 — *sylvana* var. *Rhododendri* Hepp, 453, XV, 183.
 — *turgidula* Hepp, 1229, XX, 31.
 — *uliginosa* E. Fries, 259, XII, 92.
 — *Ungeri* Hepp, 864, XVIII, 366.
 — *viridescens* E. Fries, 1230, XX, 32.
 — — var. *putrida* KÖrb., 1230, XX, 32.
Biatorella geophana Strass., 365, XIII, 464.
 — (sect. *Sarcogyne*) *latericola* Stnr., 1657, XXIII, 226.
 — — *pruinosa* Mudd, 1658, XXIII, 227.
Biatorina cyrtella KÖrb., 1550, XXII, 114.
 — *diluta* Th. Fries, 1028, XIX, 430.
 — *Ehrhartiana* Stein., 1231, XX, 32.
 — *grossa* Mudd, 1650, XXIII, 225.
 — *Michelettiana* Mass., 864, XVIII, 366.
 — *pineti* Mass., 1028, XIX, 413.
 — *proteiformis* var. *Rabenhorstii* Mass., 458, XV, 184.
 — *vesicularis* Jatta, 754, XVII, 273.
Biatorinopsis diluta Müll. Arg., 1028, XIX, 413.
Bilimbia abietina H. Oliv., 556, XV, 20.
 — *albicans* Arn., 165, XI, 94.
 — *chlorococca* Th. Fries, 752, XVII, 272.
 — *coprodes* KÖrb., 657, XVI, 83.
 — — *α. normalis* Th. Fries, 657, XVI, 83.
 — *leucoblephara* Arn., 865, XVIII, 366.
 — *ligniaria* Arn., 658, XVI, 83.
 — *marginata* Arn., 865, XVIII, 366.
 — *melaena* Arn., 362, XIII, 463.
 — *micromma* var. *annulata* Arn., 865, XVIII, 366.
 — *milliaria α. lignaria* Th. Fries, 658, XVI, 83.
 — *Nitschkeana* Lahm, 1232, XX, 32.
 — *obscurata* Th. Fries, 656, XVI, 82.
 — *syncomista* KÖrb., 658, XVI, 83.
Binatella muricata Bréb., 541, XV, 203.
 — *tumida* Bréb., 853, XVIII, 362.
Blastenia arenaria var. *percrocata* Arn., 465, XV, 186.
 — *assigena* Lahm, 1255, XX, 39.
 — *caesiorufa* Arn., 250, XII, 90.
 — *Lallavei* Mass., 253, XII, 90.
 — *ochracea* A. Zahlbr., 166, XI, 94.
 — *percrocata* Arn., 465, XV, 186.
 — *Pollinii* Mass., 1557, XXII, 115.
Blastodesmia nitida Mass., 69, IX, 136.
Blepharoxia ciliaris Dum., 1065, XIX, 422.
 — — *β. pulcherrima* 478, XV, 189.
Blindia acuta Bryol. Europ., 781, XVII, 278.
Blyttia Mörckii Nees, 384, XIII, 469.
Boletus abietinus Dicks., 316, XIII, 446.
 — *adustus* Willd., 308, XIII, 445.
 — *applanatus* Pers., 940, XIX, 390.
 — *coriaceus* Huds., 945, XIX, 390.
 — *ferruginosus* Schrad., 944, XIX, 390.
Boletus fomentarius L., 310, XIII, 445.
 — *giganteus* Pers., 1144, XX, 13.
 — *hispidus* Bull., 309, XIII, 445.
 — *imbricatus* Bull., 609, XVI, 65.
 — *linguacervina* Schrank, 945, XIX, 391.
 — *obliquus* Pers., 1603, XXIII, 214.
 — *odoratus* Wulf., 311, XIII, 445.
 — *perennis* L., 606, XVII, 65.
 — *sulphureus* Bull., 945, XIX, 390.
 — *ungulatus* Schaeff., 939, XIX, 390.
 — *unicolor* Bull., 313, XIII, 445.
Botrydium argillaceum Wallr., 88, IX, 140.
 — *granulatum* Grev., 88, IX, 140.
 — — Rostr. et Wor., 1637, XXIII, 221.
 — *Wallrothii* Kütz., 1637, XXIII, 221.
Botryococcus Braunii Kütz., 734, XVII, 266.
Botryocystis morum Kütz., 338, XIII, 456.
Botrytis capsularum Bresad. et Vestergr., 1185, XX, 21.
 — *effusa* Grev., 1829, XXV, 229.
 — *epiphylla* Pers., 1829, XXV, 229.
 — *farinosa* Fries, 1829, XXV, 229.
 — *ganglioniformis* Berk., 1195, XX, 22.
 — *geminata* Ung., 1195, XX, 22.
 — *grisea* Fries, 1833, XXV, 231.
 — *haplaria* Corda, 1833, XXV, 231.
 — *Lactucae* Ung., 1195, XX, 22.
 — *macrospora* Ung., 605, XVI, 64.
 — *nivea* Ung., 605, XVI, 64.
 — (*Tetradium*) *sonchicola* Schlechtld., 1195, XX, 22.
 — *viticola* Berk. et Curtis, 113, XI, 84.
Bovista plumbea Pers., 1608, XXIII, 215.
 — *pusilla* Pers., 1608, XXIII, 215.
Brachymenium melanothecium Jacqu., 1797, XXIV, 291.
 — *nepalense* Hook., 1396, XXI, 226.
Brachysteleum polyphyllum Hornsch., 1083, XIX, 225.
Brachythecium rivulare var. *Schmidleanum* Bauer, 800, XVII, 281.
Braunfelsia scariosa Paris, 1691, XXIII, 234.
Braunia alopecura Limpr., 786, XVII, 279;
 779, XVII, 278.
 — *sciuroides* 786, XVII, 279.
Bremia Lactucae Reg., 1195, XX, 22.
Bryopogon jubatum β. prolixum KÖrb., 1879, XXV, 247.
Bryum acutum Huds., 781, XVII, 278.
 — *albidum* L., 674, XVI, 86.
 — *alpinum* Schleich., 587, XV, 212.
 — *apocarpum* 500, XV, 192.
 — *argenteum* L., 1276, XX, 43.
 — *bartramioides* Hook., 1698, XXIII, 235.
 — *bimum* Schreb., 586, XV, 212.
 — *Bornmülleri* Ruthe, 1684, XXIII, 233.
 — *caepititicium γ. imbricatum* Bryol. Europ., 1783, XXIV, 288.

- Bryum capillare* L., 1385, XXI, 224.
 — L. var. *flaccidum* Bryol. Europ., 1685, XXIII, 233.
 — *contortum* Wulf., 892, XVIII, 373.
 — *cuneifolium* Dicks., 1884, XXV, 249.
 — *Duvalii* Voit, 1277, XX, 44.
 — *fasciculare* 1081, XIX, 424.
 — *filiforme* 1087, XIX, 425.
 — *flexuosum* L., 1676, XXIII, 232.
 — *glaucum* L., 489, XV, 190.
 — *heteromallum* Döll, 288, XII, 986.
 — *juliforme* Schimp., 1088, XIX, 425.
 — *Kunzei* Hornsch., 1783, XXIV, 288.
 — *marginatum* Dicks., 588, XV, 213.
 — *melanothecium* C. Müll., 1797, XXIV, 291.
 — *murale* Wils., 1579, XXII, 120.
 — *neodamense* Itzigs., 1284, XX, 45.
 — *nutans* Schreb., 894, XVIII, 374.
 — *pallens* Sw., 895, XVIII, 374; 895 b, XXIII, 236.
 — *pallidum* Schreb., 1267, XX, 42.
 — *polyphyllum* Dicks., 1083, XIX, 425.
 — *poniforme* L., 589, XV, 213.
 — *punctatum* Schreb., 1279, XX, 44.
 — *pyriforme* L., 294, XII, 97.
 — *Reyeri* Breidl., 675, XVI, 86.
 — *rurale* L., 1681, XXIII, 233.
 — *Schleicheri* 587, XV, 212.
 — *setaceum* Huds., 495, XV, 191.
 — *squarrosum* L., 788, XVII, 279.
 — *subulatum* L., 1273, XX, 43.
 — *undulatum* L., 1784, XXIV, 288.
 — *unguiculatum* Huds., 1271, XX, 43.
 — *verticillatum* L., 485, XV, 190.
 — *viridissimum* Dicks., 1379, XXI, 223.
 — *viridulum* L., 484, XV, 190.
 — *Zierii* Dicks., 1089, XIX, 426.
Buellia aethalea Th. Fries, 1057, XIX, 421.
 — *anthracina* Anzi, 66, IX, 136.
 — *atroalbella* var. *aethalea* Oliv., 1058, XIX, 421.
 — (sect. *Catolechia*) *badia* Körb., 170, XI, 96.
 — *geographica* Tuck., 1235, XX, 33.
 — *grossa* Jatta, 1650, XXIII, 225.
 — *italica* var. *lactea* Mass., 59, IX, 134.
 — *lactea* Körb., 59, IX, 134.
 — *lepidastrum* Tuck., 764, XVII, 275.
 — *minutula* Arn., 57, IX, 133.
 — *nigerrima* Arn., 576, XV, 210.
 — *ocellata* Anzi, 1058, XIX, 421.
 — *polycarpa* Bagl., 265, XII, 93.
 — *radiata* Tuck., 1059, XIX, 421.
 — *Schaererii* De Not., 267, XII, 93; 267, XIII, 468.
 — *spuria* var. *lactea* Anzi, 59, IX, 134.
 — — *β. minutula* 57, IX, 133.
 — *stellulata* Mudd., 57, IX, 133.
 — *tergestina* Stein. et A. Zahlbr., 58, IX, 134.
 — *viridiatra* Oliv., 1236, XX, 34.
Bulgaria inquinans Fries, 525, XV, 198.
 — *polymorpha* Kern., 525, XV, 198.
Bullaria Umbelliferarum DC., 31, IX, 128.
Bunotea nitida Mass., 862, XVIII, 366.
Buxbaumia sessilis Schmidt, 593, XV, 213.
Byssus aurea L., 344, XIII, 458.
 — *barbata* Engl., 1339, XXI, 212.
 — *jolithus* L., 235, XII, 85.
 — *purpurea* Lam., 343, XIII, 458.
Caeoma Alii ursini Wint., 710, XVII, 260.
 — *Alliorum* Link, 710, XVII, 260.
 — *apiculatum* Corda, 1107, XX, 3.
 — — Link, 1118, XX, 6.
 — *Athamantharum* Link, 931, XIX, 388.
 — *Caricis* Link, 908, XIX, 381.
 — *Chelidonii* Magnus, 1114, XX, 4.
 — *Cichoriacearum* Schlecht., 917, XIX, 384.
 — *clematitatum* Schwein., 1705, XXIV, 270.
 — *Colchici* Schlecht., 906, XIX, 380.
 — *columnare* Link, 816, XVIII, 353.
 — *Conii* Mart., 929, XIX, 387.
 — *crassatum* Link, 1705, XXIV, 270.
 — *Dentariae* Link, 921, XIX, 385.
 — *destruens* Schlecht., 801, XVIII, 349.
 — *elegans* Schlecht., 1122, XX, 7.
 — *Epilobiatum* Link, 923, XIX, 385.
 — *Epilobii* Link, 923, XIX, 385.
 — *Erythronii* Corda, 912, XIX, 382.
 — *falcariae* Schlecht., 916, XIX, 383.
 — *falcariatum* Link, 916, XIX, 383.
 — *fumariae* Link, 1114, XX, 4.
 — *gentianae* Link, 1118, XX, 6.
 — (*Uredo*) *glumarum* Sorob., 1111, XX, 3.
 — *Helianthii* Schwein., 1407, XXII, 83.
 — *Helioscopiae* Schlecht., 1113, XX, 4.
 — *Hydrocotyles* Link, 806, XVIII, 350.
 — *Impatientis* Link, 33, IX, 128.
 — *longiusculum* Lasch., 1707, XXIV, 271.
 — *Mercurialis* Link, 1116, XX, 5.
 — — *perennis* Wint., 1116, XX, 5.
 — *oblongatum* Link, 812, XVIII, 352.
 — *obtegens* Link, 1130, XX, 9.
 — *onagrarium* Link, 705, XVII, 258; 1133, XX, 10.
 — *Oreoselini* Link, 808, XVIII, 351.
 — *Padi* Lib., 934, XIX, 388.
 — *Piceatum* Link, 1132, XX, 10; 1707, XXIV, 271.
 — *Pirolae* Schlecht., 935, XIX, 389.
 — *podophyllum* Schwein., 1414, XXII, 85.
 — *Primularum* Link, 913, XIX, 382.
 — *primulatum* Link, 913, XIX, 382.
 — *pseudocyperi* Link, 1411, XXII, 84.
 — *punctatum* Link, 1113, XX, 4.
 — *Ranunculaceatum* Link, 1712, XXIV, 270.
 — *Rhododendri* Link, 1132, XX, 10.
 — *Rosae* Schlecht., 708, XVII, 259.

- Caeoma rufum* Bonord., 1119, XX, 6.
 — *Scrophulariatum* Link, 16, IX, 126.
 — *segetum* Link, 9, IX, 122.
 — *suaveolens* Link, 1130, XX, 9.
 — *Thesii* Schlecht., 811, XVIII, 352.
 — *Tragopogonatum* Link, 917, XIX, 384.
 — *Umbellatarum* Wallr., 929, XIX, 387.
 — *Umbelliferarum* Link, 1121, XXI, 7.
 — *urceolorum* Schlecht., 908, XIX, 381.
 — *Vacciniorum* Link, 1418, XXII, 85.
 — *Veronicae* Link, 930, XIX, 387.
 — *vitalbatum* Link, 1705, XXIV, 270.
Calicium adpersum γ . *trabinellum* Schleich., 552, XV, 206.
 — *byssaceum* E. Fries, 173, XI, 96.
 — *chrysocephalum* Ach., 551, XV, 205.
 — *hyperellum* Ach., 64, IX, 135.
 — *hyrellum* Ach., 64 b, XXIII, 230.
 — *leucoloma* Pers., 352, XIII, 461.
 — *melanophaeum* Ach., 441, XV, 180.
 — *minutum* Arn., 1765, XXIV, 284.
 — *nigrum* β . *minutum* Körb., 1765, XXIV, 284.
 — — var. *pusillum* Schaer., 1525, XXII, 106.
 — *ornicolum* Stnr., 1856, XV, 239.
 — *phaeomelaenum* Tuck., 1031, XIX, 414.
 — *praecedens* Nyl., 1221, XX, 29; 1856, XXV, 239.
 — *pusillum* Floerk., 1525, XXII, 108.
 — *roscidum* var. *roscidulum* Nyl., 552, XV, 206.
 — — var. *trabinellum* Nyl., 552, XV, 206.
 — *subtile* Nyl., 1525, XXII, 108.
 — *trabinellum* Ach., 552, XV, 206; 552 b, XIX, 421.
 — *turbinatum* Pers., 351, XIII, 460.
 — *glonellum* β , *trabinellum* Ach., 552, XV, 206.
 — *viridulum* Schaer., 172, XI, 96.
Callithamnion cruciatum A. Z., 1759, XXIV, 282.
 — *Daviesii* J. Ag., 1751, XXIV, 281.
 — *floridulum* A. Z., 647, XVI, 78.
 — *macropterum* Menegh., 648, XVI, 79.
 — *Plumula* Lyngb., 1848, XXV, 236.
 — — β . *crispum* J. Ag., 648, XVI, 79.
 — *polyacanthum* Kütz., 648, XVI, 79.
 — *refractum* Kütz., 648, XVI, 79; 1848, XXV, 236.
 — *virgatulum* Harvey, 1751, XXIV, 281.
Callophyllis laciniata Kütz., 1757, XXIV, 282.
Callopisma Agardhianum Bagl. et Car., 879, XVIII, 371.
 — *assigenum* Lahm, 1255, XX, 39.
 — *cerinum* var. *stillicidiorum* Körb., 575, XV, 210.
 — *flavovirescens* Mass., 160, XI, 94.
 — *Lallavei* Mudd, 253, XII, 91.
 — *luteoalbum* Mass., 251, XII, 90.
 — *ochraceum* Mass., 166, XI, 95.
 — — α . *callosine* Krph., 166, XI, 95.
 — *pyraceum* Arn., 251, XII, 90.
Callopisma rubellinum Mass., 47, IX, 131.
 — *Schaereri* Arn., 1054, XIX, 420.
 — *vittelinulum* Arn., 1779, XXIV, 287.
Calloria chrysostigma Phill., 1439, XXII, 90.
 — *Jungermanniae* Quel., 1320, XXI, 208.
 — *tithymalina* Kunze, 524, XV, 198.
Calocladia Berberidis Lév., 127, XI, 87.
 — *comata* Lév., 1311, XXI, 207.
 — *Dubyi* Lév., 124, XI, 86.
 — *grossulariae* Lév., 125, XI, 86.
 — *Friesii* Lév., 128, XI, 87.
 — *Hedwigii* Lév., 128, XI, 87.
 — *holosericea* Lév., 126, XI, 86.
 — *penicillata* Lév., 128, XI, 87.
Calocylindrus palangula Kirchn., 231, XIX, 410.
Caloplaca (sect. *Pyrenodesmia*) *Agardhiana* Flagey, 879, XVIII, 371.
 — *arenaria* var. *Lallavei* A. Zahlbr., 253, XII, 90.
 — *assigena* Dalla Torre et Sarnth., 1255, XX, 39.
 — *aurantiaca* var. *flavovirescens* Th. Fr., 160, XI, 94.
 — (sect. *Amphiloma*) *Baumgartneri* 765, XVII, 275.
 — *caesiorufa* A. Zahlbr., 250, XII, 90.
 — (sect. *Amphiloma*) *callopisma* Th. Fries, 1256, XX, 39.
 — *cerina* var. *areolata* A. Zahlbr., 1053, XIX, 419.
 — — *a. Ehrhartii* 252, XII, 90.
 — — var. *stillicidiorum* Th. Fr., 575, XV, 210.
 — *citrina* var. *maritima* B. de Lesd., 1667, XXIII, 230.
 — (sect. *Amphiloma*) *cirrochroa* Th. Fries, 1257, XX, 39.
 — (sect. *Thamnonoma*) *coralloides* A. Zahlbr., 1588, XXII, 116.
 — *ferruginea* var. *melanocarpa* Th. Fries, 1557, XXII, 116.
 — — var. *nigricans* Th. Fries, 1557, XXII, 116.
 — (sect. *Gasparrinia*) *fiumana* A. Zahlbr., 1880, XXV, 248.
 — (sect. *Fulgensia*) *fulgida* A. Zahlbr., 1978, XXVI, 177.
 — *fuscoatra* A. Zahlbr., 46, IX, 131.
 — (sect. *Amphiloma*) *granulosa* Stnr., 1056, XIX, 420.
 — (sect. *Pyrenodesmia*) *intercedens* Stnr., 879, XVIII, 371.
 — *Lallavei* Flagg., 253, XII, 91.
 — *luteoalba* Th. Fries, 251, XII, 90.
 — *marina* (Wedd.), 1880, XXV, 248.
 — (sect. *Amphiloma*) *medians* Flagg., 1055, XIX, 420.
 — — *Nideri* Stnr., 766, XVII, 275.
 — *percrocata* A. Zahlbr., 465, XV, 186.
 — (sect. *Eupercrocata*) *Pollinii* Jatta, 1557, XXII, 115.

- Caloplaca pyracea* Th. Fries, 251, XII, 90.
 — *rubelliana* Lojka, 47, IX, 131.
 — *Schaereri* A. Zahlbr. var. *adriatica* A. Zahlbr., 1054, XIX, 420.
 — *vitellinula* Oliv., 1779, XXIV, 287.
Calospora Innesii Sacc., 624, XVI, 68.
 — *platanoides* Niessl, 624, XVI, 68.
 — (*Valsa*) *platanoides* Niessl, 510, XV, 194.
Calothrix adscendens Born. et Flah., 147, XI, 90.
 — *lutescens* Menegh., 1849, XXV, 236.
 — *parietina* Thuret, 1006, XIX, 403, 404; 148, XI, 91.
 — *scopulorum* Agardh, 1057, XIX, 404.
Calycella citrina Boud., 205, XII, 78.
 — *cyathoidea* Quel., 1170, XX, 18.
 — *Personii* Quel., 628, XVI, 69.
 — *scutula* Quel., 528, XV, 99.
 — *tenella* Quel., 1170, XX, 18.
Calycium tympanellum Ach., 352, XIII, 461.
Calypsotheca Goeppertiana Kühn., 816, XVIII, 353.
Camarosporium Coronillae Sacc., 413, XV, 171.
Campsylonema indicum Schmidle, 858, XVIII, 364.
Camptothecium lutescens Besch., 598, XV, 214.
Camptium curvatum Link, 1627, XXIII, 218.
Campylopodium euphorocladum Besch., 1591, XXII, 122.
Campylopus atrovirens De Not., 1677, XXIII, 232.
 — — var. *muticus* Milde, 1677, XXII, 232.
 — *aureus* v. d. B. et Lac., 1692, XXIII, 234.
 — *ericoides* Jacq., 1693, XXIII, 234.
 — *euphorocladus* Bryol. Jav., 1591, XXII, 122.
 — *flexuosus* Brid., 1676, XXIII, 234.
 — *longipilus* Brid., 1677, XXIII, 232.
 — *Mildei* Limpr., 779, XVII, 278.
 — *nodiflorus* Jacq., 1694, XXIII, 234.
 — *polytrichoides* De Not., 780, XVII, 278; 779, XVII, 278.
 — *pterotoneuron* Jacq., 1695, XXIII, 235.
 — *Schwazii* Schimp., 1076, XIX, 424.
Campylothecium tumidum Flesch., 1596, XXII, 122.
Candelaria concolor Wainio, 670, XVI, 85.
 — *vulgaris* Mass., 670, XVI, 85.
Cantharellus infundibuliformis Fries, 302, XIII, 443.
Capillaria Crataegi Link, 1473, XXII, 96.
Capitularia amaurocraea Flk., 242, XII, 88.
 — *degenerans* Flk., 758, XVIII, 274.
Capnodium lanosum Cooke, 1429, XXII, 88.
 — *salicinum* Mont., 501, XV, 192.
 — *sphaeroideum* Kickx, 501, XV, 192.
Capsicarpella sphaerophora Kjellm., 544, XV, 203.
Catenella opuntia Grev., 350, XIII, 459; 1518, XXII, 106.
Catharinaea angustata Brid., 1585, XXII, 121.
 — *Hausknechtii* Broth., 1785, XXIV, 289.
 — *hercynica* Ehrh., 789, XVII, 279.
 — *tenella* Röhl., 1889, XXV, 250.
Catillaria (sect. *Biatorina*) *Ehrhartiana* Th. Fries, 1231, XX, 32.
 — *grossa* Blomberg, 1650, XXIII, 225.
 — *leucoplaea* Th. Fr., 1650, XXIII, 225.
 — *olivacea* A. Zahlbr., 864, XVIII, 366.
 — *premnea* Körb., 1650, XXIII, 225.
Catocarpus confervoides f. *polycarpus* Arn., 265, XII, 93.
 — *polycarpus* Arn., 265, XII, 93.
Catolechia lactea Mass., 59, IX, 134.
Catopyrenium trachyticum Arn., 176, XI, 97.
Catoscopium nigrum Brid., 676, XVI, 86.
Cenangium abietis Rehm, 958, XIX, 393.
 — *aucupariae* Fries, 1164, XX, 17.
 — *Cerasi* Fries, 960, XIX, 394.
 — *fasciculare* Karst., 1436, XXII, 89.
 — *ferruginosum* Fries, 958, XIX, 393.
 — *populinum* Tul., 1436, XXII, 89.
 — *populneum* Rehm, 1436, XXII, 89.
 — *populorum* Sacc., 1436, XXII, 89.
 — (trib. *Clithris*) *quercinum* Fries, 523, XV, 197.
Cenomyce capitellata Tayl., 1237, XX, 39.
 — *coccocephala* Ach., 1032, XIX, 414.
 — *pityrea* β . *crassiuscula* Del., 1535, XXII, 110.
 — *pyncoclada* Gaudich., 557, XV, 207.
 — *racemosa* var. *pinnata* Flk., 756, XVII, 273.
 — *rangiformis* var. *foliosa* Flk., 1238, XX, 34.
Centhospora Visci Sollm., 1472, XXII, 96.
Cephalosporium acremonium Corda, 1483, XXII, 98.
 — — var. *majus* Penzig, 1483, XXII, 98.
Cephaloxia bicuspidata Dum., 278, XII, 95; 384, XIII, 469; 278 b, XVI, 90.
 — *connivens* Spruce, 279, XII, 95; 1571, XXII, 119.
 — *curvifolia* Dum., 1570, XXII, 118.
 — *fluitans* Spruce, 1063, XIX, 422.
 — var. *gigantea* Lindb., 1673, XXIII, 231.
 — *leucantha* Spruce, 280, XII, 95.
 — *media* Lindb., 277, XII, 95.
 — *multiflora* Spruce, 277, XII, 95.
 — *obtusiloba* Lindb., 1063, XIX, 422.
 — *symbolica* Breidler, 277, XII, 95.
 — *Turneri* Lund., 698, XVI, 89.
Cephaloxiella divaricata Schiffner, 1374, XXI, 223.
Ceramium ciliatum Ducl., 742, XVII, 268; 742 c, XX, 29.

- Ceramium crispum* Ducl., 648, XVI, 79.
 — *elegans* J. Ag., 743, XVII, 269.
 — *longissimum* Roth., 547, XV, 204.
 — *Plumula* Ag., 1848, XXV, 236.
 — *radiculosum* Grun., 1753, XXIV, 281.
 — *strictum* Grev. et Ham., 743, XVII, 269.
Ceratium furca Duj., 1639, XXIII, 221; 1950, XXVI, 167.
 — *fusus* Clap. et Lachm., 1639, XXIII, 221; 1950, XXVI, 167.
 — *tripos* Nitzsch., 1639, XXIII, 221; 1950, XXVI, 167.
Ceratodon purpureus Brid., 490, XV, 191.
Cercaria tripos O. F. Müller, 1950, XXVI, 167.
Cercidospora epipolytropa Arn., 970, XIX, 396.
Cercospora Armoraciae Sacc., 838, XVIII, 358.
 — *beticola* Sacc., 726, XVII, 263.
 — *concors* Sacc., 1837, XXV, 231.
 — *depaucoides* Sacc., 727, XVII, 264.
 — *Isopyri* Höhnelt, 1193, XX, 22.
 — *mercurialis* Pass., 725, XVII, 263; 1196, XX, 23.
 — *microsora* Sacc., 1192, XX, 22.
 — *smilacina* Sacc., 728, XVII, 264.
 — *Tiliae* Peck, 1192, XX, 22.
Cesius concinnatus S. Gray, 691, XVI, 88.
Cetraria aculeata β. *hiascens* Fr., 1877, XXV, 247,
 — — var. *muricata* Ach., 1975, XXVI, 176.
 — *amplicata* Lam., 463, XV, 185.
 — *californica* Tuck., 1047, XIX, 418.
 — *caperata* Wainio, 847, XVIII, 369.
 — *chlorophylla* Wainio, 1246, XX, 36.
 — *ciliaris* Ach., 1247, XX, 37.
 — *crispa* Nyl., 1777, XXIV, 286.
 — *cucullata* Ach., 872, XVIII, 368.
 — *glauca* Ach. f. *ulophylla* Körb., 1366, XXI, 221.
 — *hiascens* Th. Fr., 1877, XXV, 247.
 — *islandica* var. *crispa* Ach., 1777, XXIV, 286.
 — — var. *tenuifolia* Retz., 1777, XXIV, 286.
 — *junipera* Ach., 873, XVIII, 368.
 — — *α. genuina* Körb., 873, XVIII, 369.
 — — var. *pinastri* Ach., 874, XVIII, 369.
 — *lacunosa* var. *stenophylla* Tuck., 1553, XXII, 115.
 — *Laureri* Krph., 463, XV, 185; 463 b, XX, 40.
 — *nigricans* Nyl., 1973, XXVI, 176.
 — *nivalis* Ach., 871, XVIII, 368.
 — *odontella* Ach., 1974, XXVI, 176.
 — — var. *nigricans* Lynge, 1973, XXVI, 176.
 — *pinastri* S. Gray, 874, XVIII, 369.
 — *platyphylla* Tuck., 1774, XXIV, 285.
 — *saepincola* Ach., 870, XVIII, 368.
 — — *α. nuda* Schaer., 870, XVIII, 368.
 — — var. *chlorophylla* Schaer., 1246, XX, 36.
Cetraria saepincola var. *scutula* Schaer., 870, XVIII, 368.
 — — *β. ulophylla* Ach., 1246, XX, 37.
 — — *tenuissima* var. *muricata* Dalla Torre et Sarnth., 1975, XXVI, 176.
Chaenotheca chrysocephala Th. Fr., 551, XV, 205.
 — *melanophaea* Zwackh., 441, XV, 180.
Chaetomium comatum Fries, 1814, XXV, 226.
 — *elatum* Schmidt, 1814, XXV, 226.
 — *pusillum* Strauss, 824, XVIII, 355.
Chaetomorpha Linum Kütz., 141, XI, 89.
Chaetophora atra Ag., 748, XVII, 270.
 — *Cornu-Damae* Agardh, 438 b, XX, 28; 1501, XXII, 102.
 — — f. *polyclados* Kütz., 438, XV, 179.
 — *elegans* Ag., 84, IX, 140.
 — *endiviaefolia* var. *ramosissima* Rabh., 438, XV, 180.
 — *flagellifera* Kütz., 439, XV, 180.
 — *incrassata* var. *incrustans* Rabh., 1501, XXII, 102.
 — *monilifera* Kütz., 439, XV, 180.
 — *tuberculosa* Hook., 845, XVIII, 360.
Chamaesiphon minutus Lemm., 1949, XXVI, 167.
 — *polonicus* Hansgirg, 1760, XXIV, 282; 1760 b, XXVI, 168.
Chantransia chalybea var. *radians* Kütz., 1752, XXIV, 281.
 — — E. Fries, 1017, XIX, 409; 744, XVII, 269.
 — *virgatula* Thuret, 1751, XXIV, 281.
Chara crinita Wallr. f. *brevifolia* 89, IX, 141.
 — — Wallr. f. *elongata* Sydow, 1015, XIX, 408.
 — — Wallr. f. *leptosperma* 89, IX, 141.
 — — Wallr. f. *longispina* 89, IX, 141.
 — — Wallr. f. *microsperma* Sydow, 1015, XIX, 408.
 — — Wallr. f. *stagnalis* Nordst., 1015, XIX, 408.
 — *delicatula* Ag., 1350, XXI, 216.
 — — f. *verrucosa* Migula, 738, XVII, 267; 739, XVII, 267.
 — *fasciculata* Amici, 434, XV, 178.
 — *foetida* subsp. *melanopyrena* A. Br., 1212, XX, 27.
 — — var. *subinermis* 1213, XX, 27.
 — — f. *longibracteata* A. Br., 1213, XX, 27.
 — *intricata* Trentepohl, 434, XV, 178.
 — *polyasperma* A. Br., 434, XV, 178.
 — *rudis* A. Br. f. *elongata* Migula, 1215, XX, 27.
 — — A. Br. f. *typica* Migula, 1214, XX, 27.
Characium angustatum A. Br. f. *minor* Stockm., 337, XIII, 455.
Chionophe nitens Thienem., 1839, XXV, 232.
Chiloscyphus argutus var. *ciliatistipus* Schiffn., 883, XVIII, 372.

- Chiloscyphus coalitus* var. *affinis* Gottsch., 697, XVI, 89.
 — *polyanthus* var. *erectus* f. *minor* Schiffn., 775, XVII, 277.
 — — *β. rivularis* Corda, 476, XV, 188.
 — — var. *rivularis* N. ab E., 476 c, XXIII, 235.
Chlorea canariensis Nyl., 769, XVII, 276.
 — *vulpina* Nyl., 878, XVIII, 371.
Chlorodermis comosa Bail. et Harv., 1349, XXI, 216.
Chlorodictyon foliosum J. Ag., 573, XV, 210.
Chlorosphaera Oliveri Heufrey, 1010, XIX, 407.
Chlorotylum cataractarum Kütz., 1203, XX, 24.
 — — var. *incrusters* 341, XIII, 457.
Chordaria flagelliformis 1750, XXIV, 281.
 — *Uvaria* Ag., 1847, XXV, 236.
Chondrioderma testaceum Rost., 2, IX, 119.
Chorda lomentaria Lyngb., 1216, XX, 27.
Chroococcus cohaerens Näg., 1346, XXI, 215.
 — *miniatus* Näg., 1345, XXI, 215.
 — *minutus* Näg., 146, XI, 90.
 — *pallidus* Näg., 148, XI, 91.
 — *turgidus* Näg., 78, IX, 138; 146, XI, 90; 1206, XX, 25; 1342, XXI, 213.
 — *turicensis* Näg., 146, XI, 90.
Chroolepus aureum var. Kütz., 344, XIII, 458.
 — — Kütz., 345, XIII, 458.
 — *ebeneus* Ag., 1860, XXV, 241.
 — *jolithus* Ag., 235, XII, 85.
 — *lageniferum* Hildebr., 1210, XX, 26.
 — *odoratum* var. *oleiferum* Rabenh., 732, XVII, 266.
 — *oleiferum* Kütz., 732, XVII, 266.
Chrysomyxa Ledi De Bary, 1707, XXIV, 271.
 — *Pirolae* Aut. plur., 1708, XXIV, 271.
 — *Rhododendri* de Bary, 1132, XX, 10.
 — *Ramischiae* Lagerh., 1708, XXIV, 271.
 — *Woronini* Tranzschel, 1707, XXIV, 271.
Chrysomenia flagelliformis Ardis., 547, XV, 204.
 — *Uvaria* J. Ag., 1847, XXV, 236.
Chylocladia clavellosa Grev., 1758, XXIV, 282.
Chytridium ?Anemones de Bary et Woron., 202, XII, 75.
Ciboria amentacea Fuck., 1725, XXIV, 274.
 — *bolaris* Fuck., 203, XII, 76.
 — *ciliatospora* Fuck., 528, XVIII, 359.
 — *rufo-fusco* Sacc., 1167, XX, 17.
Ciliaria pseudotrachispora Bond., 1619, XXIII, 217.
 — *scutellata* Bond., 1323, XXI, 209.
Cinclidotus aquaticus Bryol. Europ., 784, XVII, 278.
 — *danubicus* Schiffn. et Baumg., 1377, XXI, 223.
 — *fontinaloides* Pal. B., 499, XV, 192.
 — — (Hedw.) P. Beauv., 1384, XXI, 224.
Cintractia caricis Magnus, 908, XIX, 381.
Cintractia subinclusa Magnus, 1701, XXIV, 269.
Cladina amaurocraea Nyl., 242, XII, 88.
Cladochytrium graminis Busg., 1827, XXV, 229.
Cladonia acuminata (Ach.) Norr.-Wainio, 1962, XXVI, 172.
 — *agariciformis* Arn., 153, XI, 92.
 — *aggregata* Ach., 1768, XXIV, 285; 354, XIII, 461.
 — *alpestris* Rabenh., 660, XVI, 83.
 — *amaurocraea* f. *districta* Nyl., 755, XVII, 273.
 — — var. *fasciculata* Kernst., 242, XII, 88.
 — *bellidiflora* Schaer. a. *coccocephala* Wainio, 1632, XIX, 414.
 — *caespiticia* Floerke, 153, XI, 92; 1330, XXI, 210.
 — *capitellata* Bab., 1237, XX, 34.
 — *cariosa* Sprengl., 447, XV, 182.
 — *coccifera* Willd., 1033, XIX, 414.
 — — var. *pleurota* (Flk.) Schaer., 1771, XXIV, 285.
 — *crispata* Flot. var. *gracilescens* Wain., 1362, XXI, 220.
 — *cyanipes* Wainio, 1868, XXV, 242.
 — *degenerans* Sprengl., 758, XVII, 274.
 — *delicata* Flk. f. *quercina* 241, XII, 88; 241, XVII, 276.
 — *districta* Nyl., 755, XVII, 273.
 — *endiviaefolia* E. Fries, 244, XII, 88.
 — *fasciculata* Kütz., 791, XVII, 268.
 — *fimbriata* var. *cornuto-radiata* Coem., 760, XVII, 274.
 — — var. *simplex* Fltw., 759, XVIII, 274.
 — *floerkeana* var. *carcata* (Ach.) Nyl.-Wainio, 1770, XXIV, 285.
 — — var. *intermedia* Hepp, 1769, XXIV, 285.
 — *foliacea* Schaer. var. *convoluta* Wainio, 244, XII, 88.
 — *furcata* var. *pinnata* Wainio, 756, XVII, 273.
 — *glauca* Floerke, 353, XIII, 461; 1534, XXII, 110.
 — *glomerata* var. *simplicior* Kütz., 741, XVII, 268.
 — *gracilescens* (Flk.) Wainio, 1867, XXV, 242.
 — *gracilis* var. *chordalis* (Flk.) Schaer., 757, XVII, 273.
 — — var. *elongata* E. Fries, 757, XVII, 273.
 — — f. *laontera* (Del.), 757, XVII, 273.
 — *Heusleri* Zanard., 741, XVII, 268.
 — *incrapata* Flk., 1652, XXIII, 225.
 — *incrassata* f. *epiphylla* (E. Fries) Wainio, 1653, XXIII, 225.
 — *Kützingiana* Grun., 741, XVII, 268.
 — *macilenta* a. *styracella* (Ach.) Wainio, 1651, XXIII, 225.

- Cladonia Müllerii* Nyl., 877, XVIII, 371.
 — *papillaria* Hoffm. f. *molariformis* Schaer., 243, XII, 88.
 — *papillaris* Hoffm., 243, XII, 88.
 — *pityrea* (Floerk.) E. Fries. 1. *Zwackhii*, 2. *crassiuscula* Wainio, 1535, XXII, 110.
 — *pycnoclada* Nyl., 557, XV, 207.
 — — Fr. var. *chlorocarpaea* Floerke, 1330, XXIV, 278.
 — *pyxidata* var. *chlorophaea* f. *costata* Nyl., Wainio, 1773, XXIV, 285.
 — *radiata* (Schreb.) Coem., 760, XVII, 274.
 — *rangiferina* (L.) Wainio, 1863, XXV, 242.
 — — f. *gracilescens* Rabh., 1362, XXI, 220.
 — — f. *major* Flk., 1961, XXVI, 172.
 — — f. *tenuior* (Del.) Wainio, 1864, XXV, 242.
 — *rangiformis* Hoffm., 1034, XIX, 414.
 — — var. *foliosa* Wainio, 1238, XX, 34.
 — *squamosa* β. *asperella* b. *multibrachiata* Flk., 1540, XXII, 111.
 — — var. *denticollis* Floerke., 1536, XXII, 111.
 — — var. *multibrachiata* f. *pseudo-crispata* Sandst., 1540, XXII, 111.
 — — var. *multibrachiata* f. *turfacea* Wain., 1539, XXII, 111.
 — — var. *phyllocoma* Wainio, 1537, XXII, 111.
 — — var. *phyllocoma* Wainio f. *polychonicum* Floerk., 1538, XXII, 111.
 — *strepsilis* (Ach.) Wainio, 1962, XXVI, 172.
 — *subcariosa* Nyl., 866, XVIII, 367.
 — *subulata* (L.) Wainio, 760, XVII, 274.
 — *sylvatica* β. *portentosa* f. *erinacea* (Desm.) Wainio, 1866, XXV, 242.
 — — *a. sylvestris* (Oed.) Wainio, 1865, XXV, 242.
 — *turgida* Hoffm., 1239, XX, 34.
 — *verticillata* var. *cervicornis* (Ach.) Flk.-Wainio, 1772, XXIV, 285.
 — — var. *evoluta* Stein., 245, XII, 89.
 — — var. *evoluta* Th. Fries f. *phyllocephala* (Flk.) W., 1654, XXIII, 226.
Cladophora Aegagropila f. *Sauteri* Rab., 636, XVI, 73.
 — *alysoidea* Menegh., 1742, XXIV, 279.
 — *crispata* Kütz., 1211, XX, 26; 1347, XXI, 216; 1348, XXI, 216.
 — *declinata* Kütz. var. *fluitans* 87, IX, 140.
 — *fluitans* Kütz., 741, XVII, 268.
 — *fracta* 147, XI, 90; 640, XVI, 76.
 — — Kütz. var. *lacustris* Brand, 1502, XXII, 102.
 — — Kütz. var. *normalis* Rabenh. f. *robusta parceramosa* Kjellm., 843, XVIII, 360.
 — *glomerata* Meyer, 1211, XX, 26; 744, XVII, 269.
 — — Kütz. var. *genuina* Brand, 1348, XXI, 216.
Cladophora glomerata Kütz. var. *rivularis* Brand, 1347, XXI, 216.
 — — Kütz. var. *simplicior* 1347, XXI, 216.
 — — Kütz. var. *stagnalis* Brand, 1211, XX, 26.
 — *Hutchinsiae* Kütz., 1742, XXIV, 279.
 — *lubrica* Kütz., 1743, XXIV, 279.
 — *pistillata* Kütz., 1743, XXIV, 279.
 — *Plumula* Kütz., 1743, XXIV, 279.
 — *Rudolphiana* Harvey, 1743, XXIV, 279.
 — *rupestris* Kütz., 142, XI, 89; 844, XVIII, 360.
 — *Sauteri* Kütz., 636, XVI, 73.
 — *trichotoma* Kütz., 1636, XXIII, 221.
Cladosporium bacilligerum Mont. et Fries, 1938, XXVI, 163.
 — *epiphyllum* Martins, 220, XII, 82.
 — *herbarum* Link, 1460, XXII, 94.
 — *orbiculatum* Desm., 1190, XX, 22.
 — *Tabaci* Oudem., 1628, XXIII, 219.
Cladothle filiformis Kütz., 1512, XXII, 104.
 — *Montagnei* Kütz., 1512, XXII, 105.
Clathrina aggregata Müll. Arg., 354, XIII, 461.
Clathrocystis aeruginosa Henfrey, 1517, XXII, 106; 226, XII, 83.
Clathroporina heterospora A. Zahlbr., 470, XV, 187.
Clavaria cristata Pers., 323, XIII, 448.
 — *fallax a. cristata* Pers., 323, XIII, 448.
 — *fistulosa* Holmsch., 606, XV, 64.
 — *herbarum* Pers., 1435, XXII, 89.
 — *Krombholzii* Fries, 325, XIII, 448.
 — *ligula* Schäffer, 328, XIII, 448; 328b, XXI, 212.
 — *muscoideus* L., 326, XIII, 448.
 — *ophioglossoides* L., 530, XV, 200.
 — *pilipes* Vahl., 606, XVI, 64.
 — *pistillaris* L., 327, XIII, 448.
 — *rugosa* Bull., 324, XIII, 448.
 — *teres fistulosa* Schmiedel, 606, XVI, 64.
 — *viridis* Schrader, 206, XII, 79.
Claviceps microcephala Tul., 503, XV, 193.
 — — Wint., 503b, XXII, 101.
 — *nigricans* Tul., 966, XIX, 395.
 — *purpurea* Tul., 611, XVI, 65.
Climacium americanum Brid., 1588, XXII, 121.
 — *dendroides* Web. et Mohr., 1094, XIX, 426.
Clitocybe cyathiformis Sacc., 1423, XXII, 87.
 — *dealbata* Sacc., 1606, XXIII, 214.
 — *geotropa* Sacc., 1715, XXIV, 272.
 — *laccata* Quel., 301, XIII, 443.
Clithris nigra Keissl., 523, XV, 197.
 — *quercina* R., 523, XV, 197.
Closterium acerosum Ehrenb., 229, XII, 84.
 — — (Schraub.) Ehrb., 735, XVII, 266.
 — — b. *lanceolatum* Klebb., 1506, XXII, 103.

- Closterium Cornu* Ehrh., 78, IX, 138.
 — *curtum* Bréb., 231, XII, 84.
 — *Dianae* Ehrenb., 1948, XXVI, 167.
 — *didymotocum* Ralfs, 735, XVII, 266.
 — *digitus* Ehrenb., 537, XV, 202.
 — *directum* Arch., 852, XVIII, 362; 1009, XIX, 407.
 — *Ehrenbergii* Menegh., 237, XII, 87.
 — *intermedium* Ralfs b. *directum* Klebs., 852, XVIII, 362.
 — *juncidum* Ralfs, 537, XV, 202.
 — *lanceolatum* Kütz., 1506, XXII, 103.
 — *moniliferum* Ehrenb., 750, XVII, 271.
 — *striolatum* Ehrenberg, 536, XV, 202; 537, XV, 202; 76, IX, 138.
Coccocarpia plumbea Nyl., 357, XIII, 462.
 — — var. *myriocarpa* Nyl., 357, XIII, 462.
Coccochloris cruenta Spreng., 343, XIII, 458.
 — *sanguinea* Wallr., 343, XIII, 458.
Cocomyces comitalis Batsch, 209, XII, 80.
 — *coronatus* De Not., 209, XII, 80.
 — *Pini* Karst., 1924, XXVI, 160.
 — *Rubii* Karst., 819, XVIII, 354.
Coccophacidium Pini Rehm, 1924, XXVI, 160.
Cochlearia aurantia Lamb., 1823, XXV, 228.
Coeleosphaerium Kuetzingianum Näg., 226, XII, 83.
 — *Naegelianum* Unger, 1631, XXIII, 220.
Coenogonium germanicum Glück, 1860, XXV, 241.
 — *nigrum* A. Zahlbr., 1860, XXV, 241.
Coleochaeta orbicularis Pringsh., 856, XVIII, 903.
Coleospermum Goeppertianum Kirchm., 334, XIII, 455.
Coleosporium Campanulae Lev., 815, XVIII, 353.
 — *Campanulacearum* Fr., 815, XVIII, 353.
 — *Euphrasiae* Winter, 108, XI, 82; 107, XIX, 402.
 — — Schröd., 108, XI, 82.
 — *Melampyri* Karst., 107, XI, 82.
 — — Kleb., 107, XIX, 402.
 — *Pulsatillae* Winter, 709, XVII, 260.
 — *Pulsatillarum* E. Fries, 709, XVII, 260.
 — *Sonchi* Schroeder, 109, XI, 83.
 — — *arvensis* Winter, 109, XI, 83.
 — *Symphyti* Fuck., 1117, XX, 5.
 — *Synantherarum* Fries, 109, XIX, 402.
 — — Fries a. C. *cacaliae* Fuckel, b. C. *Inulae* Rabb., c. C. *Seneciorum* Fuck., 109, XI, 83.
Collema atro-coeruleum a. lacerum Schaer., 560, XV, 207.
 — *catachystum* Körb., 379, XIII, 467.
 — *exasperatum* Ach., 1873, XXV, 245.
 — *Hildebrandii* Garovagl., 1035, XIX, 415.
 — *microphyllum* Ach., 1666, XXIII, 228.
Collema nigrescens Ach., 270, XII, 94.
 — (sect. *Synechoblastus*) *nigrescens* Ach., 1659, XXIII, 227.
 — *nigrescens* d. *microphylla* Schaer., 1660, XXIII, 228.
 — *occultatum* Bagl., 1542, XXII, 111.
 — *pulposum* Ach., 456, XV, 184.
 — *quadratum* Lahm., 1542, XXII, 112.
 — (sect. *Collemodiopsis*) *Rechingeri* A. Zahlbr., 1240, XX, 34.
 — *tomentosum* Hoffm., 1363, XXI, 220.
 — *vespertilio* Hoffm., 1659, XXIII, 227.
Collemodium cataclystum Nyl., 379, XIII, 467.
 — *microphyllum* Nyl., 1660, XXIII, 228.
Collemopsis Schaereri Cromb., 445, XV, 184.
Colletotrichum gloeosporoides Sacc., var. *Hederae* Pass., 1625, XXIII, 218.
 — *hedericola* L., 1625, XXIII, 218.
Collybia cirrhata Sacc., 1425, XXII, 87.
 — *stipitaria* Sacc., 1145, XX, 13.
 — *tuberosa* Sacc., 1425, XXII, 87.
 — *velutipes* Sacc., 948, XIX, 391.
Colpoma quercinum Wallr., 523, XV, 197.
Comatricha typhina Rost., 402, XV, 169.
Coniangium caesium Fltw., 61, IX, 134.
 — *gibberulosum* Arn., 1858, XXV, 240.
 — *luridum* E. Fr., 174, XI, 96.
 — *spadiceum* Arn., 370, XIII, 465.
Conferva Aegagropila L. Smith, 636, XVI, 73.
 — *annulina* Roth, 1020, XIX, 410.
 — *atropurpurea* Roth, 741, XVII, 268.
 — *bombycina* f. *genuina* Wille 440, XV, 180.
 — *ciliata* Ellis, 742, XVII, 269.
 — *cirrosa* Roth, 842, XVIII, 360; 1748, XXIV, 280.
 — *clavaeformis* Roth, 348, XIII, 459.
 — *coactilis* Sauter, 636, XVI, 73.
 — *cristatum* Menegh., 742, XVII, 269.
 — *dichotoma* L., 637, XVI, 75.
 — *dissiliens* Smith, 77, IX, 138.
 — *ebenea* Dillw., 1860, XXV, 241.
 — *floridula* Dillw., 647, XVI, 78.
 — *fluviatilis* Dillen., 1513, XXII, 105.
 — *fontinalis* Berk. var. *crassior* Hansg., 857, XVIII, 364.
 — *fracta* Dillw., 843, XVIII, 360; 1502, XXII, 102.
 — *fusca* Huds., 842, XVIII, 360.
 — *giganteum* Menegh., 742, XVII, 269.
 — *glacialis* Kütz., 531, XV, 200.
 — *glomerata* L., 1348, XXI, 216; 1347, XXI, 216; 1211, XX, 26.
 — *granulosa* Engl., 1846, XXV, 235.
 — *Hofmanni* Ag., 1201, XX, 24.
 — *Hutchinsiae* Dillw., 1742, XXIV, 279.
 — *Linum* Fl., 141, XI, 89.
 — *Lyngbyeana* Kütz., 844, XVIII, 360.

- Conserva nitida* Dillw., 850, XVIII, 362.
 — *pachyderma* Wille, 634, XVI, 73.
 — *Plumula* Ellis, 1848, XXV, 236.
 — *reticulata* L., 82, IX, 139.
 — *Rudolphiana* Ag., 1743, XVIII, 279.
 — *rupestris* L., 142, XI, 89; 844, XVIII, 360.
 — *salina* Kütz. f. *tenuior* Hansg., 1013, XIX, 408.
 — *Sauteri* Nees, 636, XVI, 73.
 — *scopulorum* W. et M., 1007, XIX, 404.
 — *tricholoma* Ag., 1636, XXIII, 221.
 — *tumidulum* Menegh., 742, XVII, 268.
 — *turneri* Sm., 1848, XXV, 236.
 — *uniforme* Menegh., 742, XVII, 268.
Coniocarpon cinnabarinum DC., 1222, XX, 29.
 — *gregarium* Schaer., 1222, XX, 29.
Coniocybe baeomycoides Mass., 1838, XXV, 232.
 — *crocata* Körb., 1838, XXV, 232.
 — *heterospora* A. Zahlbr., 1023, XIX, 411.
 — *straminea* Wainio, 1023, XIX, 411.
Coniophora atrocineria Karst., 1601, XXIII, 213.
 — *Ellisii* Cooke, 1601, XXIII, 213.
 — *fulvo-olivacea* Mass., 1601, XXIII, 213.
 — *fumosa* Karst., 1601, XXIII, 213.
 — *olivacea* Karst., 1601, XXIII, 213.
Coniophorella olivacea Karst., 1601, XXIII, 213.
Coniothyrium concentricum Sacc., 1176, XX, 19.
 — *Diplodiella* Sacc., 981, XIX, 398.
Conjugata cruciata Vauch., 79, IX, 138.
Conomitrium Julianum Mont., 888, XVIII, 373.
 — *urceolatum* Tuck., 1359, XXI, 219.
Coprinus alternatus Fries, 306, XIII, 444.
Cora pavonia E. Fries, 1060, XIX, 421.
Corallina fluviatilis Vaill., 1513, XXII, 105.
Cordalia persicina Gobi, 12, IX, 125.
Cordyceps clavulata Ell. et Ev., 1817, XXV, 226.
 — *pistillariaeformis* Berk. et Br., 1817, XXV, 227.
Corniophorus coralloides Mass., 70, IX, 136.
Cornicularia aculeata β . *stuppea* Fw., 1975, XXVI, 177.
 — *divergens* Ach., 1544, XXII, 115.
 — *muricata* Ach., 1975, XXVI, 176.
 — *rysolea* Haszl., 1248, XX, 37.
 — *spadicea* β . *Codontella* Ach., 1974, XXVI, 176.
Corticium cerinum Pers., 713, XVII, 261.
 — *aurantiacum* Bresad., 1712, XXIV, 272.
 — *cinereum* Pers., 1711, XXIV, 272.
 — *comedens* Fries, 1803, XXV, 224.
 — *corrugatum* Fries, 714, XVII, 261.
 — *evolvens* Fries, 1802, XXV, 224.
 — *giganteum* Fries, 1602, XXIII, 214.
 — *incarnatum* Fries, 1804, XXV, 224.
 — *laeve* Pers., 1802, XXV, 223.
 — *nigrescens* Fries, 1803, XXV, 224.
 — *obscurum* Fries, 1905, XXVI, 156.
Corticium polygonum Pers., 1906, XXVI, 156.
 — *quercinum* Fries, 320, XIII, 447.
 — *roseum* Pers., 715, XVII, 261.
 — (*Gloeocystidium*) *stramineum* Bres., 716, XVII, 261.
 — *tephroleucum* Bres., 942, XIX, 390.
Corticularia brachiata Kütz., 1846, XXV, 235.
 — *laeta* Kütz., 1846, XXV, 235.
Cortinarius (Phlegmacium) multiformis Fries, 305, XIII, 444.
Coscinodon cribosus Spruce, 1274, XX, 43.
Cosmarium amoenum Breb., 540, XV, 203.
 — *armatum* Breb., 539, XV, 202.
 — *Botrytis* Menegh., 534, XV, 201; 750, XVII, 271.
 — *connatum* Breb., 149, XI, 91.
 — *cruciferum* de Bary, 860, XVIII, 365.
 — *curtum* Ralfs, 231, XII, 84.
 — *difficile* var. *sublaeve* Lützk., 76, IX, 137.
 — *leve* Rabh., 230, XII, 84.
 — *margaritifera* Menegh., 534, XV, 201.
 — *minutum* Delp., 1019, XIX, 409.
 — *moniliforme* Turp., 1019, XIX, 409.
 — *nitidulum* De Not., 638, XVI, 75.
 — *palangula* Bréb. var. *b. De Bary* Rabenh., 231, XIX, 410.
 — *phaseolus* β . *elevatum* Nordst., 638, XVI, 75.
 — *pseudopyramidatum* Lundell, 736, XVII, 266.
 — *pygmaeum* Arch., 639, XVI, 76.
 — — var. *minus* Comère, 736, XVII, 267.
 — *tetraphalum* Bréb., 534, XV, 201.
 — *trafalgaricum* Witttr., 638, XVI, 76.
Craterella pallida Pers., 318, XIII, 446.
 — *cornucopioides* Pers., 317, XIII, 446.
 — *lutescens* Fries, 1420, XXII, 86.
Craterospermum laetevirens A. Br., 232, XII, 85.
Cribraria cernua Pers., 4, IX, 120.
 — *vulgaris* Schrad., 403, IX, 169.
Cronartium asclepiadeum 110 c, XVII, 265.
 — *flaccidum* Wint., 110, XI, 83; 110 c, XVII, 265.
 — *ribicolum* Dietr., 1131, XX, 10.
Crossidium griseum Jur., 1577, XXII, 119.
Cryphonectria Caraganae Sacc., 1612, XXIII, 216.
Cryptoderis melanostyla Winter, 1157, XX, 15.
Cryptomyces Pteridis Rehm, 626, XVII, 281.
Cryptopodium bartramiioides Brid., 1698, XXIII, 235.
Cryptosphaeria nitida Grev., 1721, XXIV, 274.
Cryptospora hypodermia Fuck., 521, XV, 197.
Cryptosporella hypodermia Sacc., 521, XV, 197.
Cryptosporium Euphorbiae v. Höhnelt, 1181, XX, 20.
 — *ferrugineum* Bonord., 1182, XX, 20.
Cryptotheca vitiana Mitt., 1597, XXII, 123.

- Cucurbitaria Berberidis* A. Gray, 616, XVI, 66.
 — *cinnabarina* Grev., 612, XVI, 66.
 — *cucurbitula* O. K., 965, XIX, 395.
 — *elongata* Grev., 617, XVI, 66.
 — *laburni* Ces. et De Not., 506, XV, 193; 506, XXIII, 219.
 — *Rabenhorstii* Auerw., 968, XIX, 396.
Cutleria multifida Grev., 1217, XX, 27.
Cutomycetes Asphodelii Thüm., 706, XVII, 258; 706, XXI, 212.
Cyclomyces australis Krombh., 606, XVI, 64.
 — *fuscus* Kunze, 606, XVI, 64.
 — — Kunze var. *madagascariensis* Keissl., 606, XVI, 64.
Cyclotella Kützgingiana W. Sm., 1845, XXV, 235.
 — *Meneghiana* Kütz., 1845, XXV, 235.
Cylindrocella Urticae Bonord., 839, XVIII, 358.
Cylindrocystis crassa 1202, XX, 24.
Cylindrospermum macrospermum Rabh., 1003, XIX, 403.
 — *majus* Kütz., 1003, XIX, 403; 1205, XX, 24.
 — — *b. leptodermaticum* Rabenh., 428, XV, 176.
 — *musciola* Kütz., 428, XV, 176.
Cylindrospora cylindroides Schröt., 1490, XXII, 100.
 — *lactea* Schröt., 1488, XXII, 99.
 — *Lampsanæ* Schröt., 1492, XXII, 100.
 — *Phyteumatis* Schröt., 1493, XXII, 100.
 — *Sambucina* Schröt., 1487, XXII, 99.
 — *Urticae* Schröt., 1494, XXII, 100.
 — *variabilis* Schröt., 1835, XXV, 231.
Cylindrosporium Ficariae Berk., 1183, XX, 20.
 — *Grevilleanum* Tul., 1834, XXV, 201.
 — *hamatum* Bres., 992, XIX, 460.
 — *Heraclei* Ell. et Ev., 992, XIX, 400.
 — *Padi* Karst., 993, XIX, 401.
 — *Ranunculi* Sacc., 994, XIX, 401.
 — — Sacc. f. *Scelerati* Brun., 1183, XX, 21.
Cylindrothecium cladorrhizans Sull., 1687, XXIII, 233.
 — *concinum* Schimp., 1093, XIX, 426.
 — *seductrix* Sull., 1688, XXIII, 234.
Cymatopleura Solea 1844, XXV, 235.
Cymbella Cistula Hamp., 1507, XXII, 103.
 — *Ehrenbergii* Kütz., 1507, XXII, 103.
 — *flexella* Kütz., 534, XV, 201.
 — *gastroides* Kütz., 741, XVII, 268.
 — *Hopekirkii* Moore 1506, XXII, 103.
 — *lanceolata* Ehrenb., 1942, XXVI, 165.
 — *microcephalla* Grunow, 1942, XXVI, 165.
Cynodontium gracilescens Schimp., 1071, XIX, 423.
 — *polycarpum* Schimp., 1072, XIX, 423.
 — *strumiferum* De Not., 671, XVI, 85.
Cypella capula Fries, 1801, XXV, 223.
Cyphelium Bolanderi Zahlbr., 1647, XXIII, 224.
 — *californicum* A. Zahlbr., 1952, XXVI, 169.
 — *chrysocephalum* Körb., 551, XV, 206.
 — *inguinans* Trevis., 352, XIII, 461.
 — *lucidum* Th. Fr., 172, XI, 96.
 — *melanophaeum* Stein., 441, XV, 180.
 — *pusillum* Mass., 1525, XXII, 106.
 — *turbinatum* Ach., 351, XIII, 460.
 — *tympaellum* Ach., 352, XIII, 461.
Cyrtidula ptelaeodes Muck., 444, XV, 181.
 — *quercus* Minks, 62, IX, 135.
Cyrtosphaeria ditopa Ces. et De Not., 826, XVIII, 355.
Cystocoleus ebeneus Thsv., 1860, XXV, 241.
 — *niger* Hariot, 1860, XXV, 241.
 — *rupestris* Rabenh., 1638, XXIII, 221; 1860, XXV, 241.
Cystopus Bliti de Bary, 112, XI, 83.
 — *cubicus* de Bary, 111, XI, 83.
 — *Tragopogonis* Schröter, 111, XI, 83.
 — *verrucosus* Hazsl., 805, XVIII, 350.
Cystosira barbata Ag., 145, XI, 90.
 — *Hoppii* Ag., 1635, XXIII, 221.
Cystospora ambiens Sacc., 979, XIX, 398.
 — *Capreae* Fuck., 830, XVIII, 357.
 — *ceratophora* Sacc., 979, XIX, 398.
 — *Harioti* Briard., 1327, XXI, 209.
 — *melasperma* var. *fraxini* Allesch., 979, XIX, 398.
 — *minuta* Thüm., 979, XIX, 398.
 — *Mougeotii* Lév., 1328, XXI, 210.
 — *xanthosperma* Fr., 830, XVIII, 357.
Cyttaria Gunnii Berk., 137, XI, 89.
Dacampia Hookeri Mass., 372, XIII, 465.
Dacryomyces Urticae Corda, 839, XVIII, 358.
Daedalea amanitoides Pal., 1912, XXVI, 157.
 — *quercina* Fries, 312 b, XXII, 101.
 — — Pers., 312, XIII, 445.
 — *unicolor* Fries, 313, XIII, 445.
Darlucula filum Cast. f. *hypocreoides* Fuck., 980, XIX, 398.
 — *genistalis* Sacc. var. *hypocreoides* Sacc., 980, XIX, 398.
Dasya elegans J. A. Ag., 1515, XXII, 105.
 — *Kützgingiana* Bias., 1515, XXII, 105.
 — *pallescens* Kütz., 1515, XXII, 105.
Dasyactis brunnea Näg., 332, XIII, 449.
 — *minutula* Kütz., 748, XVII, 270.
Dasyclados claviformis Ag., 348, XIII, 459.
 — *vermicularis* F. Krasser, 348, XIII, 459.
Dasyscypha acuum Sacc., 527, XV, 199; 1442, XXII, 91.
 — *aspidicola* Gmel., 1441, XXII, 90.
 — *brunneola* Sacc., 1169, XX, 18.
 — *Calyciformis* Rehm, 954, XIX, 392; 1821, XXV, 227.

- Dasyscypha calycina* Fuck., 953, XIX, 392.
 — *calyculaeformis* Sacc., 1617, XXIII, 217.
 — *ciliaris* Sacc., 1822, XXV, 228.
 — *clandestina* Fuck., 1447, XXII, 91.
 — *echinulata* Sacc., 1728, XXV, 275.
 — *fuscescens* Rehm, 1169, XX, 18.
 — *grisella* Sacc., 1443, XXII, 91.
 — *Morthieri* Sacc., 1445, XXII, 91.
 — *nervisequa* Bres., 1728, XXV, 233.
 — *nivea* Sacc., 1729, XXIV, 275.
 — *Rhytismatis* Sacc., 1728, XXIV, 275.
 ? — *subtilissima* Sacc., 1821, XXV, 228.
 — *Willkommii* Hartig, 953, XIX, 392.
Dawsonia superba Grev., 200, XI, 101.
Dellesseria Hypoglossum Lam., 1514, XXII, 105.
Dematium epiphyllum 220, XII, 82.
 — *salicinum* 501, XV, 192.
Dendrographa leucophaea Darb., 450, XV, 181.
 — *minor* Darb., 1527, XXII, 109; 1527b, XXIV, 287.
Dendrophoma eumorpha Sacc., 1831, XXV, 230.
Dendrostilbella baeomyciodes Lindau, 1838, XXV, 232; 1939, XXVI, 164.
Dendryphium resinae Corda, 1939, XXVI, 164.
Depazea atriplicicola Fries, 1454, XXII, 93.
 — *cornicola* DC., 983, XIX, 399.
 — *juglandicola* Fries, 730, XVII, 264.
 — *prunicola* Opiz, 977, XIX, 397.
 — *stachydicola* Lasch., 1332, XXI, 211.
Dermatea carpineae Rehm, 1163, XX, 16.
 — — Fries, 1163, XX, 17.
 — *Cerasi* Fries, 960, XIX, 394.
 — *eucrita* Rehm, 722, XVIII, 359.
 — *fascicularis* Fries, 1436, XXII, 89.
 — *frangulae* Tul., 959, XIX, 393.
Dermatella eucrita Sacc., 722, XVIII, 359.
 — *frangulae* Karst., 959, XIX, 393.
Dermatina ruanidea A. Zahlbr., 443, XV, 181.
Dermatocarpon (sect. *Catopyrenium*)
 — *adriaticum* A. Zahlbr., 1644, XXIII, 223.
 — *aquaticum* A. Zahlbr., 652, XVI, 81.
 — (sect. *Endopyrenium*) *cartilagineum* A. Zahlbr., 1645, XXIII, 223.
 — *fluviale* Th. Fries, 652, XVI, 81.
 — (*Placidium*) *hepaticum* Th. Fries, 466, XV, 186.
 — *miniatum* var. *papillosum* Müll. Arg., 158, XI, 93.
 — *pallidum* Krphbr., 1522, XXII, 108.
Dermatophyton radicans De Toni, 649, XVI, 79.
 — — Peter, 649, XVI, 79.
Dermocarpa prasina Born. et Thur., 1518, XXII, 106.
Desmarestia filiformis Ag., 1512, XXII, 104.
Desmatodon griseus Jur., 1577, XXII, 119.
Desmazeria homalea Mont., 1972, XXVI, 176.
Desmidiium apiculosum Ehrenb., 541, XV, 203.
 — *cylindricum* Grev., 852, XVIII, 362.
Diachea elegans Fries, 3, IX, 119.
 — *leucopoda* Rostaf., 3 IX, 119.
Diaporthe conjuncta Fuck., 975, XIX, 397.
 — *innesii* Nke., 624, XVI, 68.
 — *nigricolor* Nitschke, 974, XIX, 397.
 — *Thelebola* Sacc., 1315, XXI, 207.
Diatoma hiemale Heib. var. *mesodon* 75, IX, 137.
 — *vulgare* Bory, 741, XVII, 268.
Diatrype bullata Fries, 514, XV, 195.
 — *disciformis* Fries, 515, XV, 195.
 — *stigma* 723, XVII, 263.
Dicaeoma Betonicae 1413, XXII, 84.
 — *Epilobii* Opiz, 923, XIX, 385.
 — *Gentianae* Opiz, 1118, XX, 6.
 — *verrucosum* Nees, 803, XVIII, 350.
Dichosporangium Chordariae Wolny, 1750, XXIV, 281.
Dichothrix Nordstedtii Born. et Flah. var. *salisburgensis* G. Beck, 73, IX, 137.
Dicranella cerviculata Schimp., 1073, XIX, 423; 1073 b, XXV, 252.
 — *heteromalla* Schimp., 288, XII, 96; 288 b, XVIII, 375.
 — — var. *interrupta* Schimp., 1074, XIX, 423.
Dicranodontium uncinatum Jäg., 1690, XXIII, 234.
Dicranoweisia cirrata Lindb., 1781, XXIV, 288.
Dicranum albicans Bryol. europ., 1265, XX, 42.
 — *ambiguum* Hedw., 1987, XXVI, 180.
 — *Bergeri* Blandow, 1984, XXVI, 179.
 — *cerviculatum* Hedw., 1073, XIX, 423.
 — *congestum* Brid., 1985, XXVI, 180.
 — *ericoides* Griff., 1693, XXIII, 234.
 — *flagellare* Hedw., 395, XIII, 471.
 — *fulvum* Hook., 1986, XXVI, 180.
 — *graciliscens* Wab. et Mohr, 1071, XIX, 423.
 — *interruptum* Hedw., 1074, XIX, 423.
 — *longifolium* Ehrh., 766, XVIII, 277.
 — — var. *hamatum* Jur., 777, XVIII, 277.
 — *majus* Sm., 1075, XIX, 224.
 — *microcarpum* Schrad., 1082, XIX, 425.
 — *Mühlenbeckii* Bryol. europ., 289, XII, 96.
 — *nodiflorum* C. Müll., 1694, XXIII, 234.
 — *polycarpum* Ehrh., 1072, XIX, 423.
 — *pterotoneuron* C. Müll., 1695, XXIII, 235.
 — *reflexum* C. Müll., 1393, XXI, 225.
 — *Sauteri* Schpr., 778, XVII, 277.
 — *scariosum* Wils., 1691, XXIII, 234.
 — *scoparium* Hedw., 488, XV, 190.
 — *spurium* Hedw., 290, XII, 96.
 — *strumifer* Ehrh., 671, XV, 85.
Dictydium ambiguum Schrad., 4, IX, 120.
 — *cernuum* Schrad., 4, IX, 120.
 — *umbilicatum* Schrad., 4, IX, 120.
Dictyonema volubilis Grev., 646, XVI, 78.

- Dictyopteris elongata* Lamour, 1511, XXII, 104.
 — *polypodioides* Lamour, 1511, XXII, 104.
 — *Dictyota Atomaria* Grev., 1510, XXII, 104.
 — *attenuata* Kütz., 641, XVI, 77.
 — *denticulata* Kütz., 1510, XXII, 104.
 — *dichotoma* Lamour f. *implexa* Hauck, 646, XVI, 76.
 — — var. *implexa* Ag., 641, XVI, 77.
 — *elongata* Kütz., 641, XVI, 77.
 — *implexa* Lamour, 641, XVI, 77.
 — *latifolia* Kütz., 641, XVI, 77.
 — *vulgaris* Kütz., 641, XVI, 77.
 — *zonata* Lamour, 1510, XXII, 104.
Diderma testaceum Pers., 2, IX, 119.
Didymaria didyma Schröt., 1486, XXII, 99.
 — *Unger* Corda, 1486, XXII, 99.
Didymella epipolytropa Berl. et Vogl., 970, XIX, 396.
Didymium costatum Fries, 1826, XXV, 228.
 — *hemisphaericum* Fuck., 938, XIX, 390.
 — *herbarum* Fries, 1826, XXV, 228.
 — *insigne* Reinsch, 1010, XIX, 407.
 — *leucopus* Fries, 1826, XXV, 228.
 — *squamulosum* Fries, 1826, XXV, 228.
 — *terrestre* Fries, 938, XIX, 390.
 — *testaceum* Schrad., 2, IX, 119.
Didymodon alpigenus de Vent., 1678, XXIII, 232.
 — *austriacus* Schiffn. et Baumg., 1582, XXII, 120.
 — *cordatus* Jur., 396, XIII, 471.
 — *fragilis* Drum., 890, XVIII, 373.
 — *giganteus* Jur., 1270, XX, 43; 1270 b, XXII, 123.
 — *homomallum* 1266, XX, 42.
 — *luridus* Horsch., 1269, XX, 42.
 — *rigidulus* Hedw., 1580, XXII, 120.
 — *rufus* Lorentz, 1078, XIX, 424.
 — *validus* Limpr., 1581, XXII, 120.
Didymosphaeria conoidea Niessl., 1152, XX, 14.
 — *epipolytropa* Wint., 970, XIX, 396.
 — *inaequalis* Niessl., 520, XV, 197.
 — *Patellae* Rehm, 1152, XX, 14.
Dilaena Blyttii Dum., 384, XIII, 469.
Dimerella diluta Trev., 1028, XIX, 413.
Dimerium Lepidagathis Sacc., 1148, XX, 14.
Dinerospora dimera Stein., 1550, XXII, 114.
Dimerosporium erysiphinum Henn., 964, XIX, 394.
 — *Lepidagathis* Henn., 1148, XX, 14.
Diphraithora candicans Jatta, 1364, XXI, 220.
 — *olivacea* Jatta, 864, XVIII, 366.
Diphyscium foliosum Mohr, 593, XV, 213.
 — *sessile* Lindb., 593, XV, 213.
Diplococcium resinae Sacc., 1939, XXVI, 163.
Diplocolon Heppii Näg., 632, XVI, 71.
Diplodina Sandstedii Zopf, 1330 b, XXIV, 278; 1330, XXI, 210.
Diplophyllia albicans Trev., 93, IX, 141; 200, XI, 101.
Diplotomma geographicum Jatta, 1235, XX, 33.
 — (sect. *Lopadium*) *peziodeum* Jatta, 1031, XIX, 414.
 — *viridiatum* Jatta, 1236, XX, 34.
Dirina californica Tuck., 1859, XXV, 240.
 — *Hassei* A. Zahlbr., 635, XVI, 81.
 — *rediunta* A. Zahlbr., 654, XVI, 82.
Discosia Artocreas Fries, 1474, XXII, 96.
Disphinctium cruciferum Hansg., 860, XVIII, 365.
 — *curtum* Näg., 231, XIII, 460; 231, XII, 84.
Distichium capillaceum Bryol. europ., 783, XVII, 278.
 — *glaucescens* Hampe, 782, XVII, 278.
 — *inclinatum* Bryol. europ., 1268, XX, 42.
Ditopella ditopa Schröt., 826, XVIII, 355.
 — *fusispora* de Not., 826, XVIII, 356.
Ditrichum homomallum Hampe, 1266, XX, 42.
 — *pallidum* Hampe, 1267, XX, 42.
Dothichiza populea Sacc. et Br., 1334, XXI, 211.
Dothidea Anemones DC., 202, XII, 75.
 — *betulina* Fries, 1159, XX, 16.
 — *Crotonis* Cooke, 625, XVI, 68.
 — *dolichogena* Berk. et Br., 1318, XXI, 208.
 — *genistalis* Fries, 980, XIX, 398.
 — *graminis* Fries, 519, XV, 169.
 — *Junci* Fries, 1317, XXI, 208.
 — *Loranthii* Molkenb., 1720, XXIV, 273.
 — *natans* A. Zahlbr., 967, XIX, 395.
 — *Podagrariae* Fries, 1185, XX, 16.
 — *Pteridis* Fries, 626, XVI, 68.
 — *Ranunculi* Fries, 629, XVI, 69.
 — *Robertiani* Fries, 1721, XXIV, 274.
 — *Sambuci* Fries, 967, XIX, 395.
 — *Solidaginis* β . *Virgaureae* Fries, 920, XIX, 385.
 — *sordidula* Lev., 1720, XXIV, 273.
 — *sphaeroides* Fries, 1162, XX, 16.
 — *Ulmi* Fries, 1319, XXI, 208.
Dothidella betulina Sacc., 1159, XX, 16.
 — *sordidula* Sacc., 1720, XXIV, 273.
Dothiora sphaeroides Fries, 1162, XX, 16.
Draparnaldia glomerata Ag. var. *genuina* 85, IX, 140.
Draparnaudia glomerata var. *acuta* Ag., 841, XVIII, 359.
Dryptodon Hartmani Limpr., 1080, XIX, 424.
Dumortieravelutina Schiffn., 1391, XXI, 225.
Duvalia angustifolia Lindb., 1261, XX, 41.
Dysphinctium de Baryi (Rabenh.) Heimerl, 231, XIX, 410.
 — *palangula* Hansg., 231, XIX, 410.

- Echinastrum spinulosum* Näg., 336, XIII, 455.
Echinella circularis Gres., 1508, XXII, 104.
 — *olivacea* Lyngb., 1008, XIX, 405.
Ectocarpus aecidioides Rosenwinge, 545, XV, 203.
 — *caespitulus* Ag., 1945, XXVI, 166.
 — *granulosus* Ag., 1846, XXV, 235.
 — *laetus* Ag., 1846, XXV, 233.
 — *paradoxus* Mont., 1945, XXVI, 166.
 — *secundatus* Suhr, 1846, XXV, 235.
 — *siliculosus* var. *β. uvaeformis* Lyngb., 1749, XXIV, 280.
 — *sphaerophorus* Carm., 544, XV, 203.
Ectosperma caespitosa Vauch., 1014, XIX, 408.
 — *geminata* Vauch., 1014, XIX, 408.
 — *racemosa* Vauch., 847, XVIII, 361.
 — *sessilis* Vauch., 848, XVIII, 361; 1841, XXV, 234.
Ectostroma Liriodendri Fries, 729, XVII, 264.
Ectropothecium Chamissonis Jaeg. var. *tepidum* Fleisch., 1998, XXVI, 181.
 — *excavatum* Broth., 1800, XXIV, 291.
 — *filicaule* Fleisch., 1297, XX, 47.
 — *Penzigianum* Fleisch., 1298, XX, 47.
 — *verrucosum* Jaeg., 1600, XXII, 123.
Eichleriella Kmetii Bres., 1807, XXV, 225.
Elaphomyces aculeatus Vill., 1819, XXV, 227.
 — *cervinus* Schröt. var. *hassiacus* Fisch., 1733, XXIV, 276.
 — *granulatus* Fries, 1733, XXIV, 276.
 — *hassiacus* Hasse 1733, XXIV, 276.
Elfvigia megalum Murr, 1143, XX, 13.
Elvella ciliata Schaeff., 1323, XXI, 209.
 — *clavata* Schaeff., 138, XI, 89.
 — *undecima* Schaeff., 525, XV, 198.
Encephaliographa Elisae Mass., 555, XV, 206.
Encoelia fascicularis Karst., 1436, XXII, 89.
Encyoneura caespitosum Kütz., 1507, XXII, 103.
Endocarpiscum Guepini Nyl., 159, XI, 93.
Endocarpion cinereum var. *cartilagineum* Nyl., 1645, XXIII, 223.
 — *daedaleum* Krplh., 1645, XXIII, 223.
 — *β. terrestre* Arn., 1645, XXIII, 223.
 — *fluvatile* DC., 652, XVI, 81.
 — *Guepini* Delc., 159, XI, 93.
 — *hepaticum* Ach., 466, XV, 186.
 — *miniaturum γ. aquaticum* Schaer., 652, XVI, 81.
 — ** papillosum* Anzi, 158, XI, 93.
 — *Moulinsii* Schaer., 158, XI, 93.
 — *pallidum* Ach., 1522, XXII, 107.
 — *pulchellum* Bor., 1855, XXV, 239.
 — *trachyticum* Lojka, 176, XI, 97.
Endogene pisiformis Link, 210, XII, 80.
Endoptychum agaricoides Czern., 1716, XXIV, 272.
Endopyrenium cartilagineum Sydow, 1645, XXIII, 223.
 — *daedaleum* Körb., 1645, XXIII, 223.
 — *hepaticum* Körb., 466, XV, 186.
 — *pusillum β. pallidum* Körb., 1522, XXII, 108.
 — *trachyticum* Haszl., 176, XI, 97.
Engizostoma Kunzei O. K., 973, XIX, 397.
Entèromorpha compressa Grev., 731, XVII, 266; 1747, XXIV, 280.
 — *— var. lingulata* Hauck, 1741, XXIV, 279.
 — *intestinalis* Lk. f. *bullosa* Rabenh., 436, XV, 179.
 — *— Lk. f. crispa* Kütz., 436, XV, 179.
 — *— Lk. f. cylindracea* Ag., 1208, XX, 26.
 — *— Lk. f. tubulosa* Rabenh., 437, XV, 179.
 — *— Lk. var. tubulosa* Kütz., 437 b, XX, 28.
 — *lingulata* Ag., 1741, XXIV, 279.
 — *pillifera* Kütz., 1012, XIX, 408.
 — *prolifera* Ag., 1012, XIX, 408.
 — *salina* Kütz. f. *mareotica* Hansg., 1011, XIX, 407.
 — *tubulosa* Kütz., 437, XV, 179.
 — *— Kütz. β. pilifera* Ahln., 1012, XIX, 408.
Entodon cladorrhizans C. Müll., 1687, XXIII, 233.
 — *seductrix* C. Müll., 1688, XXIII, 234.
Entomospodium maculatum Lev., 418, XV, 408.
 — *— Lev. γ. Cydoniae* Sacc., 418, XV, 172.
Entyloma Corydalis de Bary 903, XIX, 380.
 — *Glaucii* Dang., 1301, XXI, 204.
 — *serotinum* Schröt., 904, XIX, 380.
Ephemeropsis tjibodensis Goeb., 1293, XX, 46.
Epichloë typhina L. et C. Tul., 133, XI, 88.
Epiclemmidia lusitanica Pott., 649, XVI, 79.
Epitea Baryi Berk. et Br., 1124, XX, 8.
 — *miniata* E. Fries, 708, XVII, 259.
Eremosphaera viridis de Bary, 1010, XIX, 407; 149, XI, 91.
Erinella aspidiicola Quél., 1441, XXII, 90.
 — *calycina* Quél., 1821, XXV, 228.
 — *calyculaeformis* Quél., 1617, XXIII, 217.
 — *chrysostigma* Quél., 1439, XXII, 90.
 — *clandestina* Quél., 1447, XXII, 92.
Erineum aureum Pers., 1718, XXIV, 273.
 — *Populinum* Schum., 1718, XXIV, 273.
Erysibe Alchemillae Wallr., 1402, XXII, 82.
 — *areolata* Wallr., 710, XVII, 260.
 — *baccata* 908, XIX, 381.
 — *Epilobii* Lk., 1310, XXI, 206.
 — *Euphorbiae* Wallr., 1130, XX, 4.
 — *muricella* var. *Conii* Wallr., 929, XIX, 387.
 — *nitida* Wallr. var. *Chaerophylli* Wallr., 1121, XX, 7.
 — *Panicorum* Wallr., 801, XVIII, 349.
 — *Pulsatillae* Wallr., 709, XVII, 260.
 — *Rhododendri* Wallr., 1132, XX, 10.
 — *Rosae* Wallr., 708, XVIII, 259.

Erysibe suaveolens Wallr., 1130, XX, 9.
 — *tortilis* Lmk., 129, XI, 87.
 — *vera* Wallr., 9, IX, 122.
 — — *δ. Holciavenacei* Wallr., 901, XIX, 379.
Erysiphe Aceris DC., 123, XI, 86.
 — *Alni et Betulae* DC., 128, XI, 87.
 — *Asterisci* P. Magnus, 1149, XX, 14.
 — *Astragali* DC., 126, XI, 86.
 — *Berberidis* DC., 127, XI, 87.
 — *clandestina* Bw. Bern., 962, IX, 394.
 — *communis* Fries, 132, XI, 88; 1427, XXII, 87.
 — *Coryli* Hedw., 120, XI, 85.
 — *Euonymi* DC., 1311, XXI, 207.
 — *gigantiasca* Thüm. et Sorok, 1917, XXVI, 159.
 — *Heraclei* DC., 130, XI, 87.
 — *Lonicerae* DC., 124, XI, 86.
 — *Martii* Lev., 131, XI, 88.
 — *mors-uvae* Schwein., 1813, XXV, 226.
 — *Pisi* DC., 131, XI, 88.
 — — *Grev.*, 1427, XXII, 87.
 — *Polygoni* DC., 1427, XXII, 87; 132, XI, 88.
 — *Prunastri* DC., 122, XI, 86.
 — *salicis* DC., 121, XI, 86.
 — *taurica* Lév., 1426, XXII, 87.
 — *tortilis* Fries 129, XI, 87.
 — *tridactyla* Desm., 118, XI, 84.
 — *Umbelliferarum* de Bary, 130, XI, 87.
Euactis atra Kütz., 718, XVII, 270.
 — *ligustica* Kütz., 748, XVII, 270.
 — *rivularis* Rabenh., 332, XIII, 449.
 — *rufescens* Näg., 332, XIII, 449.
Euastrum armatum Kütz., 539, XV, 202; 650, XVI, 80.
 — *humerosum* Ralfs, 539, XV, 203.
 — *insigne* Hass. var. *montanum* Racib., 1010, XIX, 407.
 — *oblongum* var. *oblongiforme* Ralfs, 76, IX, 183.
 — — *f. scrobiculata* Nordst., 536, XV, 202.
 — *tetrophthalmum* Kütz., 534, XV, 201.
Eucalypta contorta Lindb., 892, XVIII, 373; 892 b, XXV, 252.
 — *ligulata* Spruce, 1682, XXIII, 233.
 — *streptocarpa* Hedw., 892, XVIII, 374.
Eucladium verticillatum Bryol. Europ., 485, XV, 190.
Eurhynchium crassinerve Bryol. Europ., 1283, XX, 45.
 — *crassinervium* Bryol. Europ., 1097, XIX, 427; 1097 b, XX, 48.
 — *striatulum* Bryol. Europ., 1283, XX, 45; 1097 b, XX, 48.
 — *striatum* Schimp., 680, XVI, 87.
 — *Swartzii* Curn., 682, XVI, 87.
 — *Tommasinii* Husb., 681, XVI, 87; 1882, XXV, 249.

Euryachora Pithecolobii Racib., 1723, XXIV, 274.
Eustilbum baecomycioides Arn., 1838, XXV, 232.
 — *resinae* Magn., 1838, XXV, 232.
Eutypa Acharii Tul., 1922, XXVI, 160.
 — *hypoxantha* Starb., 720, XVII, 202.
Evernia americana Mey. et Tw., 1044, XIX, 417.
 — *arenaria* E. Fries, 574, XV, 216.
 — *canariensis* Montg., 769, XVII, 276.
 — *divaricata* Ach., 462, XV, 185.
 — — *Schuler*, 1049, XIX, 418.
 — — *Ach. subsp. illyrica* A. Zahlbr., 1049, XIX, 418.
 — *divergens* E. Fries, 1554, XXII, 115.
 — *furfuracea* Fries, 156, XI, 92.
 — — *f. ceratea* Nyl., 768, XVII, 276.
 — *isidiophora* Zopf, 876, XVIII, 369.
 — *olivetorina* Zopf, 1046, XIX, 418.
 — *prunastri* Ach. b. f. *sorediifera* 246, XII, 89.
 — *vulpina* Ach., 878, XVIII, 371.
Excipula Bonordeni Haszl., 721, XVII, 262.
 — *Ranunculi* Rabenh., 629, XVI, 69.
Exidia pythia Fries, 941, XIX, 390.
Exoascus alnitorquus Wint., 116, XI, 84.
 — *amentorum* Sadeb., 116, XI, 84.
 — *aureus* Sadeb., 1718, XXIV, 273.
 — *Insititiae* Sadeb., 1719, XXIV, 273.
 — *Populi* Thüm., 1718, XXIV, 273.
 — *Rostrupianus* Sadeb., 1146, XX, 13.
Exobasidium Rhododendri Cram., 321, XIII, 447.
 — *Vaccinii uliginosi* Bond., 322, XIII, 447.
Exosporium depazeoides Desm., 727, XVII, 264.
 — *Lolii* Spreng., 1194, XX, 22.
Fabraea congener Sacc., 629, XVI, 69.
 — *litigiosa* Sacc., 629, XVI, 69.
 — *Ranunculi* Karst., 629, XVI, 69; 629, XX, 23.
Fabronia octoblepharis Schwäg., 1892, XXV, 250.
Farinaria Stellariae Sow., 10, IX, 123.
Fibrillaria subterranea Pers., 1199, XX, 23.
Ficus membranaceus Stockh., 1511, XXII, 104.
Fimbriaria elegans Sprg., 1689, XXIII, 234.
Fischerella major Gom., 333, XIII, 455.
Fissidens adiantoides Hedw., 492, XV, 191.
 — *bryoides* Hedw., 491, XV, 191.
 — *ceylonensis* Dozy et Molkb., 1394, XXI, 225.
 — *Giesenhageni* Broth., 1292, XX, 46.
 — *taxifolius* 490, XV, 190.
Flos aquae Trev., 1517, XXII, 106.
Fomes applanatus Sacc., 940, XIX, 390.
 — *fomentarius* Cook., 310, XIII, 445.
 — *megaloma* Sacc., 1143, XX, 13.
 — *obliquus* Sacc., 1603, XXIII, 214.

- Fomes subferreus* Murr, 1908, XXVI, 157.
 — *Tsugae* P. A. et D. Sacc., 1308, XXI, 206.
 — *ungulatus* Sacc., 939, XIX, 390.
Fontinalis albicans Web., 583, XV, 212.
 — *gothica* Card. et Arn., 297, XII, 97.
 — *Juliana* Savi, 888, XVIII, 373.
 — *minor* L., 499, XV, 192.
 — *squamosa* L., 594, XV, 219; 594 b, XXIII, 236.
Fossombronina Wondraczeki Dum., 881, XVIII, 373.
Fragilaria hiemalis Lyngb., 75, IX, 137.
 — *mesodon* Ehrb., 75, IX, 137.
Frankia subtilis Brunch., 1740, XXIV, 278.
Frullania Asagrayana Montg., 700, XVI, 90; 700 b, XXIII, 236.
 — *Cesatiana* De Not., 1562, XXII, 117.
 — *dilatata* Dum., 385, XIII, 469.
 — *fragilifolia* Tayl., 1375, XXI, 223.
 — *tamarisci* Dum., 1066, XIX, 422; 1066 b, XX, 47.
Frustulia circularis Duby, 1508, XXII, 104.
Fucus barbatus Good et Woodw., 145, XI, 90.
 — *botryoides* Wulf., 1847, XXV, 236.
 — *confervoides* L., 547, XV, 204.
 — *Hypoglossum* Woodw., 1514, XXII, 105.
 — *inflatus* Vahl. f. *disticha* Börg., 1746, XXIV, 280.
 — *laciniatus* Huds., 1757, XXIV, 282.
 — *longissimus* Wulf., 547, XV, 204.
 — *nervosus* DC., 1220, XX, 28.
 — *ocellatus* Lamor., 645, XVI, 77.
 — *Opuntia* Good. et Woodw., 350, XIII, 460.
 — *ovarius* Wulf., 1847, XXV, 236.
 — *polypodioides* Desf., 1511, XXII, 104.
 — *procerrimus* Esp., 547, XV, 204.
 — *scorpioides* Fl. Dan., 547, XV, 204.
 — *squamarius* Gmel., 1516, XXII, 105.
 — *turbinatus* L., 1509, XXII, 104.
 — *Uvarius* L., 1847, XXV, 236.
 — *vermicularis* 348, XIII, 459.
 — *verrucosus* Huds., 547, XV, 204.
 — *virsoides* Agh., 144, XI, 90.
 — *volubilis* L., 646, XVI, 78.
Fulgensia vulgaris Mass. et De Not., 668, XVI, 84.
Fumago Lauri Bory et Jacq., 1428, XXII, 88.
Funaria hygrometrica Sibth. var. *calvescens* 296, XII, 97.
 — *mediterranea* Lindb., 1275, XX, 43.
 — *microtoma* Bryol. Europ., 295, XII, 97.
Fusarium heterosporum Nees, 1194, XX, 22; 1194 b, XXVI, 165.
 — *hibernans* Lindau, 1839, XXV, 232.
 — *Lolii* Lk., 1194, XX, 22.
 — *Lucumae* Henn., 1738, XXIV, 277.
 — *maculans* Bereng., 985, XIX, 399.
 — *minimum* Fuck., 1839, XXV, 232.
Fusarium nivale Sor., 1839, XXV, 232.
 — *Schnablium* Allesch., 997, XIX, 401.
 — *tremelloides* Grev., 839, XVIII, 358.
Fusicladium dendriticum Fuck., 1190, XX, 22.
 — *orbiculatum* Höhn., 1190, XX, 22.
 — *pirinum* Fuck., 1496, XXII, 101.
 — *Schnablium* Allesch., 997, XX, 24.
 — *Tremulae* Franch., 1499, XXII, 101.
 — *virescens* Bon., 1499, XXII, 101.
Fusidium Geranii West., 1188, XX, 21.
 — *Juglandis* Bereng., 217, XII, 81.
 — *Ranunculi* Bon., 994, XIX, 401.
 — *roseum* Fuck., 1187, XX, 21.
Fusisporium album Desm., 216, XII, 81.
 — *concors* Casp., 1837, XXV, 231.
 — *lactaeum* Desm., 1488, XXII, 99.
 — *Urticae* Desm., 1494, XXII, 100.
Gabura nigrescens O. K., 270, XII, 94.
Galera mycenopsis Sacc., 947, XIX, 391.
Galionella distans Ehrh., 1632, XXIII, 220.
Ganoderma (Amauroderma) Sikorae Bres., 1909, XXVI, 157.
 — *Tsugae* Murr, 1308, XXI, 206.
Gasparrinia callopisma Tornab., 1256, XX, 39.
 — *cirrochroa* Dalla Torre et Sarnth., 1257, XX, 39.
 — *granulosa* Syd., 1056, XIX, 420.
Gastridium cylindricum Lyngb., 749, XVII, 271.
Gastroclonium Uvaria Kütz., 1847, XXV, 236.
Geaster Bryantii Berk., 1915, XXVI, 158.
 — — var. *minor* Berk., 1915, XXVI, 158.
 — *coliformis* Fries, 1916, XXVI, 158.
 — *fimbriatus* Fries, 330, XIII, 499.
 — *lageniformis* Vitt., 1811, XXV, 225.
 — *marchicus* Henn., 950, XIX, 391.
 — *nanus* Hollos, 1914, XXVI, 158.
 — *orientalis* Hazsl., 1915, XXVI, 158.
 — *Rabenhorstii* Kunze, 1914, XXVI, 158.
 — — *β. orientalis* Hazsl., 1915, XXVI, 158.
 — *Schmideli* Vittad., 1914, XXVI, 158.
Geastrum nanum Pers., 1914, XXVI, 158.
Gehebia cateractarum Schpr., 1270, XX, 43.
 — *gigantea* Boul., 1270, XX, 43.
Geminella exotica Schroeder, 11, IX, 123.
 — *melanogramma* Magn., 905, XIX, 380.
Geoglossum glabrum Pers., 530, XV, 200.
 — *ophioglossoides* Sacc., 530, XV, 200.
 — *viride* Pers., 206, XII, 79.
Geopyxis Catinus Sacc., 1730, XXIV, 276.
 — *cupularis* Sacc., 1730, XXIV, 275.
Georgia pellucida Rabenh., 584, XV, 212.
Geoscypha epichrysea Beck, 1731, XXIV, 276.
 — *Leineri* Lamb., 1731, XXIV, 276.
 — *subcupularis* Rehm, 1730, XXIV, 276.
Gibellina Cerealis Pass., 509, XV, 194.
Gibbera salisburgensis Niessl, 824, XVIII, 355.
 — *Straussii* A. Zahlbr., 824, XVIII, 355.
Gigartina confervoides Lam., 547, XV, 204.

- Glaucocystis Nostochinearum* Itzigs., 149, XI, 91.
Globulina sanguinea Turp., 343, XIII, 458.
Gloeocapsa alpina Näg., 228, XII, 84.
— *fenestralis* Kütz., 433, XV, 178.
— *magnum* Kütz., 146, XI, 90.
— *nigrescens* Näg., 228, XII, 84.
— *rupestris* Kütz., 228, XII, 84.
Gloeocystidium polygonicum Höhn. et Litsch., 1906, XXVI, 156.
Gloeocystis gigas Lagerh., 149, XI, 91.
Gloeopeniophora aurantiaca Höhn., 1712, XXIV, 272.
— *incarnata* Höhn. et Litsch., 1804, XXV, 224.
Gloeosporium circinans Sacc., 990, XIX, 400.
— *cylindrospermum* Sacc., 215, XII, 81.
— *Daphnes* Oudem., 1480, XXII, 97.
— *ficariae* Cooke, 1183, XX, 20.
— *Equiseti* Ell. et Ev., 1178, XX, 19.
— *Lindemuthianum* Sacc. et Magn., 1477, XXII, 97.
— *Louisiae* Bäuml., 419, XV, 173.
— *pachybasium* Sacc., 1476, XXII, 97.
— *Populi albae* Desm., 990, XIX, 400.
— *Ribis* Mont. et Desm., 991, XIX, 400; 991 b, XXI, 213; 991 c, XXV, 233.
— *Salicis* West., 420, XV, 173.
— *Tiliae* Oudem. var. *maculicolum* Allesch., 1478, XXII, 97; 1478 b, XXVI, 165.
— *tiliaecolum* Allesch., 1478, XXII, 97.
Gloeotheca cystifera Rabh., 146, XI, 90.
— *fuscolutea* Näg., 148, XI, 91.
Gloeotrichia natans Rabh., 121, XII, 82; 221 b, XIX, 410; 633, XVI, 73.
— *pisum* Thuret, 633, XVI, 72; 633 b, XX, 28.
Glyphocarpus Webbii Mont., 1090, XIX, 426.
Gnomonia Arnstadtensis Auersw., 1432, XII, 88.
— *Coryli* Auersw., 511, XV, 195.
— *errabunda* Auersw., 1432, XXII, 89.
— *fimbriata* Auersw., 827, XVIII, 356.
— *leptostyla* Ces. et De Not., 730, XVII, 269; 1920, XXVI, 159.
— *melanostyla* Auersw., 1157, XX, 15.
— *Pustula* Auersw., 1155, XX, 15.
Gnomoniella Coryli Sacc., 511, XV, 195.
— *fimbriata* Sacc., 827, XVIII, 356.
— *melanostyla* Sacc., 1157, XX, 15.
Gomphonema angustatum van Heurck var. *obtusata* Cleve, 1008, XIX, 405.
— — var. *producta* Grun., 1844, XXV, 235.
— — f. *typica* Cleve, 1008, XIX, 405.
— *constrictum* Ehrh., 534, XV, 201.
— *olivaceum* Kütz., 1008, XIX, 405.
— *Gomphosphaeria aponina* Kütz., 149, XI, 91; 1206, XX, 25.
— *Gocordiformis* Wolle, 1206, XX, 25.
Gomphyllus calicioides Nyl., 1838, XXV, 232.
Goniocystis bifida Hass., 854, XVIII, 363.
Goniocystis (Trigonocystis) mucronata Hass., 1019, XIX, 409.
— (*Staurastrum*) *paradoxum* Hass., 737, XVII, 267.
Gonium pectorale Müll., 233, XII, 85; 233 b, XIII, 460.
Gonohymenia algerica var. *granulosa* Stnr., 1036, XIX, 415.
— *myriospora* A. Zahlbr., 1036, XIX, 415.
Gracilaria confervoides Grev., 547, XV, 204; 547 b, XXIV, 283.
Graphina (sect. *Aulacographa*) *platycarpa* A. Zahlbr., 1649, XXIII, 225.
— *sophistica* Müll. Arg., 1649, XXIII, 225.
Graphiola Phoenicis Poit., 907, XIX, 381; 907 b, XX, 24.
Graphiothecium phyllogenum Sacc., 1834, XXV, 231.
Graphis elegans Ach., 369, XIII, 464.
— — var. *parallela* Hepp, 369, XIII, 464.
— *involuta* Wallr., 554, XV, 206.
— *platycarpa* Eschw., 1649, XX, 225.
— (sect. *Aulacogramma*) *rimulosa* Müll. Arg., 60, IX, 134.
— *sophistica* Nyl., 1649, XXIII, 225.
— *scripta* Ach., 1648, XXIII, 224.
Griffithsia penicillata Ag., 644, XVI, 77.
Grimaldia dichotoma Raddi, 1261, XX, 41.
Grimmia alpicola Sw., 785, XVII, 278.
— *anodon* Bryol. Europ., 398, XIII, 471.
— *apocarpa* var. *rivularis* 785, XVII, 279.
— *cribosa* Hedw., 1274, XX, 43.
— *crinita* Brid., 1378, XXI, 223.
— *Hartmanni* Schimp., 1080, XIX, 424.
— *montana* Bryol. Europ., 582, XV, 212.
— *rivularis* Brid., 785, XVII, 279.
— *teretinervis* Limpr., 397, XIII, 471.
— *unicolor* Hook., 581, XV, 212.
Guepirella myriocarpa Bagl., 159, XI, 93.
Guepinia helvelloides Fries, 1713, XXIV, 272.
— *polyspora* Hepp, 159, XI, 93.
Guignardia rhytismoides A. Zahlbr., 618, XVI, 66.
Gyalecta aethalea Ach., 1058, XIX, 421.
— *clausa* Mass., 446, XV, 182.
— (sect. *Secoliga*) *croatica* Schul. et A. Zahlbr., 1224, XX, 29.
— *diluta* Wainio, 1028, XIX, 413.
— *exanthemica* DC. et Lem., 446, XV, 182.
— *piceicola* Arn., 1531, XXII, 109.
— *pineti* Tuck., 1028, XIX, 413.
— *rubra* Mass., 53, IX, 132.
— *thelotrema* Jatta, 655, XVI, 82.
Gymnocolea inflata Dum., 690, XVI, 89.
Gymnomitrium concinnatum Corda, 691, XVI, 88.
Gymnostomum aestivum Hedw., 487, XV, 190.
— *calcarium* Nees et Hornsch., 486, XV, 190.

Gymnostomum rupestre Schleich., 1262, XX, 41.
 — *subsessile* Brid., 292, XII, 97.
Gymnozyga Bambusina Jacobi 78, IX, 138.
 — *moniliformis* Ehrenb., 78, IX, 138.
Gyrocephalus rufus Brefeld, 1713, XXIV, 272.
Gyromium proboscideum β . *arcticum* Wahlbg., 1960, XXVI, 172.
Gyrophora anthracina Ach., 1958, XXVI, 171.
 — — Körb., 1958, XXVI, 171.
 — *arctica* Ach., 1960, XXVI, 172.
 — *cylindrica* var. *Delisei* 1956, XXVI, 170.
 — *Dillenii* Müll. Arg., 1541, XXII, 111.
 — *erosa* Ach., 1959, XVI, 172.
 — — *a. normalis* Th. Fries, 1959, XXVI, 172.
 — *glabra* 1958, XXVI, 171.
 — *heteroidea* ε . *cinerascens* Ach., 1958, XXVI, 171.
 — *hirsuta* Darb., 1956, XXVI, 170.
 — *hyperborea* Ach., 461, XV, 185.
 — — *a. primaria* Th. Fries, 461, XV, 185.
 — *Koldeweyi* Körb., 1959, XXVI, 172.
 — *leiocarpa* Steud., 1958, XXVI, 170.
 — *phaea* Herre, 1656, XXIII, 226.
 — *polymorpha* c. *G. reticulata* Schaer., 1957, XXVI, 170.
 — *proboscidea* var. *arctica* Ach., 1960, XXVI, 172.
 — *reticulata* Th. Fries, 1957, XXVI, 170.
 — *rugifera* var. *stipitata* G. Lang, 1956, XXVI, 170.
 — *stipitata* Branth et Grössl, 1956, XXVI, 170.
 — *tessellata* var. *cinerascens* Ach., 1958, XXVI, 171.
Gyroweisia acutifolia Phil., 1675, XXIII, 232.
Habrocystis Persoonii Rehm, 628, XVI, 69.
Habrostictis ocellata Fuckel, 1925, XXVI, 160.
 — *tithymalina* Rehm, 524, XV, 198.
Haematomma cismonicum Beltr., 1551, XXII, 114.
Hafzygia Cloustoni Aresch., 740, XVIII, 268.
Halimeda multicaulis Schimp., 1503, XXII, 102.
 — *opuntia* Lam., 1503, XXII, 102.
Haliseris polypodioides Ag., 1511, XXII, 104.
Hantzschia amphioxys Grun., 1843, XXV, 235.
Haplaria grisea Link, 1833, XXV, 230.
 — — var. *salicina* Sacc., 1833, XXV, 231.
Haplomitrium Hookeri 384, XIII, 469.
Harpanthus flotowianus Nees, 387, XIII, 470.
 — — — var. *uliginosus* Schiff., 775, XVII, 277.
Hartigiella Laricis Sydow, 1186, XX, 21.
Haszslinsky gibberulosa Körb., 1858, XXV, 240.

Hedwigia albicans Lindb., 583, XV, 212.
 — *ciliata* Lindb., 583 b, XXII, 123.
 — — (Ehrh.), 583, XV, 212.
Hedwigidium imberbe Bryol. Europ. var. *andesiticum* Fleisch., 1699, XXIII, 235.
Helierella insignis Kuntze, 1010, XIX, 407.
Helminthosporium Bornmülleri P. Magn., 996, XIX, 401.
 — *pirinum* Lib., 1496, XXII, 101.
 — *Tiliae* Fries, 1497, XXII, 101.
Helotium acuum Fries, 527, XV, 199.
 — — Karst, 1442, XXII, 91.
 — *aspidicolum* Rehm, 1441, XXII, 90.
 — *aureum* Pers., 1838, XXV, 232.
 — *barbatum* Karst, 1727, XXIV, 275.
 — *calyciforme* Wettst., 1821, XXV, 227.
 — *calycinum* Karst., 1821, XXV, 227.
 — — Wettst., 954, XIX, 392.
 — *chrysophthalmum* Karst., 1168, XX, 18.
 — *chrysostigma* Fries, 1439, XXII, 90.
 — *citrinum* Fries, 205, XII, 78; 205 b, XXI, 212.
 — *corticale* Karst., 1616, XXIII, 216.
 — *cyathoideum* Karst., 1170, XX, 18.
 — — var. *multicolor* Karst., 1321, XXI, 208.
 — *epiphyllum* δ . *acarium* Karst., 1928, XXVI, 161.
 — *finetorum* Pers., 1337, XXI, 211.
 — *flammeum* Karst., 1444, XXII, 91.
 — *glanduliforme* Rehm, 1321, XXI, 208.
 — *Humuli* De Not., 817, XVIII, 353.
 — *julaceum* Lamb., 1725, XXIV, 274.
 — *microspis* Karst., 1440, XXII, 90.
 — *pineti* Karst., 1166, XX, 17.
 — *pruinatum* Jord., 723, XVII, 209.
 — *salicellum* Fries, 1322, XXI, 209.
 — *scutula* Karst., 528, XV, 199.
 — *serotinum* Fries, 1927, XXVI, 160.
 — *sulphuratum* Phil., 1928, XXVI, 161.
 — *testaceum* Berk, 1450, XXII, 92.
 — *virgultorum* var. *scutula* Rehm, 528, XV, 199.
 — *Willkommii* Wettst., 953, XIX, 392.
Hemiarcyria rubiformis Rostaf., 406, XV, 170.
Hemitrichia rubiformis Lister, 406, XV, 170.
Hendersonia Piri Fuck., 1936, XXVI, 163.
 — *polycistes* Berk et Br., 820, XVIII, 354.
 — *subseriata* Desm., 982, XIX, 398.
 — *vagans* Fuck., 1936, XXVI, 163.
Heppia Guepini Nyl., 159, XI, 93.
 — *Zahlbruckneri* Hasse, 1965, XXVI, 173.
Hericium alpestre Pers., 1808, XXV, 225.
Hercospora Pupula Fries, 510, XV, 194.
Herpetium deflexum Nees, 477, XV, 189; 1883, XXV, 249.
 — *trilobatum* Nees, 386, XIII, 469.
Herpotrichia nigra Hartig, 504, XV, 193.

- Herpotrichia nigra* Hartm., 504, XXIII, 219.
Heteractis mesenterica Kütz., 747, XVII, 270.
Heterocladium heteropterum Bryol. Europ., 678, XVI, 86.
 — *squarrulosum* Lindb., 1989, XXVI, 180.
Heterodea Mülleri Nyl., 877, XVIII, 370.
Heterosphaeria Linariae Rehm, 721, XVII, 263.
 — *Patella* Grev., 721, XVII, 262; 1152, XX, 14.
Heterosporium echinulatum Sacc., 1836, XXV, 231.
 — *gracile* Sacc., 1836, XXV, 231.
 — *ornithogali* Klotzsch f. *minus* Bäumler, 219, XII, 81.
 — *variabile* Cooke, 1498, XXII, 101.
Heterothecium pezioides Flot., 1031, XIX, 414.
Hildenbrandtia rivularis J. Ag., 1018, XIX, 409.
Hirneola Auricula-Judae Berk., 1419, XXII, 86.
 — *Kmetii* Höhn., 1807, XXV, 225.
Homalia ligulaefolia Bryol. Jav., 1397, XXI, 226.
 — *trichomanoides* Bruch, 596, XV, 214.
Homalothecium Philippeanum Bryol. Europ., 1095, XIX, 426; 1095 b, XXII, 123.
Hormiscia flavida Lagerh., 148, XI, 91.
 — *subtilis* De Toni, 535, XV, 201.
 — — f. *genuina* Kirchn., 1209, XX, 26.
 — *zonata* 423, XV, 174.
Hormoceras acrocarpum Kütz., 743, XVII, 269.
 — *diaphanum* Kütz., 743, XVII, 269.
 — *gracillimum* Kütz., 743, XVII, 269.
 — *moniliforme* Kütz., 743, XVII, 269.
 — *polyceras* Kütz., 743, XVII, 269.
 — *polygonum* Kütz., 743, XVII, 269.
Hormotheca geranii Bon., 1721, XXIV, 274.
Humaria bulgarioides Sacc., 204, XII, 78.
 — *ciliata* Quel., 1323, XXI, 209.
 — *Jungermannia* Sacc., 1320, XXI, 208.
 — *lancicula* Sacc., 140, XI, 89.
 — *leucoloma* Bond., 1618, XXIII, 217.
 — *scutellata* Fuck., 1323, XXI, 209.
 — *testacea* Schröt., 1450, XXII, 92.
 — *xanthomala* Cooke, 1449, XXII, 92.
Humariella pseudotrechispora Schröt., 1619, XXIII, 217.
Hyalopeziza ciliaris Fuck., 1822, XXV, 228.
Hyalospora Aspidiotus Magnus 1134, XX, 11.
 — *Polypodii* Magnus, 1135, XX, 11.
 — — *dryopteridis* Magnus, 1135, XX, 11.
Hyalotheca dissiliens Bréb., 1640, XXIII, 222.
 — — var. *circularis* Bréb., 77, IX, 138.
Hydnobolus Tulasnei Berk. et Br., 1818, XXV, 227.
Hydnotria Tulasnei Berk. et Br., 1818, XXV, 227.
Hydnum repandum L., 314, XIII, 445.
 — *rufescens* Pers., 315, XIII, 446.
Hydrococcus rivularis Kütz., 744, XVII, 269.
Hydrocoleum calcilegum A. Br., 1203, XX, 24.
 — *heterotrichum* Gomont, 1344, XXI, 215.
 — *homoeotrichum* Gom., 744, XVII, 269.
Hydrodictium reticulatum Lagerh., 82, IX, 139.
 — *utriculatum* Roth, 82, IX, 139.
Hydrogastrum granulatum Desv., 88, IX, 140; 88 b, XIII, 460.
Hydrurus foetidus Kirchn., 81 c, XXIII, 222.
 — — var. *Ducluzelii* Rabh., 81 c, d, XII, 88.
 — — a. var. *penicillatus* Kirchn., b. var. *irregularis* Rabenh., 81, IX, 139.
Hygrocrocis ochracea Ag., 1849, XXV, 236.
 — *olivacea* Ag., 1849, XXV, 236.
Hygrophorus lucorum Kalchbr., 1309, XXI, 206.
Hylocomium Coreum Bryol. Europ., 1100, XIX, 427.
Hymenelia coerulea M., 1969, XXVI, 175.
 — *Prevostii* γ. *coerulescens* Krph., 1969, XXVI, 175.
Hymenobolina parasitica Zuk., 1, IX, 119.
Hymenobolus parasiticus Zuk., 1, IX, 119.
Hymenochaete corrugata Lév., 714, XVIII, 261.
 — *ferruginea* Bres., 1307, XXI, 206.
 — *rubiginosa* Lév., 1307, XXI, 206.
 — *tabacina* Lév., 1141, XX, 12.
Hymenoscypha amentacea Phill., 1725, XXIV, 274.
 — *bolaris* Phill., 203, XII, 76.
 — *cyathoidea* Phill., 1170, XX, 18.
 — — var. *Solani* Phill., 1170, XX, 18.
 — *scutula* Phill., 528, XV, 199.
 — *serotina* Phill., 1927, XXVI, 160.
Hymenostelium curvirostrum (Ehrh.) Lindb., 1263, XX, 42.
Hymenostomum rostellatum Schimp., 1070, XIX, 423.
Hyocomium polychaetum Fleisch., 1999, XXVI, 182.
Hypenantron elegans Trevis., 1689, XXIII, 234.
Hypheothrix calcicola Rabenh., 1346, XXI, 215.
 — — a. f. *glabra*, b. f. *lacunoso-Spongiosa* 1520, XXII, 106.
 — — f. *symplocoides* 1520, XXII, 107.
 — *Conservae* Kütz., 741, XVII, 269.
 — *coriacea* Kütz., 1006, XIX, 404.
 — *gloeophila* Rabenh., 1202, XX, 24.
 — *lateritia* Kütz., 1203, XX, 24.
 — *lutescens* Rabenh., 1849, XXV, 236.
 — *subtilis* Kütz., 224, XII, 83.
Hypnoloma fasciculare Sacc., 610, XVI, 65.
Hypnaea confervoides J. Ag., 547, XV, 204.
Hypnodendron Junghuhnii Lindb., 2000, XXVI, 182.

- Hypnum abietinum* L., 679, XVI, 87.
 — *aquaticum* Jacq., 784, XVII, 278.
 — *arcuatum* Lindb., 1099, XIX, 427.
 — *asplenoides* Dicks., 492, XV, 191.
 — *attenuatum* Schreb., 1091, XIX, 426.
 — *bryoides* L., 491, XV, 191.
 — *canariense* Brid., 792, XVII, 280.
 — *Chamissonis* Hornsch., 1998, XXVI, 181.
 — *commutatum* Hedw., 1789, XXIV, 289.
 — *concinnum* De Not., 1093, XIX, 426.
 — *crassinerve* Tayl., 1097, XIX, 427.
 — *crispum* L., 595, XV, 214.
 — *cupressiforme* L., 1685, XXIII, 233; 1895, XXV, 251.
 — — var. *hamulosum* Brid., 690, XVI, 88.
 — *curvicaule* Jur., 685, XVI, 87.
 — *dendroides* L., 1094, XIX, 426.
 — *depressum* Bruch, 299, XII, 98.
 — *dilatatum* Wils., 400, XIII, 472.
 — *elodes* Spruce, 1284, XX, 45.
 — *fastigiatum* Hartm., 1286, XX, 45.
 — *filicinum* L., 1786, XXIV, 289.
 — *fluitans* L., 1390, XXI, 225; 1390, XXV, 252.
 — *fluviale* Sw., 686, XVI, 88.
 — *giganteum* Schimp., 900, XVIII, 375; 900b, XXIII, 236.
 — *Halleri* Swartz, 1098, XIX, 427.
 — *hamulosum* Bryol. Europ., 690, XVI, 88.
 — *Jacquini* Garov., 1586, XXII, 121.
 — *illecebrum* Schwägr., 1096, 427.
 — *imponans* Hedw., 1897, XXV, 251.
 — *intermedium* Lindb., 1894, XXV, 250.
 — *irrigatum* Zetterstedt, 1790, XXIV, 290.
 — *Junghuhnii* C. Müll., 2000, XXVI, 182.
 — *Lindbergi* Mitten, 1099, XIX, 427.
 — *loreum* L., 1100, XIX, 427.
 — *lutescens* Hedw., 598, XV, 214.
 — *megapolitanum* Bland., 683, XVI, 87.
 — *molluscum* Hedw., 689, XVI, 88; 689b, XVIII, 375; 1882, XXV, 249.
 — *myosuroides* L., 798, XVII, 280.
 — *myurum* Pollich., 797, XVII, 280.
 — *ochraceum* Turn., 1287, XX, 45.
 — — var. *filiforme* Limpr., 1288, XX, 45.
 — *palustre* Huds. var. *subsphaericarpon* Bryol. europ., 1587, XXII, 121.
 — *polychaetum* v. d. B. et Lac., 1999, XXVI, 182.
 — *prionophyllum* C. Müll., 1400, XXI, 226.
 — *procerrimum* Mol., 1285, XX, 45.
 — *revolutum* Lindbg., 899, XVIII, 375.
 — *riparium* L., 300, XII, 98.
 — *rotundifolium* Scop., 100, IX, 142.
 — *rusciforme* Neck., 1787, XXIV, 289.
 — — var. *innudatum* Brid., 689, XVI, 87.
 — *sarmentosum* Wahlenb., 1289, XX, 46.
 — *sciuroides* L., 597, XV, 214.
 — *scorpioides* L., 1290, XX, 46.
 — *Hypnum Sendtneri* Schimp., 1284, XX, 45.
 — *silvaticum* Huds., 1388, XXI, 225.
 — *Smithii* Dicks., 793, XVII, 280.
 — *Sprucei* Bruch, 1389, XXI, 225.
 — *squamosum* Neck., 594, XX, 213.
 — *squarrulosum* Voit., 1989, XXVI, 180.
 — *stercodon fastigiatus* Brid., 1286, XII, 45.
 — *striatulum* Spruce, 1283, XV, 45.
 — *striatum* Schreb., 680, XVI, 87.
 — *subsphaericarpon* Schleich., 1587, XXII, 121.
 — *Swartzii* Turn., 682, XVI, 87.
 — *tamariscellum* C. Müll., 1994, XXVI, 181.
 — *tamariscinum* Hedw., 1893, XXV, 250.
 — *taxifolium* L., 490, XV, 190.
 — *tenellum* Dicks., 897, XVIII, 374.
 — *Teysmanni* Bryol. Jav., 1997, XXVI, 181.
 — *Tommasinii* Sendt., 681, XVI, 87.
 — *trichomanoides* Schreb., 596, XV, 214.
 — *turgidellum* C. Müll., 1996, XXVI, 181.
 — *uncinatum* Hedw., 687, XVI, 88.
 — *undulatum* L., 898, XVIII, 374.
 — *vagans* Harv., 1598, XXII, 123.
 — *Vaucheri* Lesqu., 688, XVI, 88.
 — *viticulosum* L., 795, XVII, 280.
Hypochaenus olivaceus Fries, 1601, XXIII, 213.
Hypocopra bombardioides Sacc., 717, XVII, 261.
 — *lateritia* Fries, 1611, XXIII, 215.
Hypoderma nervisequum DC., 1160, XX, 16.
 — *scirpinum* DC. et Lam., 1820, XXV, 227.
Hypodermella Laricis Tubeuf, 1613, XXIII, 216.
 — *sulcigena* Tubeuf, 1161, XXIII, 220.
Hypoglossum Woodwardii Kütz., 1514, XXII, 105.
Hypomyces deformis Sacc., 1611, XXIII, 216.
 — *lateritius* Tul., 1611, XXIII, 215.
 — *Vuilleminianus* R. Maire, 1611, XXIII, 215.
Hypospila Pustula Karst., 1155, XX, 15.
Hypoxylon coccineum Bull., 516, XV, 196.
 — *diathrauston* Rehm, 518, XV, 196.
 — *nummularium* Bull., 516, XV, 196.
 — *sphinctericum* Bull., 351, XIII, 460.
 — *variolosum* Keissl., 517, XV, 196.
Hysterangium Duriaeanum Tul., 1687, XXIII, 215.
 — *Hysterium Fraxini* Pers., 522, XV, 197.
 — *nigrum* Tode 523, XV, 197.
 — *retiolare* Alb. et Schwein., 1726, XXIV, 274.
 — *Pinastri* Schrad., 1161, XX, 16.
 — *quercinum* Pers., 523, XV, 197.
 — *scirpinum* Fries, 1820, XXV, 227.
Hystero-graphium Fraxini De Not., 522, XV, 197; 522, XVIII, 359.
 — *Rehmianum* Sacc., 1434, XXII, 89.
Icmadophila aeruginosa Trevis., 360, XIII, 463.
 — *ericetorum* A. Zahlbr., 360, XIII, 462.
Imbricaria aspera Körb., 1873, XXV, 245.

- Imbricaria austerodes* Kernst., 1251, XX, 38.
 — *Borreri* Körb., 247, XII, 89.
 — *cetrarioides* Arn., 1365, XXI, 221.
 — *dubia* Arn., 247, XII, 89.
 — *exasperata* Jatta 1873, XXV, 245.
 — *glabra* Arn., 875, XVIII, 369.
 — *grisea* DC., 1980, XXVI, 177.
 — *kamtschadalis* var. *americana* Arn., 1044, XIX, 417.
 — *lanata* f. *minuscule* Arn., 1971, XXVI, 175.
 — *olivacea* α. *aspidota* Haszl., 1873, XXV, 245.
 — — β. *collematiformis* 1873, XXV, 245.
 — — γ. *laetevirens* Fw., 655, XVI, 84.
 — *physodes* var. *obscurata* Körb., 1251, XX, 38.
 — *Pokorny* Körb., 1248, XX, 37.
 — *revoluta* Flk., 571, XV, 209.
 — *rysssolea* Heufl., 1248, XX, 37.
 — *sorediata* Arn., 1249, XX, 37.
 — *Sprengelii* Körb., 1249, XX, 37.
 — *subaurifera* Arn., 1872, XXV, 244.
 — *vittata* f. *obscurata* 1251, XX, 38.
Inactis heterotricha Kirchn., 1344, XXI, 215.
 — *tinctoria* Thur., 744, XVIII, 269.
Isaria lecanicola Jaap, 1817, XXV, 227.
Isariopsis albo-roseola Sacc., 1338, XXI, 211.
 — *Grevilleana* Schröt., 1834, XXV, 231.
 — *pusilla* Fries, 1338, XXI, 211.
Isopterygium Teyssmanni Jäg., 1997, XXVI, 181.
Isothecium Bornmülleri Schffn., 799, XVII, 280.
 — *myosuroides* Brid., 798, XVII, 280.
 — *myurum* Brid., 797, XVII, 280; 797 b, XXI, 226.
 — *Philippeanum* R. Spruce, 1095, XIX, 426.
Istmoplea sphaerophora Kjellm., 544, XV, 203.

Jungermannia aequiloba Schwgr., 472, XV, 188.
 — *affinis* Rw., 697, XVI, 89.
 — *albicans* L., 93, IX, 141.
 — — α. *vittata* Nees, 93, IX, 141.
 — *anomala* Hook., 184, XI, 98.
 — *arguta* Reinw., 883, XVIII, 372.
 — *asplenoides* L., 92, IX, 141; 1569, XXII, 118.
 — *attenuata* Lindb., 189, XI, 99.
 — *barbata* Schreb., 1568, XXII, 118.
 — — var. *attenuata* Nees, 189, XI, 99.
 — — var. *Floerkei* N. a E., 1061, XIX, 422.
 — — var. *lycopodioides* N. a E., 1062, XIX, 422.
 — — β. *minor* Hook., 189, XI, 99.
 — — var. *quiquedentata* N. a E., 1373, XXI, 223.
 — *bicuspidata* L., 278, XII, 95.
 — — β. *gracillima* Nees, 272, XII, 95.
 — *Blyttii* Mörk., 384, XIII, 469.
 — *byssacea* Roth, 1374, XXI, 223.
 — *calycina* Tayl., 772, XVII, 277.
 — *cavifolia* Ehrh., 699, XVI, 90.
 — *ciliaris* L., 478, XV, 189; 1065, XIX, 422.
 — *coalita* var. *affinis* Nees, 697, XVI, 89.

Jungermannia complanata L., 479, XV, 189.
 — *compressa* Hook., 388, XIII, 470.
 — *concinata* Lightf., 691, XVI, 88.
 — *connivens* Dicks., 279, XII, 95.
 — — f. *symbolica* Gottsch., 277, XII, 95.
 — *cordifolia* Hook., 475, XV, 188.
 — *crenulata* Smith, 272, XII, 94.
 — *curvifolia* Dicks., 1570, XXII, 118.
 — *dilatata* L., 385, XIII, 469.
 — *divaricata* Sm., 1374, XXI, 233.
 — *emarginata* Ehrh., 192, XI, 100; 471, XV, 188.
 — *endiviaefolia* Dicks., 772, XVII, 277.
 — *epiphylla* L., 383, XIII, 469.
 — *floerkei* Web. et Mohr, 384, XIII, 469; 1061, XIX, 422.
 — *fluitans* N. a E., 1063, XIX, 422; 1673, XXIII, 231.
 — *gracilis* Schleich., 189, XI, 99.
 — *gracillima* Sm., 273, XII, 94.
 — *hamatifolia* β. *echinata* Hook., 191, XI, 100.
 — *heterophylla* Schrad., 1064, XIX, 422.
 — *hirsuta* Nees, 95, IX, 142.
 — *hyalina* Lyell., 271, XII, 94.
 — *incisa* Schrad., 185, XI, 99.
 — *inflata* Huds., 693, XVI, 89; 693 b, XXI, 226.
 — *interrupta* N. a E., 1882, XXV, 249.
 — *irrigua* Nees, 274, XII, 94.
 — *julacea* L., 1982, XXVI, 179.
 — *laevigata* Schrad., 1563, XXII, 117.
 — *lurida* Dum., 1372, XXI, 222.
 — *lycopodioides* Wallr., 1062, XIX, 422.
 — *minuta* 188, XI, 99.
 — *Muelleri* Nees, 187, XI, 99.
 — *multifida* L., 1672, XXIII, 231.
 — *nana* α. *major* N. a E., 1372, XXI, 222.
 — — var. *minor* N. a E., 1371, XXI, 222.
 — *nematodes* Gottsche, 1571, XXII, 118.
 — *nemorosa* L., 773, XVII, 277.
 — *obtusa* Lindb., 190, XI, 99.
 — *ochroleuca* Spreng., 95, IX, 142.
 — *orcadenus* Hook., 186, XI, 99.
 — *pallens* Swartz, 1983, XXVI, 179.
 — *pallescens* β. *rivularis* Schrad., 476, XV, 188.
 — *pinquis* L., 1671, XXIII, 231.
 — *platyphylla* L., 1568, XXII, 117.
 — *polita* N. a E., 1881, XXV, 248.
 — *polyantha* L., 476, XV, 188.
 — *pulcherrima* Web., 478, XV, 189.
 — *pumila* With., 275, XII, 95.
 — *quiquedentata* Huds., 1373, XXI, 223.
 — — δ. *attenuata* Mart., 189, XI, 99.
 — *Reichardt* Gottsche, 188, XI, 99.
 — *scalaris* Schrad., 91, IX, 141.
 — *setacea* Web., 94, IX, 141.
 — *sphaerocarpa* Hook., 1371, XXI, 222.
 — *sphaerocarpoidea* De Not., 692, XVI, 89.

- Jungermannia Starkii* Fuck., 1374, XXI, 223.
 — *tamarisci* L., 1066, XIX, 422.
 — *Taylori* Hook., 474, XV, 188.
 — *tersa* N. a. E., 1371, XXI, 222.
 — *tomentella* Ehrh., 885, XVIII, 372.
 — *triangularis* Schleich., 477, XV, 189; 1883, XXV, 249.
 — *trilobata* L., 386, XIII, 469.
 — *Turneri* Hook., 698, XVI, 89.
 — *tyrolensis* Nees, 472, XV, 188.
 — *uliginosa* Sw. et Lindb., 389, XIII, 470.
 — *undulata* L., 473, XV, 188; 390, XIII, 470.
 — *Wenzeli* N. a. E., 1981, XXVI, 179.
 — *Zeiheri* Hüb., 275, XII, 95.
- Kentrosporium microcephalum* Wallr., 503, XV, 193.
Koerberia biformis Mass., 378, XIII, 467.
- Labrella Periclymeni* Desm., 835, XVIII, 357.
Laccaria laccata Berk., 301, XIII, 443.
Lachnea barbata Gill., 1727, XXIV, 1727.
 — *brunneola* Gill., 1169, XX, 18.
 — — var. *fagicola* Gill., 1169, XX, 18.
 — *calyculaeformis* Gill., 1617, XXIII, 217.
 — *corticalis* Gill., 1616, XXIII, 216.
 — *gregaria* Phill. f. *pseudogregaria* Rick., 1448, XXII, 92.
 — *nivea* Gill., 1729, XXIV, 275.
 — *pineti* Gill., 1166, XX, 17.
 — *pseudogregaria* Rick., 1448, XXII, 92.
 — *pseudotrechispora* Rehm, 1619, XXIII, 217.
 — *scutellata* Gill., 1323, XXI, 209.
Lachnella acuum Phill., 527, XV, 199; 1442, XXII, 91.
 — *aspidiicola* Phill., 1441, XXII, 90.
 — *barbata* Fries, 1727, XXIV, 275.
 — *calycina* Karst., 1821, XXV, 227.
 — *calyculaeformis* Phill., 1617, XXIII, 217.
 — *corticalis* Fries, 1616, XXIII, 216.
 — *dumorum* Quel., 1614, XXIII, 216.
 — *flammea* Alb. et Schw., 1434, XXII, 89.
 — — Fries, 1444, XXII, 91.
 — *fuscescens* Sacc., 1169, XX, 18.
 — *grisella* Phill., 1443, XXII, 91.
 — *nidulus* Quel., 1446, XXII, 91.
 — *nivea* Phill., 1729, XXIV, 275.
 — *Rhytismatis* Phill., 1728, XXIV, 275.
Lachnellula chrysophthalma Karst., 1168, XX, 17.
- Lachnum brunneolum* Karst., 1169, XX, 18.
 — *calyculaeformis* Karst., 1617, XXIII, 217.
 — *ciliare* Rehm, 1822, XXV, 228.
 — *clandestinum* Karst., 1447, XXII, 91.
 — *echinulatum* Rehm, 1728, XXIV, 275; 1728 b, XXV, 233.
 — *fuscescens* Karst., 1169, XX, 18.
- Lachnum Morthieri* Cooke, 1445, XXII, 91.
 — *nidulans* Karst., 1446, XXII, 91.
 — *niveum* Karst., 1729, XXIV, 275.
Lactarius deliciosus Fries, 1611, XXIII, 216.
Laestadia caricicola Sacc., 1815, XXV, 226.
 — *carpineae* Sacc., 1313, XXI, 207.
 — *oxalidis* Sacc., 969, XIX, 396.
 — *rhytismoides* Sacc., 618, XVI, 66.
Laminaria adriatica G. v. Beck, 543, XV, 203.
 — *Cloustonii* E. Demont, 740, XVII, 268.
Laminaria hyperborea epiphytica 1757, XXIV, 282.
 — *sacharina* Lam., 545, XV, 204.
Lanosa nivalis Fries, 1839, XXV, 232.
Lasallia pustulata Mérat., 356, XIII, 462.
Lasiobotrys Loniceræ Kunze et Schmidt, 1312, XXI, 207.
Lasiostictis fimbriata Bäuml., 630, XVI, 69.
Lecanactis abietina Körb., 556, XV, 206.
 — *californica* Tuck., 1766, XXIV, 284.
 — *myriadea* A. Zahlbr., 863, XVIII, 366.
 — *salicina* A. Zahlbr., 1358, XXI, 219.
Lecania (sect. *Maronea*) *berica* Müll. Arg., 1043, XIX, 417.
 — (sect. *Ricasolia*) *candicans* A. Zahlbr., 1364, XXI, 220.
 — *dimera* Th. Fries, 1550, XXII, 114.
 — *fuscella* Mass., 763, XVII, 275.
 — *Körberiana* Lahm, 52, IX, 132.
 — *proteiformis* a. *Rabenhorstii* Flagg., 458, XV, 185.
 — *Rabenhorsti* Arn., 458, XV, 184; 458 b, XXIV, 287.
 — *syringæa* Th. Fries, 763, XVII, 275.
Lecanora albella γ. *angulosa* Th. Fries, 1040, XIX, 416.
 — *angulosa* Ach., 1040, XIX, 416.
 — *argopholis* Ach., 50, IX, 132.
 — *assigena* Stzbgr., 1255, XX, 39.
 — *athroocarpa* subsp. *dimera* Nyl., 1550, XXII, 114.
 — *atrynea* f. *transcendens* 51, IX, 132.
 — (sect. *Cladodium*) *Bolanderi* Tuck., 1870, XXV, 242.
 — *boligera* Hed., 1968, XXVI, 174.
 — *caesiorufa* Nyl., 250, XII, 90.
 — *calcarea* a. *concreta* a. *farinosa* Jatta, 1776, XXIV, 286.
 — var. *farinosa* Hepp, 1776, XXIV, 286.
 — *callopsisma* Ach., 1256, XX, 39.
 — *Cantiana* A. Zahlbr., 1969, XXVI, 175.
 — *carpineae* Wainio 1040, XIX, 416.
 — *cervina* f. *cineracea* Nyl., 249, XII, 89.
 — *chlarona* var. *geographica* Nyl., 663, XVI, 84.
 — *chlorophana* Ach., 45, IX, 130.

- Lecanora* (sect. *Placodium*) *chryssoleuca* Ach., 48, IX, 131.
 — *cineracea* Nyl., 249, XII, 89.
 — *cirrochroa* Nyl., 1257, XX, 39.
 — *cismonica* Stzbgr., 1551, XXII, 114.
 — *coarctata* ♂. *L. inquinata* Ach., 1037, XIX, 415.
 — *coerulea* Nyl., 1969, XXVI, 174.
 — — f. *Cantiana* Nyl., 1969, XXVI, 175.
 — (*Placodium*) *configurata* Nyl., 567, XV, 209.
 — *configurata* Nyl., 970, XIX, 396.
 — *crustulata* Stzbgr., 1258, XX, 39.
 — *dimera* Nyl., 1550, XXII, 114.
 — — f. *dubitans* Nyl., 1550, XXII, 114.
 — *elatina* e. *minor* Tuckm., 1551, XXII, 114.
 — *erysibe* subsp. *L. proteiformis* Nyl., 458, XV, 184.
 — *expallens* Ach., 568, XV, 209.
 — (sect. *Aspicilia*) *farinosa* Nyl., 1776, XXIV, 286.
 — — *flavida* Hepp, 459, XV, 185.
 — *frustulosa* α. *argopholis* Kbr., 50, IX, 132.
 — (sect. *Placodium*) *fulgens* Ach., 668, XVI, 84.
 — *fulgida* Hue, 1978, XXVI, 177.
 — *fuscoatra* Nyl., 46, IX, 131.
 — (*Placodium*) *Garovaglii* A. Zahlbr., 566, XV, 208.
 — *geminipara* Th. Fr., 1871, XXV, 244.
 — (sect. *Aspicilia*) *gibbosa* Nyl., 164, XI, 94.
 — *gibbosa* (Dicks.) var. *squamata* Körb., Nyl., 1245, XX, 36.
 — (sect. *Aspicilia*) *gibbosa* α. *vulgaris* Th. Fries, 164, XI, 94.
 — *glaucoma* Ach., 1242, XX, 35.
 — (sect. *Aspicilia*) *göttweigensis* A. Zahlbr., 1245, XX, 36.
 — *granulosa* Nyl., 1056, XIX, 420.
 — — β. *flexuosa* Schaer., 260, XII, 92.
 — (*Candelaria*) *laciniosa* Nyl., 670, XVI, 85.
 — *Lagasciae* Lam., 1549, XXII, 114.
 — *Lallavei* Nyl., 253, XII, 90.
 — (*Placodium*) *Lamarckii* Schaer., 2549, XXII, 113.
 — — *lentigera* Ach., 162, XI, 94.
 — *Leprothelia* Nyl., 1871, XXV, 244.
 — *lutescens* Duby, 568, XV, 209.
 — *medians* Nyl., 1055, XIX, 420.
 — *Mougeotiioides* Nyl., 44, IX, 130.
 — *muralis* var. *Garovaglii* Wainio, 566, XV, 209.
 — *nigricans* Nyl., 1557, XXII, 116.
 — *ochracea* Nyl., 166, XI, 95.
 — *oculata* var. *leprothelia* Nyl., 1871, XXV, 244.
 — *olivacea* Nyl., 864, XVIII, 366.
 — *pallescens* Nyl., 1664, XXIII, 229.
 — — ♂. *alboflavescens*, b. *sorediata* Schaer., 1039, XIX, 416.
 — *pallida* var. *angulosa* Schaer., 1040, XIX, 416.

- Lecanora* *parella* α. *pallescens* Ach., 1664, XXIII, 229.
 — *percrocata* Zwackh, 465, XV, 186.
 — (sect. *Placodium*) *pinguis* Tuck., 1663, XXIII, 228.
 — *polyspora* Nyl., 662, XVI, 83.
 — *polytropa* var. *intricata* Schaer., 762, XVII, 274.
 — — subsp. *intricata* Nyl., 762, XVII, 275.
 — *prosechoides* Nyl., 1041, XIX, 416.
 — *prosechoidiza* Nyl., 761, XVII, 274.
 — *pruinosa* Nyl., 1658, XXIII, 227.
 — *pseudocoerulea* 1969, XXVI, 175.
 — *pumilionis* Arn., 1662, XXIII, 228.
 — *pyracea* Nyl., 251, XII, 90.
 — *radiata* Hasse, 1059, XIX, 421.
 — *rediunta* Stzbgr., 654, XVI, 82.
 — *rubelliana* Ach., 47, IX, 131.
 — *rubra* Ach., 53, IX, 132.
 — *rugosa* subsp. *L. chlarona* β. *geographica* Crombie, 663, XVI, 84.
 — *Schaereri* Stzbgr., 1054, XIX, 420.
 — *sordida* var. *glaucoma* Th. Fr., 1242, XX, 35.
 — (sect. *Placodium*) *subbracteata* Nyl., 49, IX, 132.
 — *subfusca* c. *coilocarpa* * *pinastri* Jatta, 1775, XXIV, 286.
 — — α. *geographica* Mass., 663, XVI, 84.
 — — var. *pinastri* Schaer., 1775, XXIV, 286.
 — — f. *transcendens* Nyl., 51, IX, 132.
 — — α. *vulgaris* 3. *pinastri* Körb., 1775, XXIV, 286.
 — *subintricata* Th. Fr., 1243, XX, 35.
 — *subplanata* Nyl., 359, XIII, 462.
 — *subtartarea* Nyl., 1039, XIX, 416.
 — *sulphurea* Ach., 1042, XIX, 417.
 — *symmictera* Ach., 1244, XIX, 35.
 — — var. *expallens* Oliv., 568, XV, 209.
 — — var. *pumilionis* Rehm, 1662, XXIII, 228.
 — — f. *symmictera* Wainio, 1244, XX, 35.
 — *syringea* Ach., 763, XVII, 275.
 — *tartarea* β. *arborea* Schaer., 1039, XIX, 416.
 — — subsp. *L. subtartarea* Cromb., 1039, XIX, 416.
 — *tenebrosa* Nyl., 448, XV, 182.
 — *transcendens* Stzbgr., 51, IX, 132.
 — *turfacea* Ach., 1668, XXIII, 230.
 — *umbrina* var. *prosechoides* Nyl., 1041, XIX, 416.
 — *varia* Ach., 163, XI, 94.
 — (Ehrh.) Ach., 163, XXV, 248.
 — — var. *expallens* Flag., 568, XV, 209.
 — — β. *polytropa* * *intricata* Th. Fr., 762, XVII, 274.
 — — var. *symmictera* Flag., 1244, XX, 35.
 — — var. *subintricata* Nyl., 1243, XX, 35.
 — — α. *vulgaris* Körb., 163, XI, 94.
 — *verrucosa* Laur., 254, XII, 91.

- Lecanora viridirufa* Nyl., 46, IX, 131.
 — *vitellinula* Nyl., 1779, XXIV, 287.
Lecidea abietina Ach., 556, XV, 207.
 — (*Biatora*) *aeneofusca* Flk., 168, XI, 95.
 — *aethalea* Lamy, 1058, XIX, 421.
 — *albescens* Wainio, 1233, XX, 33.
 — *albocoerulescens* β. *alpina* * *oxydata* Körb., 450, XV, 183.
 — — var. *flavo-coerulescens* Schaer., 450, XV, 183.
 — — var. *flavo-coerulescens* Th. Fr., 450, XV, 183.
 — *anomala* f. *misella* Nyl., 1532, XXII, 110.
 — *apochroeella* Nyl., 1226, XX, 30.
 — *arthonoides* Fee, 266, XII, 93.
 — (*Biatora*) *asserculorum* Schrad., 1532, XXII, 110.
 — *atroalba* β. *vera* Naeg., 367, XIII, 464.
 — *atroalbella* var. *aethalea* Nyl., 1058, XIX, 421.
 — *atroalbicans* Nyl., 265, XII, 93.
 — *aurantiaca* var. *ochracea* Schaer., 166, XI, 95.
 — *bacillifera* Nyl. f. *incompta* 1361, XXI, 219.
 — *bacida* E. Fr., 170, XI, 96.
 — *caesiorufa* Ach., 250, XII, 90.
 — *callosine* Poll., 166, XI, 95.
 — *cerina* α. *Ehrhartii* Schaer., 252, XII, 90.
 — *chlorococca* Stzbgr., 752, XVII, 272.
 — *chlorotica* Nyl., 1233, XX, 33.
 — *cinereo-fusca* Fee, 1030, XIX, 414.
 — *coccinea* Eschw., 1030, XIX, 414.
 — *coeruleo-nigricans* Schaer., 754, XVII, 273.
 — *condaminea* Fee, 1030, XIX, 414.
 — *conferenda* Nyl., 366, XIII, 464.
 — *confervoides* δ. *polycarpa* Hepp, 265, XII, 93.
 — *contigua* η. *lactea* Schaer., 59, IX, 134.
 — *coprodes* Wainio, 657, XVI, 83.
 — *coracina* Hepp, 1058, XIX, 421.
 — — β. *ocellata* b. *arenaria* Hepp, 1058, XIX, 421.
 — *crustulata* Körb., 449, XV, 183.
 — — Ach., 449 b, XX, 40.
 — (*Psora*) *decipiens* Ach., 1767, XXIV, 284.
 — *diducens* Nyl., 451, XV, 183.
 — *distincta* Stzbgr., 263, XII, 92.
 — *dubitans* Nyl., 1550, XXII, 114.
 — *Ehrhartiana* Ach., 1231, XX, 32.
 — *elabens* Th. Fr., 1862, XXV, 241.
 — *endoleuca* Nyl., 258, XII, 92.
 — *erythrella* α. *ochracea* Schaer., 166, XI, 95.
 — *erythrocarpia* β. *Lallavei* Schaer., 253, XII, 90.
 — *exanthemica* Nyl., 446, XV, 182.
 — *ferruginea* Eschw., 1030, XIX, 414.
 — *flavicunda* Ach., 450, XV, 183.
 — *flavocoerulescens* Ach., 450, XV, 183.
 — (*Biatora*) *flexuosa* Nyl., 260, XII, 92.
 — *Friesiana* Stzbgr., 753, XVII, 273.
 — *fumosa* β. *ocellulata* Schaer., 56, IX, 133.
Lecidea fuscescens Nyl., 167, XI, 95.
 — — f. *boligera* Norm., 1968, XXVI, 174.
 — *fusco-cinerea* Nyl., 448, XV, 182.
 — *geminata* f. *Montagnei* Nyl., 264, XII, 93.
 — *geographica* Schaer., 1235, XX, 33.
 — — f. *sphaerica* Leight., 1236, XX, 34.
 — (*Biatora*) *Ghisleri* Stzbgr., 1277, XX, 31.
 — *gibberosa* Poll., 1557, XXII, 116.
 — (*Eulecidea*) *Giselae* A. Zahlbr., 1360, XXI, 219.
 — (*Biatora*) *geophana* Nyl., 365, XIII, 463.
 — — *granulosa* Ach., 261, XII, 92.
 — *grisella* var. *subcontigua* E. Fries, 1225, XX, 29.
 — *grossa* Pers., 1650, XXIII, 225.
 — *haematites* Fee, 1030, XIX, 414.
 — *Hookeri* Schaer., 372, XIII, 465.
 — (*Biatora*) *huxariensis* A. Zahlbr., 363, XIII, 463.
 — *illota* Nyl., 454, XV, 184.
 — *incompta* Borr., 1361, XXI, 219.
 — *jurana* Schaer., 262, XII, 92.
 — *lactea* Hepp, 59, IX, 134.
 — *Lallavei* Clem., 253, XII, 90.
 — *lepidastr* Tuckm., 764, XVII, 275.
 — *leucoplaca* E. Fries, 1650, XXIII, 225.
 — *leucopsis* Nyl., 361, XIII, 463.
 — *leucoblephara* Nyl., 865, XVIII, 366.
 — *ligniaria* Ach., 658, XVI, 83.
 — *luteoalba* α. *Persooniana* Schaer., 251, XII, 90.
 — *luteola* Ach., 558, XV, 207.
 — — var. *chlorotica* Nyl., 1233, XX, 33.
 — — f. *endoleuca* Nyl., 258, XII, 91.
 — *macrocarpa* Th. Fr., 1029, XIX, 413.
 — *melaena* Nyl., 362, XIII, 463.
 — (*Eulecidea*) *melancheima* Tuck., 1862, XXV, 241.
 — *Michelettiana* Nyl., 864, XVIII, 366.
 — *microspora* Naeg., 267, XII, 93.
 — *misella* Nyl., 1532, XXII, 110.
 — (*Biatora*) *mollis* Nyl., 1955, XXVI, 169.
 — *muscorum* Ach., 54, IX, 133.
 — *myriadea* Fee, 863, XVIII, 366.
 — *nigerrima* Nyl., 576, XV, 210.
 — *nigritula* Nyl., 267, XII, 93.
 — *Nitschkeana* Stzbgr., 1232, XX, 32.
 — *Norrlinii* Lamy, 753, XVII, 273.
 — (*Biatora*) *Nylanderi* Th. Fr., 167, XI, 95.
 — *ocellulata* Th. Fr., 56, IX, 133.
 — *ochracea* Schaer., 166, XI, 94.
 — *olivacea* Arn., 169, XI, 95.
 — — Schaer., 864, XVIII, 366.
 — (*Psora*) *opaca* Duf., 55, IX, 133.
 — — *ostreata* (Hoffm.) Schaer. f. *myrmecina* Schaer., 1533, XXII, 110.
 — *oxysporella* Nyl., 627, XVI, 68.
 — *parapetraea* Nyl., 367, XIII, 464.
 — *parasema* Arn., 1954, XXVI, 169.

- Lecidea parasema* δ. *L. crustulata* Ach., 449, XV, 183.
 — — var. *elaeochroma* Ach., 169, XI, 95.
 — *Parmeliarum* Sommf., 957, XIX, 393.
 — *pelidna* var. *corticola* Stzbgr., 1234, XX, 33.
 — *pezioides* Ach., 1031, XIX, 414.
 — *phacodes* Leight., 1233, XX, 33.
 — *piceicola* Nyl., 1531, XXII, 109.
 — *pineti* Ach., 1028, XIX, 413.
 — *platycarpa* Ach., 1029, XIX, 413.
 — *premnea* E. Fr., 1650, XXIII, 225.
 — *promixta* Nyl., 451, XV, 183.
 — (*Biatora*) *pullata* Th. Fries, 1228, XX, 31.
 — *pumilionis* Nyl., 1662, XXIII, 228.
 — *resinae* * *L. globularis* Nyl., 1532, XXII, 110.
 — (*Biatora*) *Rhododendri* A. Zahlbr., 453, XV, 183.
 — *rivulosa* Ach. f. *corticola* Schaer., 364, XIII, 463.
 — — β. *mollis* Wahlbg., 1955, XXVI, 169.
 — (*Biatora*) *russula* Ach., 1030, XIX, 413.
 — *sabuletorum* 865, XVIII, 366.
 — — δ. *microspora* Mass., 1862, XXV, 241.
 — — var. *miliaria* Stzbgr., 658, XVI, 83.
 — — var. *obscurata* Stzbgr., 656, XVI, 82.
 — *sanguinea* Fee, 1030, XIX, 414.
 — *scalaris* β. *myrmecina* Ach., 1533, XXII, 110.
 — *sphaeroides* β. *obscurata* Smrft., 656, XVI, 82.
 — *spuria* var. *lactea* Stzbgr., 59, IX, 134.
 — — β. *minutula* Hepp, 57, IX, 133.
 — *stellulata* Tayl., 57, IX, 133.
 — (*Biatora*) *subapochrocella* A. Zahlbr., 1226, XX, 30.
 — *sublugens* Nyl., 654, XVI, 82.
 — *subumbonata* Nyl., 452, XV, 183.
 — *tenebrosa* Fw., 448, XV, 182.
 — *thelotrema* Nyl., 655, XVI, 82.
 — *trachona* var. *coprodes* Stzbgr., 657, XVI, 83.
 — *triptophylla* Ach., 358, XIII, 462.
 — (*Biatora*) *turgidula* E. Fries, 1229, XX, 31.
 — — *uliginosa* Ach., 259, XII, 92.
 — *urceolata* Ach., 1359, XXI, 219.
 — (*Biatora*) *vernalis* L., 453, XV, 183.
 — *vesicularis* Ach., 754, XVII, 273.
 — (*Biatora*) *viridescens* Ach., 1230, XX, 32.
 — *viridiatra* Fw., 1236, XX, 33.
 — *viridirufa* Nyl., 46, IX, 131.
Lecidella eluta Körb., 1862, XXV, 241.
 — *olivacea* Körb., 169, XI, 98.
 — *psoroides* Arn., 56, IX, 133.
 — *turgidula* Körb., 1229, XX, 31.
Lecythea Baryi Berk., 1124, XX, 8.
 — *Euphorbiae* Lév., 1113, XX, 4.
 — *Valerianae* Berk., 1103, XX, 2.
Leersia lanceolata Hedw., 1988, XXVI, 180.
Leightonia pusilla var. *pallida* Garovagl., 1522, XXII, 108.
Leiophloea praetermissa Trev., 1951, XXVI, 169.
Lejeunea calcarea Lib., 191, XI, 100.
 — *cavifolia* Lind., 699, XVI, 90.
 — *echinata* Tayl., 191, XI, 100.
 — *serpyllifolia* Lind., 699, XVI, 90.
Lemanea fluvialis C. et Ag., 1513a, b, XXII, 105; 1513c, XXVI, 168.
Lembidium polycarpum Körb., 375, XIII, 467.
Lenormandia jungermanniae Del., 1855, XXV, 239.
Lentinus lepideus Fries, 1605, XXIII, 214.
Lenzites flaccida Fries, 946, XIX, 391.
 — *Palisoti* Fries, 1912, XXVI, 157.
Leotia fimetaria Pers., 1337, XXI, 211.
Lepadolemma rubra Trev., 53, IX, 132.
Leperoma ochroleuca Mitt., 95, IX, 142.
Lepidozia setacea Mitt., 94, IX, 141.
 — *silvatica* Evans, 1567, XXII, 118.
Lepiota procera Sacc., 1913, XXVI, 158.
Leprantha caesia Kbr., 61, IX, 134.
Leptobryum pyriforme Schpr., 787, XVII, 279.
Leptodon Smithii Mohr, 793, XVII, 280.
Leptogium atrocoeruleum Arn., 560, XV, 207; 560b, XXII, 117.
 — *Hildebrandii* Nyl., 1035, XIX, 414.
 — *lacerum* S. Gray, 560, XV, 207.
 — *microphyllum* Harm., 1660, XXIII, 228.
 — *myochroum* Harm., 1363, XXI, 220.
 — — b. *tomentosum* Tuck., 1363, XXI, 220.
 — *quadratum* Nyl., 1592, XXII, 112.
 — *saturninum* Dalla Torre et Sarnth., 1035, XIX, 415.
 — (*Mallotium*) *saturninum* Nyl., 1363, XXI, 220.
Leptorhaphis epidermidis Th. Fries, 1353, XXI, 218.
 — *oxyspora* Körb., 1353, XXI, 218.
Leptosphaeria aucta Niessl, 619, XVI, 67.
 — *Cibostii* Ces. et de Not., 507, XV, 193.
 — *clivensis* Sacc., 971, XIX, 396.
 — *culmicola* Fries, 1153, XX, 151.
 — *culmorum* Auersw., 1153, XX, 15.
 — *derasa* Auersw., 1314, XXI, 207.
 — *Doliolum* Ces. et de Not., 825, XVIII, 355; 1152, XX, 14.
 — *epicalamia* Ces. et de Not., 1153, XX, 15.
 — *Gnaphalii* Sacc., 508, XV, 194.
 — *Libanotis* Niessl, 971, XIX, 396.
 — *microscopica* Karst., 1153, XX, 15.
 — *millefolii* Niessl, 972, XIX, 397.
 — *modesta* Auersw., 507, XV, 193; 507b, XXII, 101.
 — — Karst., 507, XV, 193.
 — *Nardi* Ces. et de Not., 622, XVI, 67.
 — *ogilviensis* Ces. et de Not., 718, XVII, 262.
 — — Ces. et de Not. f. *Gnaphalii* Niessl, 508, XV, 194.
 — *Rousseliana* Ces. et de Not., 621, XVI, 67.
 — *scirpina* Wint., 620, XVI, 67.

- Leptosphaeria suffulta* Niessl, 1159, XX, 15.
Leptostroma areolatum Wallr., 934, XIX, 388.
 — *hysterioides* Fries, 1333, XXI, 211.
Leptostromella hysterioides Sacc., 1333, XXI, 211.
Leptothrix Braunii Kütz., 1947, XXVI, 166.
 — *calcicola* Kütz., 1520, XXII, 106.
 — *compacta* Kütz., 1947, XXVI, 166.
 — *gloeophila* Kütz., 1202, XX, 24.
 — *lamellosa* Kütz., 1947, XXVI, 166.
 — *lutescens* Kütz., 1849, XXV, 236.
 — *muralis* Heufl., 1520, XXII, 106.
Leptothyrella Chrysobalani Henn., 1737, XXIV, 277.
Leptothyrium alneum Sacc., 986, XIX, 399.
 — *circinans* Fuck., 990, XIX, 400.
 — *Juglandis* Libert, 730, XVIII, 264.
 — *periclymeni* Sacc., 835, XVIII, 357.
 — *pictum* Berk., 835, XVIII, 357.
 — *Populi* Fuckel, 987, XIX, 399.
 — *Ribis* Libert, 991, XIX, 400.
Leptotrichum homomallum Hampe, 1266, XX, 42.
 — *pallidum* Hampe, 1267, XX, 42.
Leptotrochila Bistortae Schröt., 1165, XX, 17.
Leskea apiculata Schimp., 600, XV, 214.
 — *rostrata* Hedw., 896, XVIII, 374.
 — *?secunda* Reinw. et Hornsch., 1995, XXVI, 181.
Lethagrium nigrescens Mass., 1659, XXIII, 227.
Letharia canariensis Hue, 769, XVII, 276.
 — *vulpina* Wainio, 878, XVIII, 371; 878b, XIX, 421.
Leucobryum glaucum Schimp., 489, XV, 190.
 — *longifolium* Hampe, 1392, XXI, 225.
 — *samoanum* Fleisch., 1898, XXV, 251.
Leucodon alopecurum Brid., 786, XVII, 279.
 — *canariensis* Schwgr., 792, XVII, 280.
 — *rufescens* Hrnsh. et Reinw., 1294, XX, 46.
 — *sciuroides* Hedw., 597, XV, 214.
Leucoloma Hedwigii Fuck., 1618, XXIII, 217.
Liagora cladoniaeformis Forsk., 1755, XXIV, 282.
 — *viscida* Ag., 1755, XXIV, 282.
Licea strobilina Alb. et Schw., 934, XIX, 388.
Lichen abietinus Ach., 556, XV, 207.
 — *aeruginosus* Scop., 360, XIII, 463.
 — *agariciformis* Wulf., 153, XI, 92.
 — *agelaus* Ach., 664, XVI, 84.
 — *aggregatus* Sm., 354, XIII, 461.
 — — Sw., 1768, XXIV, 285.
 — *amplissimus* Scop., 1661, XXIII, 228.
 — *analeptus* Ach., 1523, XXIII, 108.
 — *androgynus* Hoffm., 1039, XIX, 416.
 — *angulosus* Schreb., 1040, XIX, 416.
 — *anthracinus* Wulf., 1958, XXVI, 171.
 — *apthosus* L., 154, XI, 92.
 — *aquaticus* Weiss, 652, XVI, 81.
 — *arcticus* L., 1544, XXII, 112.
Lichen atomarius Ach., 468, XV, 186.
 — *atrocoeruleus* Hall., 560, XV, 207.
 — *auratus* Sm., 1861, XXV, 241.
 — *brunneus* Sw., 457, XV, 184.
 — *caesiorufus* Ach., 250, XII, 90.
 — *candicans* Dicks., 1364, XXI, 220.
 — *caninus* L., 1547, XXII, 113.
 — *caperatus* L., 874, XVIII, 369.
 — *cariosus* Ach., 447, XV, 182.
 — *carneus* W., 320, XIII, 447.
 — *carpinus* L., 1040, XIX, 416.
 — *chlorophyllus* Humb., 1246, XX, 36.
 — *chrysocephalus* Turn., 551, XV, 205.
 — *chrysoleucos* Sm., 48, IX, 131.
 — *chrysophthalmus* L., 157, XI, 92.
 — *clausus* Hoffm., 446, XV, 182.
 — *cocciferus* L., 1033, XIX, 414.
 — *coeruleonigricans* Lightf., 754, XVII, 273.
 — *concolor* Dicks., 670, XVI, 85.
 — *convolutus* Lam., 244, XII, 88.
 — *corallinus* L., 256, XII, 91.
 — *croceus* L., 564, XV, 208.
 — *cucullatum* Bell., 872, XVIII, 368.
 — *decipiens* Ehrh., 1767, XXIV, 284.
 — *delicatus* Ehrh., 241, XII, 88.
 — *divaricatus* L., 462, XV, 185.
 — *dubius* Wulf., 247, XII, 89.
 — *Ehrhartiana* Ach., 1231, XX, 32.
 — *elongatus* Jacq., 757, XVII, 273.
 — *epidermidis* Ach., 1353, XXI, 218.
 — *ericetorum* L., 360, XIII, 462.
 — *erosus* Web., 1959, XXVI, 171.
 — *erythrellus* Ach., 160, XI, 94.
 — *exanthemicus* Sm., 446, XV, 182.
 — *fagineus* L., 257, XII, 91.
 — *farinaceus* L., 1367, XXI, 221.
 — *flavocoerulescens* Horn., 450, XV, 183.
 — *floridus* L., 1051, XIX, 419.
 — *fluviatilis* Web., 652, XVI, 81.
 — *foliaceus* Huds., 244, XII, 88.
 — *fraxineus* L., 1665, XXIII, 229.
 — *fucoides* Dicks., 1027, XIX, 413.
 — *fulgens* Sw., 668, XVI, 84.
 — *furfuraceus* L., 156, XI, 92; 876, XVIII, 370.
 — *gelasinatus* With., 351, XIII, 461.
 — *geographicus* L., 1235, XX, 33.
 — *gibbosus* Ach., 164, XI, 94.
 — *glaucocarpus* Wahlbg., 460, XV, 185.
 — *glaucus* L., 1366, XXI, 221.
 — *glomulifer* Lightf., 1661, XXIII, 228.
 — *granulosus* Ehrh., 261, XII, 92.
 — *griseus* Lam., 1980, XXVI, 177.
 — *hirtus* L., 1052, XIX, 419.
 — *horizontalis* L., 1548, XXII, 113.
 — *hyperboreus* Ach., 461, XV, 185.
 — *inquinans* Sm., 352, XIII, 461.
 — *intricata* Schrad., 762, XVII, 274.
 — *jubatus* L., 1879, XXV, 247.

- Lichen juniperinus* L., 873, XVIII, 368.
 — *lacerus* Sw., 560, XV, 207.
 — *laciniatus* Huds., 1661, XXIII, 228.
 — *lacteus* L., 569, XV, 209.
 — *lanuginosus* Hoffm., 1980, XXVI, 178.
 — *lentigerus* Web., 162, XI, 94.
 — *lepadinus* Ach., 255, XII, 91.
 — *luteolus* Schrad., 558, XV, 207.
 — *marmoreus* Scop., 1643, XXII, 223.
 — *muricatus* Ach., 1975, XXVI, 176.
 — *muscorum* Sw., 54, IX, 133.
 — *myochrous* Ehrh., 1363, XXI, 220.
 — *nigrescens* Huds., 270, XII, 94; 1659, XXIII, 227.
 — *nivalis* L., 871, XVIII, 368.
 — *odontellus* Ach., 1974, XXVI, 176.
 — *pallescens* L., 1664, XXIII, 229.
 — *papillaria* Ehrh., 243, XII, 88.
 — *parallelus* Ach., 1024, XIX, 412.
 — *parietinus* L., 1057, XIX, 420.
 — *parilis* Ach., 42, IX, 130.
 — *peřizoides* Web., 457, XV, 184.
 — *pinastri* Scop., 874, XVIII, 369.
 — *pineti* Ach., 1028, XIX, 413.
 — *pityreus* Ach., 1980, XXVI, 178.
 — *plumbeus* Lightf., 357, XIII, 462.
 — *pollinarius* Westr., 151, XI, 91.
 — *polydactylon* Neck., 661, XVI, 83.
 — *pruinosa* Sm., 1658, XXIII, 227.
 — *prunastri* L., 246, XII, 89.
 — *pulmonarius* L., 155, XI, 92.
 — *pulposus* Bernh., 456, XV, 184.
 — *pulverulenta* Schreb., 1670, XXIII, 230.
 — *pustulatus* L., 356, XIII, 462.
 — *pyrinus* Ach., 161, XI, 94.
 — *pyxidatus a. simplex* Weis., 759, XVII, 274.
 — *rangiferinus alpestris* L., 660, XVI, 83.
 — *resupinatus* L., 1967, XXVI, 174.
 — *reticulatus* Noehd., 573, XV, 210.
 — *rubellus* Ehrh., 558, XV, 207.
 — *saccatus* L., 565, XV, 208.
 — *saepincola* Ehrh., 870, XVIII, 368.
 — *saturnus* Dicks., 1363, XXI, 220.
 — — Sm., 1035, XIX, 415.
 — *scriptus* 1648, XXIII, 224.
 — *scrobiculatus* Scop., 561, XV, 207.
 — *scutatus* Dicks., 868, XVIII, 367.
 — — Wulf., 870, XVIII, 368.
 — *stellaris* L., 1260, XX, 40.
 — *stillicidiorum* Horn., 575, XV, 210.
 — *sulphureus* Hoff., 1042, XIX, 417.
 — *tenellus* Scop., 248, XII, 89.
 — *turfaceus* Wahlbg., 1668, XXIII, 230.
 — *turgidus* Ehrh., 1239, XX, 34.
 — *uliginosus* Schrad., 259, XII, 92.
 — *ulmi* Sw., 53, IX, 132.
 — *venosus* L., 562, XV, 208.

Lichen Vespertilio Lightf., 270, XII, 94; 1659, XXIII, 227.
 — *viridescens* Schrad., 1230, XX, 32.
 — *vulgatus* Ach., 442, XV, 180.
 — *vulpinus* L., 878, XVIII, 371.
 — *vulvatus* Vill., 446, XV, 182.
 — *Weberi* Ach., 652, XVI, 81.
Limnactis dura Kütz., 74, IX, 137.
Limnobium molle Br. et Sch., 400, XIII, 472.
Linckia atra Lyngb., 748, XVII, 270.
 — *hynicola* Lyngb., 633, XVI, 72.
Linospora Capreae Fuck., 1156, XX, 15.
 — *tigrina* Fuck., 1156, XX, 15.
Lithoidea nigrescens Mass., 135, XXI, 217.
 — *Velana* Arn., 580, XV, 211.
Lithothamnion Propontidis Fosl., 548, XV, 204.
Lobaria amplissima Arn., 1661, XXIII, 228.
 — *dilacerata* Hoffm., 464, XV, 186.
 — *fulva* Hoffm., 1780, XXIV, 287.
 — *glomulifera* Hoffm., 1661, XXIII, 228.
 — *laciniata* Wainio, 1661, XXIII, 228.
 — *pulmonaria* Hoffm., 155, X, 92.
 — *pulveracea* Hoffm., 1980, XXVI, 178.
 — *scrobiculata* DC., 561, XV, 208.
Lobarina scrobiculata Nyl., 561, XV, 208.
Lomentaria clavellosa Le Jol., 1758, XXIV, 282.
Lopadium melaleucum Müll. Arg., 659, XVI, 83.
 — *peřizodeum* Körb., 1031, XIX, 414.
Lophocolea heterophylla Dum., 1064, XIX, 422.
 — *Kurzii* v. d. Sde., 696, XVI, 89.
Lophodermium nervisequium Rehm, 1160, XX, 16.
 — *Pinastri* Chev., 1161, XX, 16; 1161b, XXIII, 220.
Lophoxia barbata Dum., 1568, XXII, 118.
 — *inflata* Howe, 693 b, XXI, 226.
 — *quinquedentata* Cogn., 1373, XXI, 223.
 — *Wenzeli* Steph., 1981, XXVI, 179.
Lunulina moniliphora Bory, 750, XVII, 271.
Lycogala epidendrum Fries, 409, XV, 170.
 — *miniaturum* Pers., 409, XV, 170.
 — *sessile* Retz, 409, XV, 170.
Lycoperdon ardesiacum Bull., 1608, XXIII, 215.
 — *epidendrum* L., 409, XV, 170.
 — *Equiseti* Hoffm., 628, XVI, 68.
 — *Euphorbiae* Schrank, 1417, XXII, 85.
 — *favogineum* Batsch, 5, IX, 120.
 — *Geaster* Batsch, 330, XIII, 449.
 — *gregarium* Retz, 5, IX, 120.
 — *populneum* Jacq., 22, IX, 127.
 — *pyriforme* Schaeff., 329, XIII, 449.
 — *subcorticinum* Schrank, 708, XVII, 259.
 — *variolosum* L., 517, XV, 196.
Lyngbya Aestuarii Liebm., 1013, XIX, 408; 1948, XXVI, 167.

- Lyngbya aestuarii* f. *aeruginosa* Gom., 1206, XX, 25.
 — *antliaria* var. *repens* Hansg., 225, XII, 83.
 — *calicicola* Hansg., 1520, XXII, 106.
 — *chalybaea* Hansg., 431, XV, 177.
 — *compacta* Hansg., 1947, XXVI, 167.
 — *corium* Hansg., 423, XV, 174.
 — *crispa* C. Ag., 1013, XIX, 408.
 — *elegans* Hansg., 428, XV, 176.
 — *gloeophila* Hansg., 1202, XX, 24.
 — *gracilis* Rabenh., 1519, XXII, 106.
 — *laminosa* Thur., 1947, XXVI, 167.
 — — b. *amphibia* Hansg., 1947, XXVI, 167.
 — *lateritia* Hansg., 100 b, XIX, 404.
 — — *Kirchner* var. *subtilis* 224, XII, 82.
 — *lutea* Gomont, 1201, XX, 24.
 — *lutescens* Hansg., 1849, XXV, 236.
 — *membranacea* Thr., 1344, XXI, 215.
 — *mexiensis* Hansg., 1002, XIX, 403.
 — *obscura* Kütz., 1013, XIX, 408.
 — *princeps* Hansg., 1941, XXVI, 165.
 — *Retzii* Hansg., 425, XV, 175.
 — *smaragdina* Hansg., 42, XV, 176.
 — *tenuis* Hansg., 429, XV, 177.

Macrodycta pustulata Mass., 356, XIII, 462.
Macromitrium Blumei Nees, 1594, XXII, 122.
 — *ceylanicum* Miss., 1696, XXIII, 235.
 — *fasciculare* Miss., 1697, XXIII, 235.
 — *sulcatum* Brid., 1593, XXII, 122.
Macrothamnium javense Fleisch., 1300, XX, 47.
Madotheca canariensis Nees, 884, XVIII, 373.
 — *laevigata* Dum., 1563, XXII, 117.
 — *platyphylla* Dum., 1564, XXII, 117.
 — — — var. *squarrosa* 1565, XXII, 118.
 — *Porella* Nees, 1566, XXII, 118.
Magnusiella Umbelliferarum Sadeb., 1630, XXIII, 219.
Mallotium Hildebrandtii Körb., 1035, XIX, 415.
 — *myochroum* Mass., 1363, XXI, 220.
 — *saturninum* Gray, 1363, XXI, 220.
 — *tomentosum* Körb., 1363, XXI, 220.
Mamiana Coryli Ces. et de Not., 511, XV, 194.
 — *fimbriata* Ces. et de Not., 827, XVIII, 356.
Manzonina Cantiana Garov., 1969, XXVI, 175.
Marasmius alliaceus Fries, 304, XIII, 444.
 — *ramealis* Fries, 303, XIII, 444.
 — *Rotula* Fries, 1809, XXV, 225.
Marchantia angustifolia Uech., 1261, XX, 41.
 — *fragrans* Balb., 282, XII, 96.
 — *polymorpha* L. var. *aquatica* Nees, 1561, XXII, 117.
 — *quadrata* Scop., 381, XIII, 469.
Maronea berica Mass., 1043, XIX, 417.

Marssonina Daphnes Sacc. f. *Passerinae* Bäuml., 1480, XXII, 97.
 — *Juglandis* Sacc., 730, XVII, 264.
 — *Thomasiana* Sacc., 1179, XX, 20.
Marsupella emarginata Dum., 471, XV, 188; 471 b, XXIV, 291.
 — — — var. *erythrorhiza* 192, XI, 100.
Massaria inquinans de Not., 510, XV, 194.
 — *Pupula* Tul., 510, XV, 194.
Mastichonema adscendens Näg., 147, XI, 90.
Mastigobryum deflexum Synop. Hepat., 1883, XXV, 249.
 — *trilobatum* Gotsch., 386, XIII, 469.
Maßzantia rhytismoides de Not., 412, XV, 171.
Meesea demissa Hoppe et Hornsch., 1583, XXII, 120.
Melachroia xanthomela Boud., 1449, XXII, 92.
Melampsora Allii-fragilis Kleb., 710, XVII, 260.
 — *Allii-populina* Kleb., 710, XVII, 260.
 — *Allii-Salicis albae* 710, XVII, 260.
 — *areolata* Fries, 934, XIX, 388.
 — *Chamaenerii* Rostr., 1133, XX, 10.
 — *Circeae* 705, XVII, 285.
 — *congregata* Dietel, 1115, XX, 5.
 — *Epilobii* Fuck., 1133, XX, 10.
 — *Euphorbiae dulcis* Outh., 1115, XX, 5; 1115 b, XXII, 102.
 — *farinosa* Schröter, 20, IX, 126.
 — *Goeppertiana* Wint., 816, XVIII, 353.
 — *Helioscopiae* Cast., 1113, XX, 4.
 — — Wint., 1115, XX, 5.
 — *Hypericorum* Schröt., 23, IX, 127.
 — *Klebahnii* Bubák, 1114, XX, 4.
 — *Magnusiana* Wagner, 1114, XX, 4.
 — *mixta* Schlecht., 981, XIX, 398.
 — *Padi* Cooke, 934, XIX, 388.
 — *Pirolae* Schröt., 935, XIX, 389.
 — *populina* Lévl., 22, IX, 127.
 — — Wint., 1114, XX, 4; 1116, XX, 5.
 — (*Pucciniastrum*) *pustulata* Schröt., 1133, XX, 10.
 — *Rostrupii* Wagner, 1116, XX, 5.
 — *Salicis Capreae* Wint., 20, IX, 126.
 — *tremulae* Tul., 21, IX, 126; 21 b, c, XVII, 265; 1114, XX, 4; 1116, XX, 5.
 — *Vaccinii* Wint., 1418, XXII, 86.
 — *Vacciniorum* Schröt., 1418, XXII, 85.
Melampsorella Aspidiotus Magn., 1134, XX, 11.
 — *Polypodii* Magn., 1135, XX, 11.
 — *Symphyti* Bubák, 1117, XX, 5.
Melampsoropsis Rhododendri Schröt., 1132, XX, 10.
Melanconis chrysostoma Fries, 513, XV, 195.
 — *macrosperma* Tul., 513, XV, 195.
 — *thelebola* Sacc., 1315, XXI, 207.
Melanconium juglandis Corda, 1479, XXII, 97.
 — — Kunze, 1479, XXII, 97.

- Melanogaster variegatus* Tul., 1812, XXV, 225.
Melanopsichium austroamericanum 8, IX, 122.
Melanotaenium Ari Lagerh., 1136, XX, 11.
— *plumbeum* Rostr., 1136, XX, 11.
Melanotheca arthonioides Nyl., 68, IX, 136.
Melasmia acerinum Lév., 207, XII, 79; 988, XIX, 400.
— *alnea* Lév., 986, XIX, 399.
— *Berberidis* Thüm. et Wint., 1177, XX, 119.
Melaspilea arthonioides Nyl., 266, XII, 93.
— *Bagliettoana* A. Zahlbr., 1026, XIX, 413.
— *deformis* Nyl., 1858, XXV, 240.
— *gibberulosa* Zwackh., 1858, XXV, 240.
— *megalya* Arn., 1858, XXV, 240.
— *opegraphoides* Nyl., 1026, XIX, 413.
— *poetarum* Nyl., 1026, XIX, 412.
— *rhododendri* Rehm, 175, XI, 97.
Melobesia pustulata Lamour., 349, XIII, 459.
Melogramma Bulliardii Tul., 1316, XXI, 207.
— *campylosporium* Fries, 1316, XXI, 208.
— *fusisporium* Fries, 1316, XXI, 208.
— *vagans* de Not., 1316, XXI, 207.
Melosira arenaria Moore, 640, XVI, 76.
— *distans* Kütz. var. *laevissima* Grun., 1632, XXIII, 220.
— *varians* Ag., 1845, XXV, 235.
Merceya ligulata Schimp., 1682, XXIII, 233.
Meridion circulare Ag., 1508, XXII, 103; 1844, XXV, 235.
— — *f. typica* u. *Zinckenii* Kütz., 1008, XIX, 405.
— *vernale* Leibl., 1508, XXII, 104.
Mesimopodium glaucum Näg., 227, XII, 83.
— *minimum* G. Beck, 227, XII, 83.
Merulius Corium Fries, 1142, XX, 12.
— *cornucopioides* Pers., 317, XIII, 446.
— *fulvus* Lasch., 1714, XXIV, 272.
— *infundibiliformis* Scop., 302, XIII, 443.
— *lacrymans* Wulf., 1911, XXVI, 157.
— *lutescens* Pers., 1420, XXII, 86.
— *merismoides* Fries, 1714, XXIV, 272.
Mesocarpus gracilis Kirchn., 532, XV, 200.
— *parvulus* Hass., 533, XV, 200.
— *scalaris* Hass., 534, XV, 200.
Mesophylla compressa Dnm., 388, XIII, 470.
Mesotaenia Endlicheriana Näg., 535, XV, 201.
Mesotaenium Braunii 1202, XX, 24; 1342, XXI, 213.
Metasphaeria scirpina Sacc., 260, XVI, 67.
Meteoriopsis reclinata Fleisch. var. *ceylonensis* Fleisch., 1795, XXIV, 290.
Meteorium amoenum Phw. et Mitt., 1793, XXIV, 290.
— *cuspidiferum* Tayl., 1792, XXIV, 290.
— *javanicum* Bryol. Jav., 1794, XXIV, 290.
Meteorium reclinatum Mitt., 1795, XXIV, 290.
— *tumidum* Mitt., 1596, XXII, 122.
Metzgeria conjugata Lindb., 694, XVI, 89; 694 b, XXIV, 292.
Metzleria alpina Milde, 1077, XIX, 424.
Micarea denigrata var. *Nitschkeana* Hedl., 1232, XX, 32.
— *melaena* Hedl., 362, XIII, 463.
— *violacea* f. *albicans* Hedl., 165, XI, 94.
Michodea coerulescens Kütz., 547, XV, 204.
Microsterias denticulata Bréb., 539, XV, 203.
— *papillifera* Bréb., 76, IX, 138; 536, XV, 202; 539, XV, 203.
— *rotata* Ralfs, 76, IX, 138.
— — (Grev.) Ralfs., 536, XV, 202.
— — Ralfs., 539, XV, 203.
— *Staurostrum* Kütz., 737, XVII, 267.
Microchaeta (Coleospermum) tenera Thur., 334, XIII, 455.
Microcoleus chthonoplastes Thur., 1948, XXVI, 167.
— *hyalinus* Kirchn. var. *β. calcilegus* (A. Braun) Hansgirg, 1203, XX, 24.
Microcystis aeruginosa Kütz., 226, XII, 83; 1517, XXII, 106.
— *Ichthyoblabe* Kütz., 1517, XXII, 106.
Microglauca Hassei A. Zahlbr., 751, XVII, 272.
— *modesta* A. Zahlbr., 751, XVII, 272.
Microglossum viride Gill., 206, XII, 79.
Microhaloa aeruginosa Kütz., 1517, XXII, 106.
Micropera Drupacearum Lév., 960, XIX, 394.
Microphiale diluta A. Zahlbr., 1028, XIX, 413.
— *lutea* (Dicks.) A. Zahlbr. f. *foliicola* A. Zahlbr., 1530, XXII, 109.
Micropodia dumorum Boud., 1614, XXIII, 216.
Microsphaera Alni Wint., 128, XI, 87.
— *Astragali* Sacc., 126, XI, 86.
— *Bäumleri* Magn., 1147, XX, 14.
— *Berberidis* Sacc., 127, XI, 87.
— *Caraganae* Magn., 614, XVI, 66.
— *Evonymi* Sacc., 1311, XXI, 207.
— *Extensa* Cook et Peck, 1739, XXIV, 278.
— *Grossulariae* Sacc., 125, XI, 86.
— *Lonicerae* Wint., 124, XI, 86.
— *marchica* Magn., 1147, XX, 14.
— *penicillata* Sacc., 128, XI, 87.
Microspora fontinalis de Toni, 857, XVIII, 364.
— *pachyderma* Lagerh., 634, XVI, 73.
Microstroma album Sacc., 216, XII, 81.
— *Juglandis* Sacc., 217, XII, 81; 217, XX, 23.
— *pallidum* Niessl, 217, XII, 81.
Microthamnion Kützingianum Näg. var. *strictissimum* 86, IX, 140.
Microthelia analeptoides Bagl. et Carest., 1354, XXI, 218.
— *anthracina* Arn., 66, IX, 136.

- Microthelia Metzleri* Lahm f. *anthracina* Stein., 66, IX, 136.
- Mnioecia Jungermanniae* Boud., 1320, XXI, 208.
- Mnium androgynum* L., 1686, XXIII, 233.
- *capillaceum* Sw., 783, XVII, 278.
- *cirratum* L., 1781, XXIV, 288.
- *fontanum* L., 298, XII, 97.
- *javense* Fleisch., 1595, XXII, 122.
- *osmundaceum* Dicks., 96, IX, 142.
- *pellucidum* L., 584, XV, 212.
- *punctatum* Hedw. var. *elatum* Schpr., 1279, XX, 44.
- *purpureum* L., 493, XV, 191.
- *pyriforme* L., 787, XVII, 279.
- *roseum* Weis., 1584, XXII, 120.
- *serratum* Schrad., 588, XV, 213; 588b, XX, 47.
- *turgidum* Wahlenb., 1386, XXI, 224.
- *undulatum* Weis., 1278, XX, 44.
- Molendoo Hornschuchiana* Lindb., 1263, XX, 41.
- *Sendtneriana* Limpr., 1264, XX, 42; 1264b, XXV, 252.
- Mollia litoralis* Braith., 494, XV, 191.
- Mollisia aspidiicola* Quel., 1441, XXII, 90.
- *atrocinerea* Phill., 955, XIX, 393.
- *citrinuloides* Rehm, 1437, XXII, 90.
- *Ebuli* Karst., 526, XV, 199.
- *erumpens* Karst., 1726, XXIV, 275.
- *flaveola* Phill., 1439, XXII, 90.
- *fusca* Karst., 1926, XXVI, 160.
- *Jungermanniae* Rehm, 1320, XXI, 208.
- *petiolaris* Sacc., 1726, XXIV, 275.
- *pineti* Phill., 1166, XX, 17.
- *ramealis* Karst., 956, XIX, 393.
- *Ranunculi* Phill., 629, XVI, 69.
- *Trifolii* Phill., 1438, XXII, 90.
- Monilia Linhartiana* Sacc., 218, XII, 81.
- Morchella bohemica* Krombh., 951, XIX, 392.
- Morthiera Mespili* Fuck. var. *Cydoniae* Cooke, 418, XV, 173.
- Mougeotia genuflexa* Roth var. *gracilis* Reinsch., 532, XV, 200.
- *gracilis* Kütz., 532, XV, 200.
- *laetovirens* Witt., 232, XII, 85.
- *parvula* Hass., 533, XV, 200.
- *scalaris* Hass., 534, XV, 200.
- *splendens* Kütz., 533, XV, 200.
- Mucor cancellatus* Batsch, 4, IX, 120.
- *granulosus* Bull., 702, XII, 79.
- Mycoporum ptelaoides* Nyl., 444, XV, 181.
- Mycosphaerella innumerella* Schröt., 1919, XXVI, 159.
- *Lysimachiae* Höhn., 1151, XX, 14.
- Mycosyrinx Cissi* G. Beck, 11, IX, 123.
- Mylia anomala* G. F. Gray, 184, XI, 98; 184b, XXIV, 291.
- Mylia Taylori* A. Gray, 474, XV, 188; 474 b, XXIV, 291.
- Mylitta australis* Berk., 211, XII, 80.
- Myriodactylon endiviaefolium* Gray, 1501, XXII, 102.
- Myrionema maculiforme* Kütz., 1747, XXIV, 280; 1943, XXVI, 165.
- *punctiforme* Harv., 1747, XXIV, 280.
- *strangulans* Grev., 1747, XXIV, 280.
- *strangularis* Grev., 1943, XXVI, 165.
- *vulgare* Thur., 1747, XXIV, 280.
- Myriostoma coliforme* Corda, 1916, XXVI, 158.
- Myrmaeciella Caraganae* v. Höhn., 1612, XXIII, 216.
- Myrsidrum clavaeformis* Ag., 348, XIII, 459.
- *clavatum* Raf., 348, XIII, 459.
- Naemospora croceola* Sacc., 1937, XXVI, 163.
- Naevia tithymalina* Rehm, 524, XV, 198.
- Napicladium Tremulae* Sacc., 1499, XXII, 101.
- Nardia compressa* Carr., 388, XIII, 470.
- *crenulata* Lindb., 272, XII, 94.
- *hyalina* Carr., 271, XII, 94.
- *scalaris* S. Gray, 91, IX, 141; 384, XIII, 469.
- Navicula cuspidata* Kg., 1844, XXV, 235.
- (*Diploneis*) *elliptica* Kütz., 1206, XX, 25.
- *lanceolata* Kütz., 741, XVII, 269.
- *Hungarica* Grun. var. *Rechingeri* Stockm., 1008, XIX, 406.
- *mutica* Kütz., 1843, XXV, 234.
- *radiosa* Kütz., 1507, XXII, 103.
- Neckera Besseri* Jur., 1281, XX, 44.
- *canariensis* Brid., 792, XVII, 280.
- *cladorrhizans* Hedw., 1687, XXIII, 233.
- *complanata* Hüb., 1280, XX, 44; 1280 b, XXI, 227.
- *crispa* Hedw., 595, XV, 214; 595 b, XXII, 123.
- *elegans* Jur., 794, XVII, 280.
- *fuscens* Hook., 1791, XXIV, 290.
- *hispida* C. Müll., 1993, XXVI, 181.
- *Kermadecensis* C. Müll., 99, IX, 142.
- *Lepineana* Mont., 1398, XXI, 226.
- *ligulaefolia* Mitt., 1397, XXI, 226.
- *longissima* Dz. et Mb., 1295, XX, 46.
- *seductrix* Hedw., 1688, XXIII, 234.
- *semitorta* C. Müll., 1399, XXI, 226.
- *Sendtneriana* Bryol. Europ., 1281, XX, 44.
- *tumida* Dicks., 1596, XXII, 122.
- Nectria Aquifolii* Berk., 1610, XXIII, 215.
- *cinnabarina* Fries, 612, XVI, 65.
- *coccinea* Fries, 1430, XXII, 88.
- — Aut. div., 505, XV, 192.
- *Cucurbitula* Fries, 965, XIX, 395.

- Nectria ditissima* L. et Ch. Tul., 502, XV, 192.
 — *Galligena* Bres., 613, XVI, 66.
 — *graminicola* Berk., 1839, XXV, 233.
 — *Lamyi* de Not., 822, XVIII, 355.
 — *punicea* Fries, 821, XVIII, 354.
 — *Ribis* Oudem., 820, XVIII, 354.
Nephroma arcticum E. Fries, 1544, XXII, 112.
 — *expallidum* Nyl., 1966, XXVI, 173.
 — *lusitanicum* Schaer., 869, XVIII, 367.
 — *parilis* Ach., 42, IX, 130.
 — *resupinatum* Ach., 1967, XXVI, 173.
 — — *γ. rameum* Schaer., 563, XV, 208.
 — *tomentosum* 1967, XXVI, 174.
Nephromium expallidum Nyl., 1966, XXVI, 173.
 — *laevigatum* var. *parile* Nyl., 42, IX, 130.
 — *lusitanicum* Nyl., 869, XVIII, 367.
 — *resupinatum* Arn., 1967, XXVI, 174.
 — *tomentosum* Nyl., 1967, XXVI, 174.
 — — subsp. et var. *rameum* Nyl., 563, XV, 208.
Nephromopsis ciliaris Hue, 1247, XX, 37.
 — *platyphylla* Herre, 1774, XXIV, 285.
Nereia filiformis Zanard., 1512, XXII, 104.
Nesolechia oxysporella Rehm, 627, XVI, 68.
 — *punctum* Mass., 627, XVI, 68.
Niptera congener de Not., 629, XVI, 69.
 — *ramealis* Karst., 956, XIX, 393.
Nitella polysperma Kütz., 434, XV, 179.
 — *tenuissima* Coss. et Germ., 347, XIII, 459; 347 b, XXIV, 283.
Nitophyllum ocellatum Grev., 645, XVI, 77.
 — *punctatum a. ocellatum* 645, XVI, 77.
Nitxschia hungarica Grun., 1008, XIX, 406; 1844, XXV, 235.
 — *vermicularis* Grun., 1008, XIX, 406.
Nodularia sphaerocarpa Born. et Flab., 428, XV, 176.
Normandina Davidis Hue, 1855, XXV, 239.
 — *Jungermanniae* Nyl. 1855, XXV, 239.
 — *pulchella* Nyl., 1855, XXV, 238.
Nostoc calcicola Ag., 1520, XXII, 106.
 — *commune* Vauch., 222, XII, 82; 222 b, XVI, 80.
 — *giganteum* Mohr, 1206, XX, 25.
 — *macrocarpum* Menegh., Born. et Flab., 632, XVI, 72.
 — *microscopium* Carm., 146, XI, 90; 228, XII, 84; 632, XVI, 71; 1342, XXI, 213.
 — *muscorum* 1342, XXI, 213.
 — *parmelioides* 631, XVI, 71.
 — *piscinale* Kütz., 223, XII, 82.
 — *rivulare* Filarszky, 421, XV, 173.
 — *verrucosum* Vauch., 71, IX, 137; 71 b, XVI, 80.
 — — — var. *Pseudo-Zetterstedtii* Stockm., 631, XVI, 71; 631 b, XXIV, 283.
Notihydium australe F. de Müll., 211, XII, 80.
Nowellia curvifolia Mitt., 1570, XXII, 118.
Nummularia Bulliardii Tul., 516, XV, 196.
 — *nummularium* 516, XV, 196.
Nylanderaria canariensis O. Ktze, 769, XVII, 276.
 — *vulpina* O. Ktze, 878, XVIII, 371.
Ocellaria aurea Tul., 1925, XXVI, 160.
 — *ocellata* Schröt., 1925, XXVI, 160.
Ochrolechia androgyna Arn., 1039, XIX, 416.
 — *geminipara* Wainio, 1871, XXV, 244.
 — *leprothalia* Arn., 1871, XXV, 244.
 — *pallescens* Körb., 1664, XXIII, 229.
 — *tartarea* Mass. ssp. *O. androgyna* Arn., 1039, XIX, 416.
Ochroporus fomentarius Schröt., 310, XIII, 445.
 — *odoratus* Schröt., 311, XIII, 445.
Octaviana variegata Vitt., 1812, XXV, 226.
Octoblepharum albidum Hedw., 674, XVI, 85.
Octodicerus Julianum Brid., 888, XVIII, 373.
Octospora citrina Hedw., 205, XII, 78.
 — *scutellata* Schrk., 1323, XXI, 209.
Odontidium hiemale Kütz., 75, IX, 137.
Oedocladium rufescens Mitt., 1294, XX, 46.
Oedogonium mammiferum Wittr., 234, XII, 85.
Oidium bulbigerum Sacc. et Vogl., 1482, XXII, 98.
 — *Epilobii* Lindau, 1481, XXII, 98.
 — *erysiphoides* Fries, 995, XIX, 401.
 — *fragariae* Hasz., 1481, XXII, 98.
 — *fusisporoides* Fries var. *Lampsanae* Desm., 1492, XXII, 100.
 — *monilioides* Lk., 1482, XXII, 98.
 — *quercinum* Thüm., 1739, XXIV, 277.
 — *rubellum* Sacc. et Vogl., 1482, XXII, 98.
 — *Triticii* Lib., 1482, XXII, 98.
Oligotrichum hercynicum Lam. et DC., 789, XVII, 279.
Omalia Besseri Lobarz., 1281, XX, 44.
Ombrophila strobilina Rehm, 204, XII, 76.
Omphalia Campanella Sacc. var. *myriadea* Klbr., 949, XIX, 391.
 — *dealbata* Quel., 1606, XXIII, 214.
Oncobyrsa rivularis Menegh., 744, XVII, 269.
Oocardium stratum Näg., 342, XIII, 457.
Oocystis solitaria Wittr. var. *crassa* Hansg., 149, XI, 91.
Oospora Epilobii Sacc., 1481, XXII, 98.
Opegrapha atra Pers., 1526, XXII, 109.
 — *cymbiformis* η. *deformis* Schaer., 1858, XXV, 240.
 — *elegans* Sm., 369, XIII, 464.
 — *Elisae* Mass., 555, XV, 206.
 — *gyrocarpa* Flot., 368, XIII, 464.
 — *involuta* Kplhb., 554, XV, 206.
 — *Personii* Ach., 368, XIII, 464.
 — *rimulosa* Mntg., 60, IX, 134.
 — *rubella* Moug. et Nestl., 554, XV, 206.

- Opographa rubella* Moug. et Nestl. *γ. viridescens* Ach., 554, XV, 206.
 — *saxicola* var. *gyrocarpa* Stzbgr., 368, XIII, 464.
 — *scripta* Ach., 1648, XXIII, 224.
 — *subsiderella* Nyl., 1233, XX, 29.
 — *varia* var. *deformis* Schaer., 1858, XXV, 240.
 — *venosa* Sm., 377, XIII, 467.
 — *verrucarioides* a. *O. megalyna* Ach., 1858, XXV, 240.
 — *viridis* Pers., 554, XV, 206.
 — *vulgata* Ach., 442, XV, 180.
 — — var. *subsiderella* Nyl., 1223, XXII, 29.
Ophiobolus fruticum Sacc., 623, XVI, 67.
Opisteria expallida Wainio, 1966, XXVI, 173.
 — *resupinata* Wainio, 1967, XXVI, 174.
Orthosira arenaria W. Sm., 640, XVI, 76.
Orthotrichum Lyellii Hook. et Tayl., 1085, XIX, 425; 1085 b, XXIII, 236.
 — — — var. *crispatum* Schiffn., 1086, XIX, 425.
 — *nudum* Dicks., 1384, XXI, 224.
 — *saxatile* Schimp., 1383, XXI, 224.
Oscillaria anguina Kütz., 431, XV, 177.
 — *antliaria* Jürg. var. *repens* 225, XII, 83.
 — *brevis* Kütz., 1001, XIX, 402.
 — *chalybea* Kütz., 431, XV, 177.
 — — *β. Boschii* Kütz., 431, XV, 177.
 — *Cortiana* Wolle, 429, XV, 177.
 — *infectoria* Rabenh., 745, XVII, 269.
 — *irrigua* Kütz., 430, XV, 177.
 — *Kützlingiana β. binaria* Nordst., 745, XVII, 269.
 — *limosa δ. amethysteo-chalybea* Kütz., 430, XV, 177.
 — — *α. laete-aeruginosa* Kütz., 429, XV, 177.
 — *maxima* Kütz., 1941, XXVI, 165.
 — *natans* Kütz., 429, XV, 177.
 — *Pollinii* Menegh., 549, XV, 205.
 — *princeps* Rabenh., 549, XV, 205.
 — *punctata* Menegh., 431, XV, 177.
 — *Retzii* Agh., 425, XV, 175.
 — *scandens* Richt., 428, XV, 176.
 — *smaragdina* Kütz., 428, XV, 176.
 — *subsalsa* Zanard., 431, XV, 177.
 — *tenuis* var. *tergestina* Rabenh., 424, XV, 175.
 — — *b. tergestina* Rabenh., 429, XV, 177.
 — — *α. viridis* Kütz., 429, XV, 177.
 — *tergestina* Kütz., 424, XV, 175; 429, XV, 177.
 — *thermalis* Crou., 428, XV, 176.
 — *viridis* Kütz., 429, XV, 177.
 — sp., 149, XI, 91.
Oscillatoria amphibia Ag., 745, XVII, 262.
 — *animalis* f. *tenuior* Ag., 428, XV, 176.
 — *autumnalis* Ag., 424, XV, 175; 855, XVIII, 363.
 — *brevis* Gomont, 1001, XIX, 402.
 — *calicicola* Ag., 1520, XXII, 106.
 — *chalybea* Mert., 431, XV, 177; 432, XV, 177.
Oscillatoria decorticans Lyngb., 423, XV, 174.
 — *formosa* Gom., 1941, XXVI, 165.
 — *imperator* Wood, 549, XV, 205.
 — *irrigua* Gom., 430, XV, 177; 432, XV, 177.
 — *laminosa* Ag., 1947, XXVI, 166.
 — *limosa* Ag., 534, XV, 201.
 — *lutea* Ag., 1201, XX, 24.
 — *ornata* Gom., 432, XV, 178.
 — *princeps* Gom., 432, XV, 178.
 — — *Vauch.*, 549, XV, 205; 1941, XXVI, 165.
 — *proboscidea* 1941, XXVI, 165.
 — *splendida* Gom., 432, XV, 178.
 — — *Grev.*, 855, XVIII, 363; 1946, XXVI, 166.
 — *subfusca* Ag., 424, XV, 174.
 — *tenerima* Kütz., 745, XVII, 269.
 — *tenuis* Ag. var. *natans* Gom., 1946, XXVI, 166.
 — — — var. *tergestina* Gom., 424, XV, 175; 429, XV, 177.
Oscillatorium Corium Ag., 423, XV, 174.
Ovularia Asperifolii Sacc., 1485, XXII, 99.
 — *canaegricola* P. Henn., 1184, XX, 21.
 — *haplospora* Magn., 1626, XXIII, 218.
 — *lactea* Roum. et Rouss., 1488, XXII, 99.
 — *necans* Sacc., 1488, XXII, 99.
 — *obliqua* Oudem. var. *canaegricola* Henn., 1184, XX, 21.
 — *pusilla* Sacc., 1626, XXIII, 218.
 — *Stellariae* Sacc., 1338, XXI, 212.
 — *variabilis* Roum. et Rouss., 1835, XXV, 231.
Oxonium auricomum Lk., 1339, XXI, 212; 1339 b, XXIV, 278.
Pachyospora calcarea γ. farinosa Mass., 1776, XXIV, 286.
 — *farinosa* Mass., 1776, XXIV, 286.
Padina collaris Grev., 642, XVI, 77.
 — *Pavonia* Lam., 1218, XX, 28.
 — *phasiana* Bory, 1510, XXII, 104.
Pallavicinia Blyttii Lindb., 384, XIII, 469.
Palmella cruenta Ag., 343, XIII, 458.
 — *miniata* Leibl., 1345, XXI, 215.
 — *mucosa* Kütz., 150, XI, 91.
 — *pallida* Kütz., 146, XI, 90.
Palmogloea Endlicheriana Rabenh., 535, XV, 201.
Paludella squarrosa Brid., 788, XVII, 279.
Panaeolus campanulatus Sacc., 1424, XXII, 87.
Pandorina morum Bory, 338, XIII, 456.
Pannaria brunnea Körb., 457, XV, 184.
 — — *β. pezioides* Mass., 457, XV, 184.
 — *conoplea* 1980, XXVI, 178.
 — (*Pannularia*) *corallinoides* Wainio, 358, XIII, 462.
 — *nebulosa* Nyl., 1543, XXIII, 112.

- Pannaria pezizoides* Leight., 457, XV, 184.
 — *plumbea* DC., 357, XIII, 462.
 — — var. *myriocarpa* Del., 357, XIII, 462.
 — *Schaereri* Mass., 455, XV, 184.
 — *triptophylla* Mass., 358, XIII, 462.
Pannularia triptophylla Nyl., 358, XIII, 462.
Panus Hoffmanni Fries, 1422, XXII, 86.
 — *rudis* Fries, 1422, XXII, 86.
 — *Sainsonii* Heufl., 1422, XXII, 86.
Papillaria cuspidifera Jäg., 1792, XXIX, 290.
 — *fuscescens* Jäg., 1792, XXIV, 290.
 — *Kermadecensis* C. Müll., 99, IX, 142.
 — *semitorta* Jäg., 1399, XXI, 226.
Parmelia americana Mont., 1044, XIX, 417.
 — *aspera* Mass., 1873, XXV, 245.
 — *aspidota* Röhl., 1873, XXV, 245.
 — — var. *elegantula* A. Zahlbr., 666, XVI, 84.
 — *atra* β . *argopholis* Wahlb., 50, IX, 132.
 — *austerodes* Nyl., 1251, XX, 38.
 — *Borreri* Turn., 247, XII, 89.
 — *camtschadalis* var. *cirrhata* A. Zahlbr., 1044, XIX, 417.
 — *canariensis* Sprgl., 769, XVII, 276.
 — *caperata* (L.), 1250, XX, 38.
 — *cerina* f. *pyracea* Ach., 251, XII, 90.
 — *cetrarioides* Del., 1365, XXI, 221.
 — *chloantha* Ach., 577, XV, 210.
 — *chlorophana* 45, IX, 130.
 — *cirrhata* E. Fries, 1044, XIX, 417.
 — *coralloidea*, *aspera* Eschw., 1253, XX, 38.
 — *cylisphora* (Ach.) Wainio, 874, XVIII, 369.
 — *dendritica* E. Fries, 1249, XX, 37.
 — *dubia* Schaer., 247, XII, 89.
 — *exasperata* De Not., 1873, XXV, 245.
 — *fraudans* Nyl., 1970, XXVI, 175.
 — *fuliginosa* var. *laetevirens* Nyl., 665, XVI, 84.
 — *furfuracea* Ach., 156, XI, 92.
 — — f. *ceratea* 768, XVII, 276.
 — — var. *isidiophora* A. Zahlbr., 876, XVIII, 369.
 — — subsp. *olivetorina* A. Zahlbr., 1046, XIX, 418.
 — *glabra* Nyl., 875, XVIII, 369.
 — *glauca* f. *ulophylla* Wallr., 1366, XXI, 221.
 — *Hageni* β . *syriaca* Ach., 763, XVII, 275.
 — *Kamtschadalis* var. *americana* Nyl., 1044, XIX, 417.
 — *laevigata* var. *revoluta* Nyl., 571, XV, 209.
 — *Lamarckii* Schaer., 1549, XXII, 113.
 — *lanata* * *minuscule* Nyl., 1971, XXXI, 175.
 — *limbata* Laur., 570, XV, 209.
 — *minuscule* Nyl., 1971, XXVI, 175.
 — *nigrescens* ϵ . *microphylla* Schaer., 1660, XXIII, 228.
 — *obscura* b. *chloantha* 577, XV, 210.
 — (*Hypogymnia*) *obscurata* Bitter, 1251, XX, 38.
Parmelia ochracea E. Fries, 166, XI, 95.
 — — β . *aspidota* Ach., 1873, XXV, 245.
 — *olivacea* α . *corticola* * *aspidota* Th. Fr., 1873, XXV, 245.
 — — — α . *glabra* Schaer., 875, XVIII, 369.
 — — — * *subaurifera* Syd., 1872, XXV, 244.
 — — var. *exasperata* Nyl., 1873, XXV, 245.
 — — var. *isidioides* Rabh., 665, XVII, 84.
 — — β . *laetevirens* Krphb., 655, XVI, 84.
 — — var. *ramosa* Beltr., 665, XVI, 84.
 — — c. *sorediata* Tuck., 1249, XX, 37.
 — *omphalodes* var. *panniformis* 1552, XXII, 114.
 — *pallida* δ . *fuscella* Schaer., 763, XVII, 275.
 — *parella* c. *corticola* Schaer., 1039, XIX, 416.
 — — γ . *variolosum* Wallr., 1039, XIX, 416.
 — *parietina* β . *ectanea* Ach., 1559, XXII, 116.
 — *perlata* var. *cetrarioides* Duby, 1365, XXI, 221.
 — *physodes* var. *granulata* Bois., 1874, XXV, 245.
 — — var. *obscurata* Ach., 1251, XX, 38.
 — *pityrea* Nyl., 1980, XXVI, 178.
 — *prolixa* var. *Pokornyi* A. Zahlbr., 1248, XX, 37; 1248 b, XXI, 222.
 — — subsp. *sorediata* Crb., 1249, XX, 37.
 — *pulverulenta* var. *grisea* Schaer., 1980, XXVI, 178.
 — — Gray, 1670, XXIII, 230.
 — *quercifolia* var. *revoluta* Leight., 571, XV, 209.
 — *reddenda* Srtm., 247, XII, 89.
 — *relicina* Nyl., 570, XV, 209.
 — *revoluta* Nyl., 571, XV, 209.
 — *rubra* Ach., 53, IX, 132.
 — *saxatilis* var. *panniformis* Schaer., 1552, XXII, 114.
 — *sorediata* Th. Fries, 1249, XX, 37.
 — *soredica* Nyl., 1250, XX, 37.
 — *Sprengelii* Flk., 1249, XX, 37.
 — *stellaris* Ach., 1260, XX, 40.
 — *strepsilis* Ach., 41, IX, 130.
 — *stygia* b. *sorediata* Ach., 1249, XX, 37.
 — *subaurifera* Nyl., 1872, XXV, 244.
 — *subfusca* ϵ . *pinastri* Schaer., 1775, XXIV, 286.
 — *tenella* Ach., 248, XII, 89.
 — *tenuissima* Tayl. var. *corallina* Müll. Arg., 1045, XIX, 417.
 — *tenuiscypha* Tayl., 1045, XIX, 417.
 — *trichodea* Sprgl., 1556, XXII, 115.
 — *usneoides* Ach., 1050, XIX, 419.
 — *varia* var. *parasitica* E. Fries, 1231, XX, 32.
 — *vittata* b. *obscurata* Dalla Torre et Sarnth., 1250, XX, 38.
 — *Zopfi* Zahlbr., 876, XVIII, 370.
Parmeliella corallinoides A. Zahlbr., 358, XIII, 462; 358b, XV, 187.
 — *plumbea* Wain. var. *myriocarpa* A. Zahlbr., 357, XIII, 462.

- Parmeliella triptophylla* Müll., 358, XIII, 462.
Passalora bacilligera Fries, 1938, XXVI, 163.
Patellaria cismonica Hepp, 1551, XXII, 114.
— *clausa* Näg., 446, XV, 182.
— *endoleuca* Müll. Arg., 258, XII, 92.
— *fuscella* Näg., 763, XVII, 275.
— *genevensis* Müll. Arg., 657, XVI, 83.
— *leucaspis* Hepp, 361, XIII, 463.
— *lutescens* DC., 568, XV, 209.
— *macrocarpa* DC., 1029, XIX, 413.
— *melaena* Müll. Arg., 362, XIII, 463.
— *nebulosa* Hoffm., 1543, XXII, 112.
— *ochracea* Müll. Arg., 166, XI, 95.
— *Rabenhorstii* Hepp, 458, XV, 184.
— *rubra* Hoffm., 53, IX, 132.
— *tartarea* γ. *arborea* DC., 1039, XIX, 416.
— *vesicularis* Hoffm., 754, XVII, 273.
Peccania coralloides Mass., 70, IX, 136.
Peckiella lateritia R. Maire, 1611, XXIII, 215.
— *Vuillemianiana* Sacc. et Syd., 1611, XXIII, 215.
Pediastrum Boryanum Menegh., 149, XI, 91.
— *tetras* Ralfs, 227, XII, 84.
Pedinophyllum interruptum Schiffn., 1882, XXV, 249.
Pellia calycina Nees, 772, XVII, 277.
— *endiviaefolia* Dum. var. *lorea* Nees, 772, XVIII, 277; 772 b, XXIV, 292.
— *epiphylla* B. f. *Neesiana* Gottsche, 382, XIII, 469.
— — Corda, 383, XIII, 469.
— — Nees, 772, XVII, 277.
— *Neesiana* Limpr., 382, XIII, 469.
Peltidea apthosa Ach., 154, XI, 92.
— *canina* Ach., 1547, XXII, 113.
— *horizontalis* Ach., 1548, XXII, 113.
— *venosa* Hoffm., 562, XV, 208.
Peltigera americana Sprgl., 1247, XX, 37.
— — Wainio, 1546, XXII, 113.
— *canina* Hoffm., 1547, XXII, 113.
— *horizontalis* Hoffm., 1548, XXII, 113.
— *limbata* Del., 868, XVIII, 367.
— — var. *propagulifera* Arn., 868, XVIII, 367.
— *polydactyla* Hoffm., 661, XVI, 83.
— *scutata* Leight., 868, XVIII, 367.
— — var. *propagulifera* Fw., 868, XVIII, 367.
— *tomentosa* Hoffm., 1967, XXVI, 174.
— *venosa* Hoffm., 562, XV, 208.
Peniophora aurantiaca Höhn. et Litsch., 1712, XXIV, 272.
— *carnea* Sacc., 320, XIII, 44.
— *cinerea* Cooke, 1711, XXIV, 271.
— *Ellisii* Masee, 1905, XXVI, 156.
— *gigantea* Masee, 1602, XXIII, 214.
— *incarnata* Cooke, 1804, XXV, 224.
— *obscura* Bresad., 1905, XXVI, 156.
— *quercina* Cooke, 320, XIII, 447.
Penium cruciferum Wittr. β. *pluriradians* Wittr., 860, XVIII, 365.
Penium curtum Breb., 428, XV, 177.
— *digitus* Breb., 537, XV, 202; 539, XV, 203; 1009, XIX, 407.
— *interruptum* Breb., 539, XV, 203.
— *margaritaceum* Breb., 539, XV, 203.
— *Mooreanum* Arch., 1009, XIX, 406.
— *oblongum* de Bary, 78, IX, 138; 538, XV, 202; 852, XVIII, 362.
Perichaena strobilina Fries, 934, XIX, 388.
Peridermium columnare Kunze et Schmidt, 816, XVIII, 353.
— *Corni* Kleb., 110 c, XVII, 265.
— *corruscans* Fries, 1707, XXIV, 271.
— *Jaapii* Kleb., 709, XVII, 260.
— *Rostrupii* E. Fisch., 815, XVIII, 353.
— *Strobi* Kleb., 1131, XX, 10.
Peronospora Alsinearum Casp., 603, XVI, 64.
— *Antirrhini* Schröt., 604, XVI, 64.
— *calbocapni* G. Beck, 114, XI, 84.
— *calotheca* de Bary, 602, XVI, 63; 602 b, XXVI, 164.
— *conferta* Ung., 603, XVI, 64.
— *conglomerata* Fuck., 1830, XXV, 229.
— *conii* Tulasne, 605, XVI, 64.
— *effusa* Rabenh., 1829, XXV, 229.
— *Erodii* Fuck., 1830, XXV, 229.
— *farinosa* Keissl., 1829, XXV, 229.
— *ficariae* Tulasne, 601, XVI, 63.
— *Galii* Fuck., 602, XVI, 63.
— *gangliiformis* de Bary, 1195, XX, 22.
— *grisea* Rabenh., 601, XVI, 63.
— *Lepigoni* Fuck., 603, XVI, 64.
— *Linariae* Fuck., 603, XVI, 64.
— *macrocarpa* Rabenh., 605, XVI, 64.
— *macrospora* Ung., 605, XVI, 64.
— *Myosuri* Fuck., 601, XVI, 63.
— *nivea* Ung., 601, XVI, 63; 605, XVI, 64.
— *Sherardiae* Fuck., 602, XVI, 63.
— *tomentosa* Fuck., 603, XVI, 64.
— *Trifoliorum* de Bary, 115, XI, 84.
— *Umbelliferarum* Casp., 605, XV, 64.
— *viticola* Caspary, 113, XI, 84.
Pertusaria amara Nyl., 257, XII, 91.
— *chiodectonoides* Bagl., 1037, XIX, 415.
— *communis* var. *variolosa* Hepp, 257, XII, 91.
— *corallina* Arn., 256, XII, 91.
— *dealbata* var. *corallina* Cromb., 256, XII, 91.
— — var. *laevigata* Nyl., 1038, XIX, 415.
— *faginea* Wainio, 257, XII, 91.
— (*Lecanorastrum*) *Finkii* A. Zahlbr., 867, XVIII, 367.
— *flavicunda* Tuck., 1869, XXV, 242.
— *globulifera* Mass., 1038, XIX, 415.
— *inquinata* Th. Fries, 1037, XIX, 415.
— *lactea* Nyl., 569, XV, 209.
— *lactescens* β. *lactea* Mudd, 569, XV, 209.
— *laevigata* Arn., 1038, XIX, 415.

- Pertusaria ocellata* β. *corallina* Körb., 256, XII, 91.
 — *sorediata* Körb., 1038, XIX, 415.
Pestalotzia Soraueriana Sacc., 1180, XX, 20.
Petalonema alatum Berk., 746, XVII, 269.
Petractis clausa Krphbr., 446, XV, 182.
 — *exanthemica* E. Fries, 446, XV, 182.
 — — Steiner, 446, XV, 182.
Peyssonelia umbilicata Kütz., 642, XVI, 77.
 — *Squamaria* Decaisne, 1516, XXII, 105.
Pezicula carpinea Tul., 1163, XX, 16.
 — *eucrita* Karst., 722, XVIII, 359.
Peziŷa Abietis Pers., 958, XIX, 393.
 — *acetabulum* L., 139, XI, 89.
 — *acuum* Alb. et Schw., 527, XV, 199; 1442, XXII, 90.
 — *amentacea* Balb., 1725, XXIV, 274.
 — *amphibola* Hepp, 818, XVIII, 354.
 — *amplissima* Fries, 529, XV, 199.
 — (*Dasyscyphae*) *aspidiicola* Berk. et Br., 1441, XXII, 90.
 — *atrata* β. *Ebuli* Fries, 526, XV, 199.
 — *atrocinerea* Cooke, 955, XIX, 393.
 — *Aucupariae* Pers., 1164, XX, 17.
 — *aurantia* Müll., 1823, XXV, 228.
 — *barbata* Gill., 1727, XXIV, 275.
 — *bulgaroides* Rabh., 204, XII, 78.
 — *calycina* Willd., 954, XIX, 392.
 — — β. *Abietis* Fries, 1168, XX, 18.
 — — α. *Pini sylvestris* Fries, 1821, XXV, 227.
 — *calyculaeformis* Schum., 1617, XXIII, 217.
 — *carpinea* Pers., 1163, XX, 16.
 — *Cerasi* Pers., 960, XIX, 394.
 — *chrysophthalma* Pers., 1168, XX, 18.
 — *chrysostigma* Fries, 1439, XXII, 90.
 — *ciliaris* Schrad., 1822, XXV, 228.
 — *citrina* Batsch, 205, XII, 78.
 — *clandestina* Bull., 1447, XXII, 91.
 — *Clissonii* Rip., 529, XV, 199.
 — *comitalis* Batsch, 209, XII, 80.
 — *conglomerata* Wahlbg., 1164, XX, 17.
 — *cornucopioides* L., 317, XIII, 446.
 — (*Discina*) *coronaria* Beck, 529, XV, 199.
 — *coronaria* Jacq., 529, XV, 199.
 — — var. *macrocalyx* Cooke, 529, XV, 199.
 — *corticalis* Pers., 1616, XXIII, 216.
 — *crenata* Bull., 1730, XXIV, 275.
 — *cupula* Holmsk., 1801, XXV, 223.
 — *cupularis* L., 1730, XXIV, 275.
 — *cyathoidea* Bull., 1170, XX, 18.
 — *Dargelasii* Gach., 529, XV, 199.
 — *diluta* Pers., 1028, XIX, 413.
 — *dumorum* Rob. et Desm., 1614, XXIII, 216.
 — *Equiseti* Rabenh., 628, XVI, 69.
 — *erumpens* Grev., 1726, XXIV, 275.
 — *eucrita* Karst., 722, XVIII, 359.
 — *eximia* Dur., 529, XV, 199.
Peziŷa fascicularis Alb. et Schw., 1436, XXII, 89.
 — *flammea* Alb. et Schw., 1444, XXII, 91.
 — *flaveola* Cooke, 1439, XXII, 90.
 — *frangulae* Pers., 959, XIX, 393.
 — *fusca* Pers., 1926, XXVI, 160.
 — *fuscescens* Pers., 1169, XX, 18.
 — *geaster* Gonn. et Rabh., 529, XV, 199.
 — (*Phialea*) *humilis* Desm., 817, XVIII, 353.
 — *Humuli* Lasch., 817, XVIII, 353.
 — *inquinans* Pers., 525, XV, 198.
 — *julacea* Pers., 1725, XXIV, 274.
 — *Jungermanniae* 1320, XXI, 208.
 — *Leineri* Gonn. et Rabenh., 1731, XXIV, 276.
 — *leucoloma* Fries, 1618, XXIII, 217.
 — *leucomelas* Gill., 1824, XXV, 228.
 — *macrocalyx* Riess., 529, XV, 199.
 — *microspis* Karst., 1440, XXII, 90.
 — *nidulus* Schmidt et Kunze, 1446, XXII, 91.
 — *nigrella* Pers., 1732, XXIV, 276.
 — *omphalodes* Bull., 1930, XXVI, 161.
 — *Personii* Moug., 628, XVI, 69.
 — *pithya* Pers., 1731, XXIV, 276.
 — *pineti* Batsch, 1166, XX, 17.
 — *polaris* Batsch, 203, XII, 76.
 — *polymorpha* Oed., 525, XV, 198.
 — *populnea* Pers., 1436, XXII, 89.
 — *pulchella* β. *flavococcinea* Alb. et Schw., 1168, XX, 18.
 — *Pyri* Pers., 1164, XX, 17.
 — *ramealis* Karst., 956, XIX, 393.
 — *rufofusca* Web., 1167, XX, 17.
 — *schizostoma* Rich., 529, XV, 199.
 — *scutella* L., 1323, XXI, 209.
 — *scutula* Pers., 528, XV, 199.
 — *serotina* Pers., 1927, XXVI, 160.
 — *sicula* Inz., 529, XV, 199.
 — *Solani* Pers., 1170, XX, 18.
 — *sphaeriaeformis* Rehbent., 1164, XX, 17.
 — *sulcata* Pers., 1825, XXV, 228.
 — *sulphurata* Sch., 1928, XXVI, 161.
 — *tenella* Batsch, 1170, XX, 18.
 — *tenera* Saut., 1728, XXV, 233.
 — *testacea* Moug., 1450, XXII, 92.
 — *Willkommii* Hartig, 953, XIX, 392.
 — *xanthomela* Pers., 1449, XXII, 92.
Peziŷella aspidiicola Rehm, 1441, XXII, 90.
 — *chrysostigma* Sacc., 1439, XXII, 90; 1441, XXII, 90.
 — *flaveola* Sacc., 1439, XXII, 90.
 — *fuscescens* Rehm, 1615, XXIII, 216.
 — *lutescens* Rehm, 1615, XXIII, 216.
 — *microspis* Sacc., 1440, XXII, 90.
 — *pulchella* Fuck., 527, XV, 199; 1442, XXII, 91.
Phacidium congener Ces., 629, XVI, 69.
 — *coronatum* Fries, 209, XII, 80.
 — *infestans* Karst., 1923, XXVI, 160.
 — *litigiosum* Rob., 629, XVI, 69.
 — *Phoenicis* Moug., 907, XIX, 381.

- Phacidium Pini* Fries, 1924, XXVI, 160.
 — *Ranunculi* Lib., 629, XVI, 69.
 — *repandum* Fries, 961, XIX, 394.
 — *Rubi* Fries, 819, XVIII, 354.
Phacotium chrysocephalum S. Gray, 551, XV, 206.
Pharcidia epipolytrapa Arn., 970, XIX, 396.
Phascum crispum Hedw., 1376, XXI, 223.
 — *curvicollum* Ehrh., 198, XI, 101.
 — *cuspidatum* Schreb., 287, XII, 96; 1376, XXI, 223.
 — *rostellatum* Brid., 1070, XIX, 423.
Phelonitis strobilina Fries, 934, XIX, 389.
Phialea acuum Rehm, 1442, XXII, 90.
 — *bolaris* Boud., 203, XII, 76.
 — *citrina* Gill., 205, XII, 78.
 — *cyathoidea* Gill., 1170, XX, 18.
 — *dumorum* Rehm, 1614, XXIII, 216.
 — *fusca* Gill., 1926, XXVI, 160.
 — *glanduliformis* Sacc., 1321, XXI, 208.
 — *grisella* Rehm, 1443, XXII, 91.
 — *Persoonii* Gill., 628, XVI, 69.
 — *pulchella* Sacc., 527, XV, 199; 1442, XXII, 91.
 — *scutula* Gill., 528, XV, 199.
 — *Solani* Sacc., 1170, XX, 18.
 — *tenera* Sacc., 1728, XXV, 233.
Phialopsis rubra Kbr., 53, IX, 132.
 — *ulmi* Arn., 53, IX, 132; 53 b, XXIV, 287.
Philonotis alpicola Jur., 1887, XXV, 249.
 — *calcarea* Schimp., 1886, XXV, 249.
 — *fontana* Brid., 298, XII, 97; 1887, XXV, 249.
 — *Osterwaldi* Warnst., 1888, XXV, 250.
 — *tomentella* Moll., 1887, XXV, 249.
 — *Vescoana* Paris, 1796, XXIV, 291.
Philonotula Vescoana Besch., 1796, XXIV, 291.
Phlebia merismoides Fries, 1714, XXIV, 272.
Phleospora maculans Allesch., 985, XIX, 399; 985b, XXV, 233.
 — *Mori* Sacc., 985, XIX, 399.
 — *oxyacantha* Wallr., 1470, XXII, 96.
 — *Ulmi* Wallr., 414, XV, 172; 414b, XXIII, 219.
Phlyctaena Magnusiana Bres., 834, XVIII, 357.
Phlyctidium Ranunculi Wallr., 629, XVI, 69.
Phlyctis agelaea Körb., 669, XVI, 84.
Phoma anaxea Speg., 1458, XXII, 93.
 — *anethicola* Allesch., 978, XIX, 397.
 — *concentrica* Desm., 1176, XX, 19.
 — *demissa* Sacc., 1173, XX, 19.
 — *Diplodiella* Speg., 981, XIX, 398.
 — *herbarum* Westd. var. *anethi* Westd., 978, XIX, 397.
Phoma Lingam Desm., 1171, XX, 18.
 — — — f. *Linariae* Sacc., 1171, XX, 18.
 — *melaena* Preuss., 1172, XX, 19.
Phoma Meliloti All., 1931, XXVI, 161.
 — *minutella* Sacc. et Penz., 1931, XXVI, 161.
 — *protracta* Sacc., 1455, XXII, 93.
 — *pterophila* Fuck., 1326, XXI, 209.
 — *pustula* Fries, 1155, XX, 15.
 — *rubiginosa* P. Brun., 1932, XXVI, 162.
 — — — var. *major* Sydow, 1932, XXVI, 162.
 — *saligna* Fries, 1156, XX, 15.
 — *samararum* Desm., 1336, XXI, 209.
 — *strobilinum* Sacc., 1335, XXI, 211.
 — *Urticae* Schulz, 829, XVIII, 356.
Phormidium ambiguum Gom., 1507, XXII, 103.
 — *amoenum* β. *compactum* Kütz., 429, XV, 177.
 — — — var. *α. infusionum* 423, XV, 174.
 — *autumnale* Gom., 424, XV, 175; 855, XVIII, 363; 855 b, XXI, 217; 855 c, XXIV, 283.
 — *cataractarum* Rabenh., 423, XV, 174.
 — *corium* Gom., 423, XV, 174; 426, XV, 176.
 — *Joannianum* Kütz., 424, XV, 174.
 — *laminosum* Gom., 1947, XXVI, 166.
 — *membranaceum* Kütz., 426, XV, 176.
 — *papyraceum* Gom. f. *lutescens* Stockm., 427, XV, 176.
 — *Retzii* Gom., 425, XV, 175.
 — *smaragdinum* Kütz., 428, XV, 176.
 — *subfuscum* Gom., 424 b, XXVI, 168.
 — — Kütz., 1344, XXI, 215.
 — — — var. *α*, 424, XV, 174.
 — — — var. *Joanianum* 425, XV, 175; 426, XV, 176.
 — *tinctorium* Kütz., 1946, XXVI, 166.
Phragmidium incrassatum α. *Rosarum* Karst., 708, XVII, 259.
 — — Link, 105, XI, 82.
 — *mucronatum* Cooke, 708, XVII, 259.
 — *oblongum* Bonord., 708, XVII, 259.
 — *Potentillae* Karst., 103, XI, 81.
 — *Rosarum* Fuck., 708, XVII, 259.
 — *Rubi idaei* Karst., 106, XI, 82.
 — — Winter, 105, XI, 82.
 — *Sanguisorbae* Schröt., 102, XI, 81.
 — *subcorticium* Bub., 708, XVII, 259.
 — — Plowright, 708, XVII, 259.
 — *violaceum* Winter, 104, XI, 82.
Phyalea acuum Rehm, 527, XV, 199.
Phycastrum brachiatum Perty, 854, XVIII, 363.
 — *paradoxum* Kütz., 739, XVII, 267.
 — *Ralfsii* Kütz., 854, XVIII, 363.
 — *tumidum* Kütz., 853, XVIII, 363.
Phycocelis aecidioides Kuckuck, 545, XV, 203.
Phyllachora Aegopodii Fuck., 1158, XX, 16.
 — *betulina* Fuck., 1159, XX, 16.
 — *Campanulae* Fuck., 1174, XX, 19.
 — *Crotonis* Sacc., 625, XVI, 68.
 — *dolichogena* Sacc., 1318, XXI, 208.
 — *graminis* Fuck., 519, XV, 196.
 — *Iunci* Fuck., 1317, XXI, 208.

- Phyllachora Podagrariae* Karst., 1158, XX, 15.
- *Pteridis* Fuck., 626, XVI, 68.
- *punctiformis* Fuck., 961, XIX, 394; 1457, XXII, 93.
- *Trifolii* Sacc., 1438, XXII, 90.
- *Ulmi* Fuck., 414, XV, 172; 1319, XXI, 208.
- Phyllactidium pulchellum* Kütz., 856, XVIII, 364.
- Phyllactinia guttata* Lev., 120, XI, 85.
- *suffulta* Sacc., 120, XI, 85.
- Phyllophora nervosa* Grev., 1220, XX, 28.
- Phylloporina epiphylla* Müll. Arg., 1524, XXII, 108.
- Phyllosticta Atriplicis* Desm., 1454, XXII, 93.
- *Berberidis* Rabenh., 1452, XXII, 92.
- *Caricis* Sacc., 410, XV, 171.
- *cruenta* Kickx, 411, XV, 171.
- *grossulariae* Sacc., 1329, XXI, 210.
- *hedericola* Dur. et Mont., 1324, XXI, 209.
- *ilicicola* Pass., 1325, XXI, 209.
- *iliciseda* Sacc., 1325, XXI, 209.
- *latemarensis* Kab. et Bub., 1933, XXVI, 162.
- *mercurialis* Desm., 725, XVII, 263.
- *nuptialis* Thüm., 1453, XXII, 92.
- *prunicola* Sacc., 977, XIX, 397.
- *sabalicola* Szabo, 828, XVIII, 356.
- *sorghina* Sacc., 976, XIX, 397.
- *Vossii* Thüm., 835, XVIII, 357.
- Physactis aggregata* Kütz., 748, XVII, 271.
- *durissima* Kütz., 748, XVII, 271.
- *pilifera* β . *fuscescens* Kütz., 747, XVII, 270.
- *pulchra* Cramer, 747, XVII, 270.
- Physarum leucophaeum* Fries, 938, XIX, 389.
- *striatum* Fuck., 938, XIX, 390.
- Physcia ascendens* Bitt., 880, XVIII, 372.
- *calloisma* Mass., 1256, XX, 39.
- *chrysophthalma* DC., 157, XI, 92.
- *cirrochroa* Arn., 1257, XX, 39.
- *controversa* β . *fulva* Krph., 1780, XXIV, 287.
- *farrea* f. *pityrea* Wainio, 1980, XXVI, 178.
- *granulosa* Arn., 1056, XIX, 420.
- *grisea* A. Zahlbr., 1980, XXVI, 177.
- *medians* Arn., 1055, XIX, 420.
- *obscura* var. *chloantha* Nyl., 577, XV, 210.
- *parietina* de Not., 1057, XIX, 420.
- — var. *ectanea* Nyl., 1559, XXII, 116.
- — var. *imbricata* Mass., 1979, XXVI, 177.
- — α . *platyphylla* Körb., 1057, XIX, 421.
- *pityrea* Lam., 1980, XXVI, 178.
- *pulveracea* Wainio, 1980, XXVI, 178.
- — Nyl. var. *angustata* (Hoffm.) Nyl., 1670, XXIII, 230.
- *pulverulenta* Nyl. var. *argyphaea* (Ach.) Nyl., 670, XXIII, 230.
- — var. *grisea* Rabh., 1980, XXVI, 178.
- — subsp. *pityrea* Brid., 1980, XXVI, 178.
- — var. *pityrea* Nyl., 1980, XXVI, 178.
- Physcia pulverulenta* Nyl., var. *superfusa* A. Zahlbr., 1670, XXIII, 230.
- *ragusana* A. Zahlbr., 1370, XXI, 222.
- *stellaris* Nyl., 1260, XX, 40.
- — α . *adpressa* Th. Fries, 1260, XX, 40.
- *tenella* Nyl., 248, XII, 89.
- Physcomitrium eurystomum* Sendt., 199, XI, 101.
- *pyriforme* Brid., 294, XII, 97.
- Physidrum Uvarium* Delle Chiaje, 1847, XXV, 236.
- Physoderma Eleocharidis* Schröt., 1940, XXVI, 164.
- *Schroeteri* Krieger, 1940, XXVI, 164.
- Phytoconis purpurea* 343, XIII, 458.
- Piggotia fraxini* Berk. et Curt., 1475, XXII, 97.
- Pileolaria Terebinthi* Cast., 108, XX, 3.
- Pilocarpon lecanorinum* A. Zahlbr., 1529, XXII, 109.
- *leucoblepharum* Wainio, 865, XVIII, 366; 865 b, XXIII, 231.
- Pilotrichum reclinatum* C. Müll., 1795, XXIV, 290.
- *tumidum* Brid., 1596, XXII, 122.
- Pinnatella Kühliana* Fleisch., 1700, XXIII, 235.
- Pinnularia radiosa* Rabenh., 1507, XXII, 103.
- Pisolithus arenarius* Alb. et Schw., 1717, XXIV, 273.
- Pithya suecia* Fuck., 1168, XX, 18.
- Pitophora pachyderma* Schmidle, 733, XVII, 266.
- Pitya vulgaris* Fuck., 1731, XXIV, 276.
- Placidium cartilagineum* Mass., 1645, XXIII, 223.
- *hepaticum* Arn., 466, XV, 186.
- Placodes fomentarius* Quel., 310, XIII, 445.
- Placodium Agardhianum* Hepp, 879, XVIII, 871.
- *callopismum* Mérat, 1256, XX, 39.
- *chrysoleucum* Kbr., 48, IX, 131.
- *cirrochroum* Hepp, 1257, XX, 39.
- *configuratum* Arn., 567, XV, 209.
- *coralloides* Tuckerm., 1558, XXII, 116.
- *ferrugineum* var. *percrocatum* Wainio, 465, XV, 186.
- — γ . *Pollinii* Hepp, 1557, XXII, 115.
- *fulgidum* Nyl., 1978, XXVI, 177.
- *Garovaglii* Körb., 566, XV, 208.
- *gilvum* var. *stillicidiorum* Wainio, 575, XV, 210.
- *granulosum* Hepp, 1056, XIX, 420.
- *Lamarckii* Müll. Arg., 1549, XXII, 114.
- *luteoalbum* * *Personianum* Hepp, 251, XII, 90.
- *medians* Nyl., 1055, XIX, 420.
- *variabile* f. *albopruinosa* W., 879, XVIII, 371.
- *vitellinum* Wainio, 1779, XXIV, 287.
- Placolecania candicans* A. Zahlbr., 1364, XXI, 220.

- Placosphaeria Bartsiae* Mass., 1621, XXIII, 217.
 — *Campanulae* Bäuml., 1174, XX, 19.
 — *Onobrychidis* Sacc. var. *anaxea* Keissl., 1458, XXII, 93.
 — — var. *exappendiculata* Br., 1458, XXII, 93.
 — *punctiformis* Sacc., 1457, XXII, 93.
 — *rhytismoides* Allesch., 412, XV, 171.
 — *Sedi* Sacc., 831, XVIII, 357.
Plagiobryum demissum Lindb., 1583, XXII, 120.
 — *Zierii* Lindb., 1089, XIX, 426.
Plagiochila asplenioides Dum., 92, IX, 141; 1569, XXII, 118.
 — *interrupta* Dum., 1882, XXV, 249.
 — *spathulaefolia* Mitt., 695, XVI, 89.
 — *Ungarangana* Sande Lac., 774, XVII, 277.
Plagiothecium Roseanum Bryol. europ., 1788, XXIV, 289.
 — *silvaticum* Bryol. europ., 1388, XXI, 225.
 — *undulatum* Bryol. europ., 898, XVIII, 374; 898 b, XX, 47.
Plasmodiophora Alni Möll., 1740, XXIV, 278.
 — *Elaeagni* Schröt., 1740, XXIV, 278.
Plasmopara densa Rabenh., 1828, XXV, 229.
 — *nivea* Schröt., 605, XVI, 64.
 — *viticola* Berl. et De Toni, 113, XI, 84.
Platygramma elaborata Leight., 377, XIII, 467.
Platygrapha californica Nyl., 1859, XXV, 240.
 — *hypothallina* A. Zahlbr., 1528, XXII, 109; 1528 b, XXVI, 179.
 — *pinguis* Tuckerm., 1528 b, XXVI, 179.
 — *plurilocularis* A. Zahlbr., 1953, XXVI, 69.
Platygyrium repens Bruch., 599, XV, 214.
Platysma ampicatum Nyl., 463, XV, 185.
 — *aquaticum* Hoffm., 652, XVI, 81.
 — *ciliare* Nyl., 1247, XX, 37.
 — *cucullatum* Hoffm., 872, XVIII, 368.
 — *fraxineum* Hoffm., 1665, XXIII, 229.
 — *glaucum* Nyl., 1366, XXI, 221.
 — — f. *sorediosum* Leight., 1366, XXI, 221.
 — *juniperinum* Nyl., 873, XVIII, 368.
 — *Mülleri* Nyl., 877, XVIII, 371.
 — *nivale* Nyl., 871, XVIII, 368.
 — *pinastri* Nyl., 874, XVIII, 369.
 — *saepincola* Hoffm., 870, XVIII, 368.
 — — f. *chlorophyllum* Arn., 1246, XX, 37.
 — — var. *ulophyllum* Nyl., 1246, XX, 37.
 — *ulophyllum* Nyl., 1246, XX, 37.
Pleonectria Lamyi Sacc., 822, XVIII, 355.
Pleoneidium flavum b. *chlorophana* Körb., 45, IX, 130.
Pleosphaerulina Briosiana Poll., 1816, XXV, 226.
Pleospora Bardanae Niessl, 1609, XXIII, 215.
 — *Gnaphalii* Westd., 508, XV, 194.
Pleospora Libanotis Fuck., 971, XIX, 396.
 — *Millefolii* Fuck., 972, XIX, 397.
 — *Nardi* Fuck., 622, XVI, 67.
Pleurenterium tumidum Wille, 853, XVIII, 362.
Pleurococcus miniatus Näg., 1346, XXI, 215.
Plocaria confervoides Mont., 547, XV, 204.
Podosphaeria Castagnei De Bary, 119, XI, 85.
 — *Epilobii* De Bary, 1310, XXI, 206.
 — *Kunzei* Lév., 117, XI, 84; 118, XI, 84.
 — *myrtilina* Kunze, 117, XI, 84.
 — *tridactyla* De Bary, 118, XI, 84.
Poetschia arthonioides Stein., 266, XII, 93.
Pogonatum aloides P. d. B., 591, XV, 213.
Pogotrichum filiforme Reineke, 546, XV, 204.
 — *Graeffeanum* Jäg., 1798, XXIV, 291.
 — *nanum* P. d. B., 590, XV, 213.
 — *urnigerum* P. d. B., 1890, XXV, 250.
Pohlia elongata Hedw., 585, XV, 212.
Polyblastia sepulta Mass., 578, XV, 211.
 — *theleodes* Th. Fr. f. *inundata* 579, XV, 211.
Polyblastiopsis fallaciosa (Arn.) A. Zahlbr., 1646, XXIII, 224.
 — *meridionalis* A. Zahlbr., 1646, XXIII, 223.
 — *sericea* (Mass.) A. Zahlbr., 1646, XXIII, 224.
Polycauliona Bolanderi Hue, 1870, XXV, 243.
Polycystis aeruginosa Kütz., 226, XII, 83; 1517, XXII, 106.
 — *Colchici* Strauss, 906, XIX, 380.
 — (*Clathrocystis*) *insignis* G. Beck, 227, XII, 83.
Polydesmia pruinosa Boud., 723, XVII, 263.
Polyporus abietinus Fries, 316, XIII, 446.
 — *adustus* Fries, 308, XIII, 445; 308 b, XVI, 70.
 — (*Pleuropus*) *affinis* Nees, 1421, XXII, 86.
 — *applanatus* Wallr., 940, XIX, 390.
 — *Barrelieri* Viv., 307, XIII, 444.
 — *ferruginosus* Fries, 944, XIX, 390.
 — *fomentarius* Fries, 310, XIII, 445.
 — *frondosus* Fries, 307, XIII, 444.
 — *giganteus* Fries, 1144, XX, 13.
 — *hispidus* Fries, 309, XIII, 445.
 — *imbricatus* E. Fries, 609, XVI, 65.
 — *megaloma* Lév., 1143, XX, 13.
 — *obliquus* Fries, 1603, XXIII, 214.
 — *odoratus* Fries, 311, XIII, 445.
 — *perennis* E. Fries, 666, XVI, 65.
 — *purpurascens* Pers., 1142, XX, 13.
 — *sulphureus* Fries, 945 a, b, XIX, 390; 945 c, XXVI, 164.
 — *Todari* Inzenga, 945, XIX, 391.
Polysaccum Pisocarpium Fries, 1717, XXIV, 273.
Polysiphium urceolatum (Light.) Grev., 544, XV, 203.
Polystictus abietinus Cooke, 316, XIII, 446.

- Polystictus affinis* Sacc., 1421, XXII, 86.
 — *carneo-nigra* Berk., 1907, XXVI, 157.
 — *microcoloma* Lév., 1907, XXVI, 157.
 — *perennis* E. Fries, 606, XVI, 65.
Polystomella sordidula Rac., 1720, XVIII, 173.
Polytrichum affine Funk, 592, XV, 213.
 — *aloides* Hedw., 591, XV, 213.
 — *commune* L., 791, XVII, 279.
 — *decipiens* Limpr., 677, XVI, 86.
 — *Graeffeanum* C. Müll., 1798, XXIV, 291.
 — *juniperinum* W., 790, XVII, 279.
 — *nanum* var. β . Weiss, 590, XV, 213.
 — *ohioense* Ren. et Card., 677, XVI, 86.
 — *pumilum* Sw., 590, XV, 213.
 — *strictum* Banks, 592, XV, 213; 592b, XVIII, 281.
 — — Menz., 592b, XX, 48.
 — *urnigerum* L., 1890, XXV, 250.
Poria ferruginosa Sacc., 944, XIX, 390.
 — *obliqua* Quel., 1603, XXIII, 214.
Porina americana var. *epiphylla* Fee, 1524, XXII, 108.
 — *epiphylla* Fee, 1524, XXII, 108.
 — *faginea* Arn., 180, XI, 98.
 — *muscorum* Mass., 180, XI, 98.
 — *tenebrosa* Mass., 180, XI, 98.
Porotrichum Kühlianum v. d. B. et Lac., 1700, XXIII, 235.
Porphyridium cruentum Näg., 343, XIII, 458.
 — *Schinzii* Schmiedle, 849, XVIII, 361.
Pottia cavifolia Ehrh., 291, XII, 97.
 — *intermedia* (Turn.) Fühnr., 1376, XXI, 223.
 — *lanceolata* C. Müll., 1988, XXVI, 180.
 — *truncatula* (L.) Lindb., 881, XVIII, 372; 1371, XXI, 223.
Pragmopora amphibola Mass., 818, XVIII, 354.
Pragmospora Epilobii Magn., 1133, XX, 10.
Prasiola fluviatilis Aresch., 83b, XXIII, 222.
 — — var. *Hausmanni* Aresch., 83, IX, 139.
 — *Sauteri* Menegh., 83, IX, 139.
Preissia commutata Nees, 381, XIII, 469.
 — *quadrata* Bern., 381, XIII, 469; 381, XV, 215.
Prionolobus Turneri Spruce, 698, XVI, 89.
Propolis ocellata Sacc., 1925, XXVI, 160.
Prosthegium ellipso sporum Fries, 513, XV, 195.
Protococcus miniatus Kütz., 1346, XXI, 215.
Protomyces Ari Cooke, 1136, XX, 11.
 — *filicinus* Niessl, 936, XIX, 389.
 — *Stellariae* Fuck., 603, XVI, 64.
Psalliota campestris Sacc., 1606, XXIII, 214.
Pseudocyphellaria aurata Wainio, 1861, XXV, 241.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc., 723, XVII, 263.
Pseudoevern timeria isidiophora Zopf, 876, XVIII, 369.
 — *oliveforina* Zopf, 1046, XIX, 418.
Pseudoleske aprionophylla Bryol. Jav., 1400, XXI, 226.
Pseudopeziza Bistorta Fuck., 1165, XX, 17.
 — *petiolaris* Bond., 1726, XXIV, 275.
 — *Ranunculi* Fuck., 629, XVI, 69.
 — *repanda* Karst., 691, XIX, 394; 1457, XXII, 93.
 — *Trifolii* Fuck., 1438, XXII, 90.
Pseudoplectania nigrella Fuck., 1732, XXIV, 276.
Pseudovalsa Stilbospora Auersw., 513, XV, 195.
 — *platanoides* Wint., 624, XVI, 68.
 — *macrosperma* Sacc., 513, XV, 195.
Psora decipiens Hoffm., 1767, XXIV, 284.
 — *nebulosa* Hoffm., 1543, XXII, 112.
 — *opaca* Mass., 55, IX, 133.
 — *ostreata* var. *athrocarpa* Anzi, 1533, XXII, 110.
 — — var. β . *myrmecina* Th. Fr., 1533, XXII, 110.
Psoroma fulgens Mass., 668, XVI, 84.
 — *Lagasciae* Körb., 1549, XXII, 114.
 — *Lamarckii* Mass., 1549, XXII, 114.
 — *lentigerum* Th. Fr., 162, XI, 94.
Psorotrichia myriospora A. Zahlbr., 1036, XIX, 415.
 — *Schaereri* Arn., 455, XV, 184.
Pterobryum vitianum Mitt., 1597, XXII, 122.
Pterogonium gracile Schwatz, 796, XVII, 280.
 — *heterophorum* Bruch, 678, XVI, 86.
 — *longifolium* Schleich., 1282, XX, 44.
 — *octoblepharis* Schleich., 1892, XXV, 250.
Pterygoneurum cavifolium Jur., 291, XII, 97; 291b, XXIII, 235.
 — *sessile* Jur., 292, XII, 97; 292b, XVIII, 375.
Pterygophyllum lucens Brid., 1891, XXV, 250.
Pterygynandrum repens Brid., 599, XV, 214.
Ptilidium ciliare Nees, 478, XV, 189; 1065, XIX, 422.
 — — β . *Wallrothianum* Nees, 478, XV, 189.
Puccinella graminis Fuck., 909, XIX, 381.
Puccinia Acerum Link, 1126, XX, 8.
 — *Acroptili* Sydow, 933, XIX, 388.
 — *Adoxae* Hedw., 1120, XX, 6.
 — *aculeata* Schwein., 1414, XXII, 85.
 — *Aegopodii* Link, 1304, XXI, 205.
 — — Mart., 1304, XXI, 205.
 — *Agropyri* Ell. et Ev., 1705, XXIV, 270.
 — *albescens* Grev., 1120, XX, 6.
 — *americana* Lagerh., 1412, XXII, 84.
 — *Andropogonis* Schwein., 1412, XXII, 84.
 — *Anemones* Pers., 918, XIX, 384.
 — — var. *Betonicae* Alb. et Schwein., 1413, XXII, 84.

- Puccinia anomala* Rostr., 1128, XX, 9.
 — *Anthuscia* Thüm., 1121, XX, 7.
 — *Arenariae* Wint., 40, IX, 130.
 — *argentata* Wint., 33, IX, 128; 33, XVII, 265; 1120, XX, 6.
 — *arundinacea* Hedw., 30, IX, 128.
 — — var. *Maydis* Cast., 1123, XX, 7.
 — — var. *obtusata* Oth., 927, XIX, 386.
 — — var. *Phalaridis* Oth., 927, XIX, 386.
 — *Asari* Link, 810, XVIII, 352.
 — *asarina* Kunze, 810, XVIII, 352.
 — *Asparagi* DC., 24, IX, 127; 24b, XXI, 212.
 — *aspersa* Bonord., 918, XIX, 384.
 — *Asphodelii* Duby, 706, XVII, 258.
 — *Athamanthae* Lindroth, 931, XIX, 388.
 — *Atragenes* Hausm., 1703, XXIV, 270.
 — *Bäumleri* Lagerh., 1129, XX, 9.
 — *Bäumleriana* Bubak, 1706, XXIV, 270.
 — *Bardanae* Cord., 1406, XXII, 82.
 — — Fuck., 1406, XXII, 82.
 — *Baryi* Wint., 1124, XX, 8.
 — *Betonicae* DC., 39, IX, 129; 1413, XXII, 84.
 — — Schröt., 925, XIX, 386.
 — *Bornmülleri* Magn., 704, XVII, 258.
 — *Brachypodii* Oth., 1124, XX, 8.
 — *buharica* Jaczewski, 1416, XXII, 85.
 — *bullaria* Link, 31, IX, 128.
 — *bullata* Aut. plurim., 929, XIX, 387.
 — — Link, 1126, XX, 8.
 — — Wint., 31, IX, 128.
 — *carduorum* Jacky, 924, XIX, 385.
 — *caricina* DC., 1411, XXII, 84.
 — *caricis* Rebent., 1411, XXII, 84.
 — *carniolica* Voss, 807, XVIII, 351.
 — *caulincola* Wint., 919, XIX, 384.
 — *Centaurea* Magn., 933, XIX, 388.
 — *cervariae* Lindr., 931, XIX, 388.
 — *Cesatii* Schröter, 36, IX, 129.
 — *Chaeropylli* Purton, 1121, XX, 6.
 — *Chlorocrepidis* Jack., 1704, XXIV, 270.
 — *Chrysanthemi* Rose, 932, XIX, 388.
 — — Rose, 1138, XX, 12.
 — *cincta* Bonord., 917, XIX, 384; 1413, XXII, 84.
 — *Cirsii* Lasch. f. *Echinopsis* Pass., 922, XIX, 385.
 — — Magn., 933, XIX, 388.
 — *clavuligera* Wallr., 915, XIX, 383.
 — *Clematidis* Lagerh., 1705, XXIV, 270.
 — *Conii* Fuck., 929, XIX, 387.
 — *Convallariae* Lagerh., 1122, XX, 7.
 — — *Digraphidis* Kleb., 1122, XX, 7.
 — *Convolvuli* Cast., 1119, XX, 6.
 — *coronata* Corda, 29, IX, 128; 29, XV, 173.
 — — Wint., 702, XVII, 258.
 — *coronifera* Kleb., 702, XVII, 257.
 — *crassivertex* Thüm., 915, XIX, 383.
 — *Puccinia densa* Dietel et Holway, 1409, XXII, 83.
 — *Dentariae* Fuck., 921, XIX, 385.
 — *Desvauxii* Vuill., 811, XVIII, 352.
 — *Digraphidis* Soppith, 1122, XX, 7.
 — *Echinopsis* DC., 922, XIX, 385.
 — — Hazsl., 922, XIX, 385.
 — *Epilobii* Corda, 923, XIX, 385.
 — — DC., 1405, XXII, 82.
 — — *tetragoni* 923, XIX, 385; 1405, XXII, 82.
 — *Eremuri* Komarow, 813, XVIII, 352.
 — *Falcaria* Fuck., 916, XIX, 383.
 — *fergussoni* B. et Br. var. *hastatae* De Toni, 1409, XXII, 83.
 — *flosculosum* Wint., 924, XIX, 385.
 — *fuckelii* Koernike, 809, XVIII, 351.
 — *fusca* Wallr., 921, XIX, 385.
 — — Wint., 918, XIX, 384.
 — — Wallr. var. *Ranunculacearum* Wallr., 918, XIX, 384.
 — *Gentianae* Link, 1118, XX, 5.
 — — var. *altaica* Pat., 1118, XX, 6.
 — — var. *songarensis* Pat., 1118, XX, 6.
 — *Geranii* Fuck., 703, XVIII, 258.
 — — Lev., 809, XVIII, 351.
 — — *silvatici* Karst., 809, XVIII, 351.
 — — — var. *nepallensis* Bard., 809, XVIII, 351.
 — *Glechomatis* DC., 803, XVIII, 350.
 — — Sacc., 804, XVIII, 350.
 — *Glycyrrhizae* Rabenh., 1111, XX, 3.
 — *graminis* Pers., 28, IX, 127.
 — — c. *foliorum* β . *Stipae* Opiz, 919, XIX, 384.
 — *granulata* de Bary, 1126, XX, 8.
 — *grossulariae* Wint., 1126, XX, 8.
 — *hastata* Cooke, 1409, XXII, 83.
 — *Hausmanni* Niessl, 1703, XXIV, 270.
 — *Hedysari obscurii* DC., 1903, XXVI, 156.
 — *Heliantharum* Schwein., 1407, XXII, 83.
 — *Helianthi* Schein, 1407, XXII, 83; 1407, XXIV, 279.
 — *Hieracii* Schröt., 924, XIX, 386.
 — *Hydrocotyles* Cooke, 806, XVIII, 350.
 — *Hysterium* Rohl, 917, XIX, 384.
 — *incarcerata* Lév., 11, IX, 123.
 — *inquinans* Wallr., 1413, XXII, 84.
 — — — var. *Athamanthae* Wallr., 931, XIX, 388.
 — — — var. *Bardanae* Wallr., 1406, XXII, 82.
 — — — var. *Gentianarum* Wallr., 1118, XX, 6.
 — — Wallr. var. *Stachydis* Wallr., 914, XIX, 383.
 — — — var. *Tragopogonis* Wallr., 917, XIX, 384.
 — *intermixta* H. Friend., 1122, XX, 7.
 — *Iridis* Wallr., 915, XIX, 383.
 — *Junci* Desm., 35, XIII, 449.
 — *Laburni* DC., 1107, XX, 3.

- Puccinia Lappae* Cast., 1406, XXII, 82.
 — *Lespedezae polystachyae* Schw., 1902, XXVI, 155.
 — — *procumbentis* Schw., 1902, XXVI, 155.
 — *Leveilleana* De Toni, 809, XVIII, 351.
 — *Leveillei* Mont., 809, XVIII, 351.
 — *Liliacearum* Duby, 38, IX, 129.
lineolata Dem., 910, XIX, 382.
Lojkaiana Thüm., 1127, XX, 8.
Lolii Nielsen, 702, XVII, 257.
Luzulae Lib., 812, XVIII, 352.
 — *Lychnidearum* 40, IX, 130.
Lycii Kalchbr., 802, XVIII, 350.
 — Magn., 802, XVIII, 350.
maculosa Körn., 1408, XXII, 83.
 — *magnusiana* Körn., 1305, XXI, 205.
 — *Majanthae* Arth. et H., 1122, XX, 7.
Malvacearum Mont., 1410, XXII, 83.
 — *Maydis* Carrad., 1123, XX, 7.
 — Bereng., 1123, XX, 7.
Melanogramma Unger, 905, XIX, 380.
 — *Menthae* Pers. var. *americana* Burr, 1303, XXI, 205.
mixta Fuck., 26, IX, 127.
Morthieri Körn., 703, XVII, 258.
mucronata Schum., 798, XVII, 259.
 — *α. Rosae* Pers., 708, XVII, 259.
 — *β. Rubi* Pers., 105, XI, 82.
Nolitangeris Corda, 33, IX, 128.
oblongata Wint., 812, XVIII, 352.
obtusa Schröt., 25, IX, 127; 25, XVII, 265.
obtusata E. Fisch., 927, XIX, 386.
obtegens Fuck., 1130, XX, 9.
 — Tul., 1130, XX, 9.
Oreoselini Fuck., 808, XVIII, 351.
 — Körn., 808, XVIII, 351.
Ornithogali Hazsl., 1127, XX, 9.
Paridi-Digraphidis Kleb., 1122, XX, 7.
Paridis Plowright, 1122, XX, 7.
Passerinii Schröt., 811, XVIII, 352.
Peucedani Körn., 808, XVIII, 351.
Phaseoli trilobi Schw., 13, IX, 125.
Phlomidis Thüm., 928, XIX, 386.
Phragmitis Körn., 30, IX, 128.
 — Tul., 1305, XXI, 205; 1415, XXII, 85.
Pimpinellae Link, 27, IX, 127.
 — Ant. p. p., 1121, XX, 7.
poculiformis Wettst., 28, IX, 127.
Podophylli Schw., 1414, XXII, 85.
Podospermi I. Kunze, 1125, XX, 8.
 — DC., 1125, XX, 8.
Polygoni Alb. et Schw., 32, IX, 128.
 — *amphibii* Pers., 32, IX, 128; 32, XV, 173.
 — *convulvuli* DC., 32, IX, 128.
Polygonorum Schlecht., 32, IX, 128.
Porri Wint., 26, IX, 127.
Prenanthis Aut. p. p., 1408, XXII, 83.
 — — *purpureae* Lindr., 1408, XXII, 83.
Puccinia tenuifolia Ces., 1408, XXII, 83.
 — *Primulae* Duby, 913, XIX, 382.
 — *Pruni spinosa* Pers., 34, IX, 129; 34, XVIII, 359.
 — — (Pers.) Winter, 34 b, XVII, 265.
 — Schröt., 34, IX, 129.
Prunorum Link, 34, IX, 129.
pulchella Pech., 1126, XX, 8.
pulverulenta Grev., 923, XIX, 385.
 — *punctata* Bonord., 1406, XXII, 82.
 — *reticulata* de Bary, 1121, XX, 7.
 — *retifera* Lindr., 805, XVIII, 350.
 — *Ribis* DC., 1126, XX, 8.
 — *rubigovera* (DC.) var. *simplex* Aut., 1128, XX, 9.
 — *Rubi idaei* DC., 106, XI, 82.
 — *Salviae* Unger, 804, XVIII, 350.
 — *glutinosae* Ces., 804, XVIII, 350.
Sanguisorbae DC., 102, XI, 81.
Scirpi DC., 35, IX, 129; 35, XIX, 402.
semireticulata Fuck., 809, XVIII, 351.
 — *sessilis* Schw., 1122, XX, 7.
 — *Sii falcariae* Schröt., 916, XIX, 383.
 — *simplex* Eriks. et Henn., 1128, XX, 9.
 — *singularis* P. Magn., 1129, XX, 9.
 — *smilacearum-digraphidis* Kleb., 1122, XX, 7.
 — *Sorghii* Schwein., 1123, XX, 8.
 — *sparsa* Cooke, 917, XIX, 384.
 — *Stachydis* DC., 914, XIX, 383.
 — Pass., 914, XIX, 383.
Stipae Hora, 919, XIX, 384.
 (Thymi) *Stipae* Kleb., 919, XIX, 384.
 (Salviae) *Stipae* Kleb., 919, XIX, 384.
 — *straminis* Fuck. var. *simplex* Körn., 1128, XX, 9.
striola Schlecht., 30, IX, 128.
 — Link, 1411, XXII, 84.
 — *suaveolens* Rostr., 1130, XX, 9.
Succisae Kunze et Schmidt, 920, XIX, 384.
 — *tenuistipes* Opiz, 923, XIX, 385.
 — *Thlaspeos* Duby, 926, XIX, 386.
 — Schubert, 926, XIX, 386.
 — Vuill., 926, XIX, 386.
 — *Thwaitesii* Berk., 1904, XXVI, 156.
 — var. *novoguineensis* P. Henn., 1904, XXVI, 156.
Thysai Karst., 919, XIX, 384.
Trabutii Roum. et Sacc., 927, XIX, 386.
Tragopogi Corda, 917, XIX, 383.
Tragopogonis Fuck., 917, XIX, 384.
Trailii Plowright, 1415, XXII, 85.
trechispora Pass., 1127, XX, 9.
truncata B. et Br., 915, XIX, 383.
turgida Sydow, 802, XVIII, 350.
Umbelliferarum DC., 1121, XX, 7.
 — var. *Selini Cervariae* DC., 931, XIX, 388.
 — var. *Selini Oreoselini* DC., 808, XVIII, 351.
Veratri Niessl, 37, IX, 129.

- Puccinia Veronicarum* DC., 930, XIX, 387.
 — — Fuck., 930, XIX, 387.
 — — *f. fragilipes* Körn., 930, XIX, 387.
 — — *f. persistens* Körn., 930, XIX, 387.
 — — *verrucosa* Link, 803, XVIII, 350.
 — — Wint., 804, XVIII, 350.
 — — *violacea* Schultz, 104, XI, 82.
 — — DC., 1409, XXII, 83.
 — — *Violarum* Link, 1409, XXII, 83.
 — — *Virgaureae* Lib., 920, XIX, 384.
 — — *Vossii* Körnicke, 914, XIX, 383; 925, XIX, 386; 1413, XXII, 84.
 — — *Vuillemini* De Toni, 926, XIX, 386.
 — — *Zae* Bereng., 1123, XX, 7.
 — — Desm., 1123, XX, 8.
Pucciniastrum Abieti-Chamaenerii Kleb., 1133, XX, 10.
 — — *areolatum* Oth., 934, XIX, 388.
 — — *Aspidiotus* Dietel 1134, XX, 11.
 — — *Cirsii* Spegazz., 705, XVII, 258.
 — — *Epilobii* Oth., 1133, XX, 10.
 — — *Ledi* Karst., 1707, XXIV, 271.
 — — *Padi* Dietel, 934, XIX, 388.
 — — *Polypodii* Dietel, 1135, XX, 11.
 — — *Vacciniorum* Lagerh., 1418, XXII, 86.
Pustularia coronaria Rehm var. *macrocalyx* Rehm, 529, XV, 199.
 — — *cupularis* Fuck., 1730, XXIV, 275.
Pyrenodesmia Agardhiana Mass., 879, XVIII, 371.
 — — *intercedens* Trevis., 879, XVIII, 371.
Pyrenopectiza Ebuli Sacc., 526, XV, 199.
Pyrenula Bayrhopferi Hepp, 179, XI, 98.
 — — (*Pyrenastrum*) *libricola* Fee, 1357, XXI, 219.
 — — *muscorum* Hepp, 180, XI, 98.
 — — *γ. faginea* Hepp, 180, XI, 98.
 — — *nigrescens* Ach., 1352, XXI, 217.
 — — *nitida* Ach., 862, XVIII, 366.
 — — *a. major* Schaer., 862, XVIII, 366.
 — — var. *minor* Hepp, 1854, XXV, 238.
 — — var. *nitidella* Schaer., 1854, XXV, 238.
 — — *nitidella* Müll. Arg., 1854, XXV, 238.
 — — *polycarpa* Hepp, 375, XIII, 467.
 — — *punctiformis* var. *atomaria* Hepp, 468, XV, 186.
Pyronema carneum Schröt., 952, XIX, 392.
 — — *Marianum* Carus, 1930, XXVI, 161.
 — — *omphalodes* Fuck., 1930, XXVI, 161.
Racodium rupestre Pers., 1638, XXIII, 221; 1860, XXV, 242.
Racomitrium canescens Brid., 399, XIII, 471.
 — — *fasciculare* Brid., 1081, XIX, 424.
 — — *lanuginosum* Brid., 673, XVI, 85.
 — — *microcarpum* Brid., 1082, XIX, 425.
 — — *protensum* A. Braun, 672, XVI, 85.
Radula complanata Dum., 479, XV, 189.
Radula dentata Dum., 390, XIII, 470.
 — — *pallens* Dum., 1983, XXVI, 179.
Radulum Kmetii Bres., 1807, XXV, 225.
Ramalina angustissima Wainio, 1252, XX, 38.
 — — *calicaris a. fraxinea* E. Fries, 1665, XXIII, 229.
 — — *f. reagens* Merr., 1876, XXV, 246.
 — — var. *thrausta* E. Fries, 574, XV, 210.
 — — *capitata* Nyl., 41, IX, 130.
 — — *combeoides* Nyl., 1369, XXI, 222.
 — — *dalmatica* A. Zahlbr., 1875, XXV, 246.
 — — *denticulata* (Eschw.) Nyl., 1876, XXV, 246.
 — — var. *subolivacea* Wainio, 572, XV, 210.
 — — *dilacerata* Hoffm. f. *polinariella* Arn., 464, XV, 186.
 — — *Ecklonii* var. *elongata* Müll. Arg., 1368, XXI, 222.
 — — *farinacea* var. *angustissima* Anzi, 1252, XX, 38.
 — — *f. multifida* Ach., 1367, XXI, 221.
 — — *fraxinea* Ach., 1665, XXIII, 229.
 — — var. *calicariiformis* Nyl., 770, XVII, 276.
 — — *homalea* Ach., 1972, XXVI, 176.
 — — *lanceolata* var. *prolifera* A. Zahlbr., 1368, XXI, 221.
 — — *leptocarpa* Tuck., 1778, XXIV, 286.
 — — *membranacea* Mont., 1368, XXI, 221.
 — — *Menziesii* Tayl., 573, XV, 210.
 — — Tuck., 1778, XXIV, 286.
 — — *minuscule* Nyl., 464, XV, 186.
 — — *polinariella* Nyl., 464, XV, 186.
 — — *pollinaria f. nitidiuscula* Ach., 151, XI, 91.
 — — *polymorpha* var. *angulosa* Mass., 770, XVII, 276.
 — — var. *streptilis* Ach., 41, IX, 130.
 — — *prolifera* Tayl., 1368, XXI, 222.
 — — *reticulata* Krphbr., 573, XV, 210.
 — — *retiformis* Menz., 573, XV, 210.
 — — *scopulorum* var. *subfarinacea* Nyl., 1252, XX, 38.
 — — (sect. *Euramalina*) *sideriza* A. Zahlbr., 1876, XXV, 246.
 — — *strepsilis* A. Zahlbr., 41, IX, 130; 41, XV, 187.
 — — *subfarinacea* Nyl., 1252, XX, 38.
 — — *thrausta* Nyl., 574, XV, 210.
 — — *usneoides* E. Fries, 1050, XIX, 419.
Ramularia Actaeae Ell. et Hollw., 1489, XXII, 99.
 — — *Anchusae* Mass., 1336, XXI, 211.
 — — *Asperifolii* Sacc., 1485, XXII, 99.
 — — *cylindroides* Sacc., 1490, XXII, 100.
 — — *didyma* Unger, 1486, XXII, 99.
 — — *Geranii* Fuck., 1188, XX, 21; 1188, XXIII, 220.
 — — *haplospora* Speg., 1626, XXIII, 218.
 — — *lactea* Sacc., 1488, XXII, 99.

- Ramularia lactea* var. *violae tricoloris* 1488, XXII, 99.
- *Lampsanae* Sacc., 1492, XXII, 100.
- *necans* Pass., 1484, XXII, 99.
- *oreophila* Sacc., 1491, XXII, 100.
- *Parietaria* Pass., 1189, XX, 21.
- *Phyteumatis* Sacc. et Wint., 1493, XXII, 100.
- — — *f. Phyteumatis-orbicularis* Allesch., 1493, XXII, 100.
- *rosea* Sacc., 1187, XX, 21.
- *rubicunda* Bres., 1495, XXII, 100.
- *sambucina* Sacc., 1487, XXII, 99.
- — — *f. santonensis* Brun., 1487, XXII, 99.
- *Tulasnei* Sacc., 1834, XXV, 231.
- *Urticae* Ces., 1494, XXII, 100.
- *variabilis* Fuck., 1835, XXV, 231.
- *Violae* Fuck., 1488, XXII, 99.
- Raphidium convolutum* Rabenh. var. *minutum* 227, XII, 84.
- *polymorphum* Fries var. *fusiforme* Rabenh., 534, XV, 201.
- Raphiospora viridescens* Kbr., 54, IX, 133.
- Ravenelia Baumiana* P. Henn., 707, XVII, 259.
- *Stuhlmanni* P. Henn., 707, XVII, 259.
- Rebentischia unicaudata* Sacc., 1921, XXVI, 159.
- Reticularia segetum* Bulb., 9, IX, 122.
- Rhabdospora pleosporoides* Sacc., 984, XIX, 399.
- — var. *β. Bosciana* Sacc., 984, XIX, 399.
- *Saponariae* Bres. et Sacc., 984, XIX, 399.
- Rhabdoweisia fugax* Bryol. europ., 887, XVIII, 373.
- Rhacodium cellare* Pers., 1200, XX, 23.
- Rhaphidium polymorphum* Fres. var. *fusiforme* 80, IX, 139.
- Rhaphidospora fruticum* Fuck., 623, XVI, 67.
- *Ononidis* Auerm., 623, XVI, 67.
- *saligna* Auersw., 1156, XX, 15.
- Rhizocarpon distinctum* Th. Fries, 263, XII, 92.
- *geographicum* DC., 1235, XX, 33.
- — var. *viridiatra* Poetsch., 1236, XX, 34.
- *illotum* Arn., 454, XV, 184.
- *lotum* Stitzb., 171, XI, 96.
- *Montagnei* Körb., 264, XII, 93.
- *parapetraeum* A. Zahlbr., 367, XIII, 464.
- (*Catocarpon*) *polycarpum* Th. Fries, 265, XII, 93.
- *viridiatrum* Flk., 1236, XX, 33.
- Rhizoctonium crispum* Kütz., 1634, XXIII, 221.
- *hieroglyphicum* Kütz. var. *crispum* Rabenh., 1634, XXIII, 221.
- — — var. *longearticulatum* Wille, 1633, XXIII, 220.
- Rhizomorpha putealis* Pers., 1199, XX, 23.
- Rhizomorpha subterranea* Pers., 1199, XX, 23.
- Rhizopogon luteolus* Fries, 1607, XXIII, 215.
- Rhodobryum roseum* Limpr., 1584, XXII, 120.
- Rhodochoorton floridulum* Näg., 647, XVI, 78.
- Rhodomenia laciniata* Grev., 1757, XXIV, 282.
- Rhodoplax Schinzi* Schmidle et Wellh., 849, XVIII, 361.
- Rhynchonema quadratum* Kütz., 335, XIII, 455.
- Rhynchostegiella Jacquini* Limpr., 1586, XXII, 121.
- *tenella* Limpr., 897, XVIII, 374.
- Rhynchostegium curvisetum* var. *Jacquinii* Par., 1586, XXII, 121.
- *depressum* Bryol. europ., 299, XII, 98.
- *megapolitanum* Bryol. europ., 683, XVI, 87.
- *rotundifolium* Bruch, 100, IX, 142.
- *rusciforme* Bryol. europ., 1787, XXIV, 289.
- — var. *inundatum* Bryol. europ., 684, XVI, 87.
- *tenellum* Bryol. europ., 897, XVIII, 374.
- *vagans* Jacq., 1598, XXII, 123.
- Rhytisma acerinum* Fries, 207, XII, 79.
- *Bistortae* Lib., 1165, XX, 17.
- *Euphorbiae* Schub., 1113, XX, 4.
- *salicinum* Fries, 208, XII, 79; 208, XXIII, 219.
- Ricasolia candicans* Mass., 1364, XXI, 220.
- *glomulifera* De Not., 1661, XXIII, 228.
- *olivacea* Bagl., 864, XVIII, 366.
- Riccardia multifida* Gray, 1672, XXIII, 231.
- *pinguis* Gray, 1671, XXIII, 231.
- Riccia Bischoffii* Hüben, 182, XI, 98.
- *canaliculata* Hoffm., 183, XI, 98; 771 b, XXV, 251.
- *crystallina* L., 480, XV, 189.
- *fluitans* L., 771, XVII, 276; 771 b, XXV, 251.
- — *β. canaliculata* Lindenbg., 183, XI, 98.
- *glauca* L., 881, XVIII, 372.
- *sorocarpa* Bisch., 281, XII, 95.
- *tesselina* Willd., 181, XI, 98.
- Rinodina aterrima* Anzi, 66, IX, 136.
- *controversa* f. *crustulata* Mass., 1285, XX, 39.
- *crustulata* Arn., 1285, XX, 39.
- *Hallii* Tuck., 1560, XXII, 116.
- *iowensis* A. Zahlbr., 1259, XX, 40.
- *metabolica* Anzi, 1669, XXIII, 230.
- (*Dimelaena*) *oreina* f. *Mougeotiioides* A. Zahlbr., 44, IX, 130.
- *polyspora* Th. Fries, 662, XVI, 83.
- *pyrina* Arn., 161, XI, 94.
- (*Dimelaena*) *radiata* Tuck., 1059, XIX, 421.
- *sophodes* Körb., 662, XVI, 83.
- *turfacea* Körb., 1668, XXIII, 230.
- Rivularia atra* Roth, 748, XVII, 270; 748, XVIII, 365.

Rivularia bullata Zanard., 747, XVII, 270.

— *Cornu Damae* Roth, 438, XV, 180.

— *cylindrica* Hook, 749, XVII, 271.

— *dura* Roth, 74, IX, 137.

— *echinulata* Engl., 633, XVI, 72.

— *elegans* Roth, 84, IX, 140.

— *haematites* Ag., 331, XIII, 449.

— *incrassata* Purt., 1501, XXII, 102.

— *Jurgensii* Rab., 748, XVII, 270.

— *mesenterica* Thur., 747, XVII, 270.

— *monticulosa* Montagn., 748, XVII, 270.

— *nitida* Hauck, 747, XVII, 270.

— *pellucida* Ag., 748, XVII, 270.

— *pisum* Ag., 633, XVI, 72.

— *polyotis* Hauck, 747, XVII, 270.

— *radicans* c. *dura* Kirchn., 74, IX, 137.

— *rufescens* Born. et Flah., 332, XIII, 449.

— *tuberculosa* Roth, 845, XVIII, 361.

Rocella fucoides Wainio, 1027, XIX, 413;
1027 c, XX, 41.

— *leucophaea* Tuck., 445, XV, 182.

— *phycopsis* Ach., 1027, XIX, 413.

Roesleria crocata Sacc., 1838, XXV, 232.

Roestelia Phoenicis Bon., 907, XIX, 381.

Rosellinia thelena Awd. apud Rabh., 505,
XV, 193.

Ruggine del grano Turco Carr., 1123, XX, 8.

Russulopsis laccata Schröt., 301, XIII, 443.

Rutstroemia amentacea Karst., 1725, XXIV, 274.

— *baccarum* Schröt., 1929, XXVI, 161.

— *bolans* Rehm, 203, XII, 76.

Sacheria fluviatilis Sir., 1513, XXII, 105; 1513 c,
XXVI, 168.

— *rigida* Sir., 236, XII, 85.

Sagedia biformis Müll. Arg., 375, XIII, 467.

— *faginea* Schaer., 180, XI, 98.

— *illinata* Körb., 180, XI, 98.

— *minima* Hepp, 65, IX, 135.

— *muscorum* Müll. Arg., 180, XI, 98.

Sarcoderma sanguinea Ehrenb., 340, XIII, 458.

Sarcogyne pruinosa Körb., 1658, XXIII, 227.

Sarcoscypha coronaria Bond., 529, XV, 199.

— *nigrella* Cooke 1732, XXIV, 276.

Sarcoscyphus Ehrharti Corda, 192, XI, 100; 471,
XV, 188.

— — *c. erythrorhizus* Limpr., 192, XI, 100.

Sarcosphaera macrocalyx Auersw., 529, XV, 199.

Sargassum linifolium Ag., 143, XI, 90.

Scapania aequiloba Dum., 472, XV, 188;
472 b, XXI, 226.

— *aspera* Bern., 276, XII, 95.

— *dentata* Dum., 389, XIII, 470; 390, XIII, 470.

— *irrigua* Dum., 274, XII, 94.

— *nemorosa* Dum., 773, XVII, 277.

— *uliginosa* Dum., 389, XIII, 470.

— *undulata* Dum., 473, XV, 181; 473 b, XXII,
123.

Scapania undulata var. *A.* Gotsch, 390, XIII, 470.

Scenedesmus caudatus Corda, 638, XVI, 75.

— *obliquus* Kütz. var. *dimorphus* 227, XII
83.

— *quadricauda* Breb., 149, XI, 91; 227, XII,
83; 638, XVI, 75.

Schinzia Alni Woron., 1740, XXIV, 278.

Schismatomma abietina Mass., 556, XV, 207.

— *californicum* Herre, 1859, XXV, 240.

— *pluriloculare* A. Zahlbr., 1953, XXVI, 169.

Schistidium alpicolum Limpr. var. *rivulare*
Wahlenb., 785, XVII, 278.

— *apocarpum* Bryol. europ., 500, XV, 192.

— (?) *teretinerve* Limpr., 397, XIII, 471.

Schistostega osmundacea Mohr, 96, IX,
142; 96, XV, 215.

Schizoderma phacidoides Kunze, 907, XIX, 381.

Schizogonium murale Kütz., 1744, XXIV, 279.

Schizoneura melanogramma Schröt., 905,
XIX, 380.

Schizophyllum alneum Schröt., 1604, XXIII,
214.

— *commune* Fries, 1604, XXIII, 214.

Schizothrix calcicola Gom., 1520, XXII, 106.

— *coriacea* Gom., 1206, XIX, 404.

— *Heufleri* Grun., 1342, XXI, 213.

— *lanceacea* Gom., 1343, XXI, 213.

— *lateritia* Gom., 1006, XIX, 404; 1203, XX,
24.

Schröteria Cissi De Toni, 11, IX, 123.

Scleroderma aurantium Pers., 1810, XXV, 225.

— *vulgare* Fries, 1810, XXV, 225.

Scleroderma amphibola Gilb., 818, XVIII, 354.

Scleroglossum lanceolatum Pers., 1435, XXII, 89.

Scleropodium illecebrum Bryol. europ., 1096,
XIX, 427.

Sclerotina baccarum Rehm, 1929, XXVI,
161.

Sclerotium areolatum Fries, 934, XIX, 388.

— *Clavus* Lam. et DC., 611, XVI, 65.

— *complanatum* Fries, 1840, XXV, 233.

— *erysiphe* var. *corylae* Pers., 120, XI, 85.

— *populneum* Pers., 21, IX, 126.

— *sphaeroides* Pers., 1162, XX, 16.

— *suffultum* Rebm., 120, XI, 85.

Scolecotrichum graminis Fuck., 1191, XX,
22.

Scolicosporum atosanguineum f. *albescens* Hepp,
1233, XX, 33.

— *corticolum* Hazsl., 1234, XX, 33.

— *molle* Mass., 1361, XXI, 220.

— *turgidum* f. *corticolum* Arn., 1234, XX, 33.

Scopelophila acutiuscula Lindb., 1683,
XXIII, 233.

— *ligulata* Sprce., 1682, XXIII, 233.

Scorpidium scorpioides Limpr., 1290, XX, 46.

Scypharia nigrella Cooke, 1732, XXIV, 276.

Scytonema alatum Borzi, 746, XVII, 269.

- Scytonema circinatum* 1203, XX, 24.
 — *crustaceum* Ag., 746, XVII, 270.
 — *figuratum* Ag., 422, XV, 174; 1342, XXI, 213.
 — *gracillimum* Kütz., 1342, XXI, 213.
 — *Hofmanni* Ag., 1341, XXI, 213.
 — *myochrous* Ag., 72, IX, 137; 1343, XXI, 213.
 — *penicillatum* Ag., 1850, XXV, 236.
 — *Steindachneri* F. Krasser, 422, XV, 173.
 — *turicense* Näg., 1850, XXV, 236.
 — sp., 228, XII, 84.
Scytosiphon tomentarius Ag., 1216, XX, 27.
Secoliga argentina β . *albescens* Stzb., 1233, XX, 33.
 — *atrogrisea* Stbrg., 258, XII, 92.
 — *atrosanguinea* var. *y. incompta* Stzb., 1361, XXI, 219.
 — *diluta* Arn., 1028, XIX, 413.
 — *Friesiana* Stzb., 753, XVII, 273.
 — *gyalectoides* Mass., 655, XVI, 82.
 — *leucaspis* Mass., 361, XIII, 463.
 — *umbrina* var. *corticola* Stzb., 1234, XX, 33.
Secotium acuminatum Montagn., 1716, XXIV, 272.
 — *agaricoides* Hollós, 1716, XXIV, 272.
 — *Szabolcsiense* Haszl., 1716, XXIV, 272.
Segestrella Bayrholferi Zwackh, 179, XI, 97.
 — *biformis* Deichm., 375, XIII, 466.
 — *illinata* Körb., 180, XI, 98.
 — — β . *faginea* Bausch, 180, XI, 98.
Scgestria faginea Zwackh, 180, XI, 98.
 — *illinata* Blomb. et Forss., 180, XI, 98.
Sematophyllum brevicuspidatum Jäg., 1599, XXII, 123.
 — *hygrophilum* Fleisch., 1299, XX, 47.
 — *secundum* Fleisch., 1995, XXVI, 181.
Sendtneria ochroleuca Nees, 95, IX, 142.
Septobasidium Cerastianum Bres., 1806, XXV, 224.
Septogloeum Thomasianum Höhn., 1179, XX, 20.
 — *Ulmi* (Wallr.), 414, XXIII, 219.
Septoria affinis Sacc., 1469, XXII, 96.
 — — β . *Brachypodii* Sacc., 1469, XXII, 96.
 — *armoraciae* Sacc., 1736, XXIV, 277.
 — *Astragalii* Desm., 1331, XXI, 210.
 — *Berberidis* Niessl, 1452, XXII, 92.
 — *Bromi* Sacc., 1465, XXII, 95; 1469, XXII, 96.
 — *Brunellae* Ell. et Hark., 1459, XXII, 94.
 — *Cardaminis* Fuck., 1736, XXIV, 277.
 — — *resedifoliae* Heimerl, 1736, XXIV, 277.
 — — *trifoliae* Höhn., 1736, XXIV, 277.
 — *caricinella* Sacc. et Roum., 1735, XXIV, 277.
 — *castanicola* Desm., 415, XV, 172; 415, XXIV, 278.
 — *Cheiranthi* Rob. et Desm., 1736, XXIV, 277.

- Septoria Chelidonii* Desm., 214, XII, 81; 417, XV, 172; 214, XX, 23.
 — *chrysanthemella* Sacc., 1623, XXIII, 218.
 — *Chrysanthemii* Cav., 1623, XXIII, 218.
 — — *Rostr.*, 1623, XXIII, 218.
 — *Convolvuli* Desm., 1175, XX, 19.
 — *Cornicola* Desm., 983, XIX, 399.
 — *Cytisi* Desm., 416, XV, 172.
 — *Daphnes* Desm., 1480, XXII, 97.
 — *Ebuli* Rob., 1624, XXIII, 218.
 — *Euphorbiae* Kalchbr., 1934, XXVI, 162.
 — *evonymella* Pass., 1461, XXII, 94.
 — *exotica* Spng., 1468, XXII, 95.
 — *expansa* Niessl, 832, XVIII, 357.
 — *ficariae* Desm., 1734, XXIV, 277.
 — *Hederae* Desm., 1463, XXII, 94; 1463, XXV, 233.
 — *Hellebori* Thüm., 1460, XXII, 94.
 — *Kalchbrenneri* Sacc., 1934, XXVI, 162.
 — *Lamii* Pass., 1464, XXII, 94.
 Magnusiana Allesch., 834, XVIII, 357.
 — *media* Sacc. et Brun., 1934, XXVI, 162.
 — *Mori* Lév., 985, XIX, 399.
 — *Oxyacanthae* Kunze et Schm., 1470, XXII, 96.
 — *Oxyspora* Penz. et Sacc., 1465, XXII, 95.
 — *piricola* Desm., 1622, XXIII, 218.
 — *pleosporoides* Sacc., 948, XIX, 399.
 — *Podagrariae* Lach., 833, XVIII, 357.
 — *Populi* Desm., 1466, XXII, 95.
 — *Prunellae* Trail., 1459, XXII, 94.
 — *Rostrupii* Sacc. et Sydow, 1623, XXIII, 218.
 — *salicicola* Sacc., 213, XII, 81.
 — *Scabiosicola* Desm., 1467, XXII, 95.
 — *Senecionis* Westend., 1935, XXVI, 162.
 — *Stachydis* Rob. et Desm., 1332, XXI, 210.
 — *Trailiana* Sacc., 1459, XXII, 94.
 — *Ulmi* Fr., 414, XV, 172.
 — *urens* Pass., 1462, XXII, 94.
Sirococcus Coniferarum Vestergr., 1831, XXV, 230.
 — *conorum* Sacc. et Roum., 1832, XXV, 230; 1939, XXVI, 164.
 — *eumorpha* Keissl., 1831, XXV, 230.
 — — Sacc. et Penz., 1831, XXV, 230.
Sisostrema sulphureum Reb., 945, XIX, 390.
Sistotrema cinereum Pers., 313, XIII, 445.
Skierka Canarii Racib., 1710, XXIV, 271.
Skolekites vesicularis Norm., 754, XVII, 273.
Solorina crocea Ach., 564, XV, 208.
 — *saccata* Ach., 565, XV, 208.
Solorinella asteriscus Anzi, 43, IX, 130.
Sorastrum spinulosum Näg., 336, XIII, 455.
Sordariabombardioides Auersw., 717, XVII, 261.
 — *maxima* Niessl, 717, XVII, 261.
Sorocarpus uvaeformis Pringsh., 1749, XXIV, 280.

- Sorosporium hyalinum* Wint., 1112, XX, 4.
Spathularia clavata Sacc., 138, XI, 89; 138, XVI, 70.
 — *flavida* Pers., 138, XI, 89.
Spatoglossum flabelliforme Kütz., 642, XVI, 77.
 — *Spanneri* Menegh., 642, XVI, 77.
Spermothamnion Turneri Aresch., 1848, XXV, 236.
Sphacelaria cirrhosa Ag. var. *aegagropila* Wittr., 1748, XXIV, 280.
 — — — var. *irregularis* Hauck, 842, XVIII, 359.
 — — — var. *notata* Ag., 1748, XXIV, 280.
 — *fusca* Ag., 1748, XXIV, 280.
 — *irregularis* Kütz., 842, XVIII, 360.
Sphacelotheca Hidropiperis de Bary, 8, IX, 122.
Sphaenosiphon prasinus Reinsch., 1518, XXII, 106.
Sphaerella canescens Karst., 520, XV, 197.
 — *caricicola* Fuck., 1815, XXV, 226.
 — *Carlii* Fuck., 969, XIX, 396.
 — *carpineae* Auersw., 1313, XXI, 207.
 — *chlorospora* Ces. et de Not., 520, XV, 197.
 — *cinerascens* Fleisch., 520, XV, 197.
 — *depajaeformis* Ces. et de Not., 969, XIX, 396.
 — *ditricha* Auersw., 520, XV, 197.
 — *fragariae* Sacc., 1834, XXV, 231.
 — *innumerella* Karst., 1919, XXVI, 159.
 — (*Mycosphaerella*) *Lysimachiae* Höhn., 1151, XX, 14.
 — *maculiformis* 415, XV, 172.
 — — f. *Comari palustris* Rab., 1919, XXVI, 159.
 — *Menthae* Lamb. et Fantr., 1150, XX, 14.
 — *Oedema* Fuck., 414, XV, 172.
 — *turgida* Pers., 1431, XXII, 88.
Sphaeria Aegopodii β. Pers., 1158, XX, 16.
 — *Aequifolii* Fries, 1610, XXIII, 215.
 — *Alliariae* Auersw., 825, XVIII, 355.
 — *anthracina* Schmidt, 516, XV, 196.
 — *Artoceras* Tode, 1474, XXII, 96.
 — *Asari* Klotzsch, 810, XVIII, 352.
 — *Aucupariae* Pers., 1169, XX, 17.
 — *Berberidis* Pers., 616, XVI, 66.
 — *bullata* Hoffm., 514, XV, 195.
 — *caespitosa* Tode, 1164, XX, 17.
 — *caprae* DC., 1156, XX, 15.
 — *carpineae* Fries, 1313, XXI, 207.
 — *chlorospora* Ces., 520, XV, 197.
 — *Cibostii* de Not., 507, XV, 193.
 — *cinnabarina* Tode, 612, XVI, 65.
 — *claviformis* Sowerby, 615, XVI, 66.
 — *clavulata* Schwein., 1817, XXV, 227.
 — *clivensis* Berk. et Br., 971, XIX, 396.
 — *coccinea* Pers., 1430, XXII, 88.
 — *collapsa* Low., 523, XV, 197.
 — *comata* Tode, 1814, XXV, 226.
 — *conjuncta* Rees, 975, XIX, 397.
 — *conspersa* Fries, 1164, XX, 17.
Sphaeria Corylii Batsch, 511, XV, 195.
 — (*Depazea*) *cruenta* Fr., 411, XV, 171.
 — *Cucurbitula* Tode, 965, XIX, 395.
 — *decolorans* Pers., 612, XVI, 65.
 — *Dematium* Pers., 1456, XXII, 93.
 — *depazeaeformis* Auersw., 969, XIX, 396.
 — *depressa* Bolt., 514, XV, 195.
 — — Low., 514, XV, 196.
 — *derasa* Berk. et Br., 1314, XXI, 207.
 — *disciformis* Hoffm., 515, XV, 195.
 — *dictopa* Fries, 826, XVIII, 355.
 — *doliolum* Pers., 825, XVIII, 355.
 — *Dryadis* Fuck., 618, XVI, 67.
 — *dubia* Pers., 960, XIX, 394.
 — *elongata* Fries, 617, XVI, 66.
 — *Eutypa* Fries, 1922, XXVI, 160.
 — *fimbriata* Pers., 827, XVIII, 356.
 — *flaccida* Alb. et Schwein., 110, XI, 83.
 — *frondicola* Fries, 1466, XXII, 95.
 — *fruticum* Desm., 623, XVI, 67.
 — *Gnomon* Schum., 511, XV, 195.
 — *graminis* Pers., 519, XV, 196.
 — *gregaria* Weig., 1222, XX, 29.
 — *grisea* DC., 514, XV, 196.
 — *hypoderma* Fries, 521, XV, 197.
 — *hypoxantha* Lév., 720, XVII, 262.
 — *Junci* Fries, 1317, XXI, 208.
 — *Kunzei* Fries, 973, XIX, 397.
 — *Laburni* Pers., 506, XV, 193.
 — *Lamyi* Desm., 822, XVIII, 355.
 — *lateritia* Fries, 1611, XXIII, 215.
 — *Lingam* Tode, 1171, XX, 18.
 — *lycoperdoides* Weig., 517, XV, 196.
 — *maculiformis* Ehrh., 207, XII, 79.
 — *melaena* Fries, 1172, XX, 19.
 — *melanostyla* DC., 1157, XX, 15.
 — *Melogramma* Pers., 1316, XXI, 208.
 — *modesta* Desm., 507, XV, 193.
 — *moriformis* Tode 615, XVI, 66.
 — *myrtillina* Schub., 117, XI, 84.
 — *Nardi* Fries, 622, XVI, 67.
 — *natans* Tode 967, XIX, 395.
 — *nitida* Weig., 862, XVIII, 366.
 — *nivea* Hoffm., 719, XVII, 262.
 — *Nummularia* DC., 516, XV, 196.
 — *ocellata* Pers., 1316, XXI, 208.
 — *ogilviensis* Berk. et Br., 508, XV, 191; 718, XVII, 262.
 — *oleipara* Sollm., 1155, XX, 15.
 — *patella* Pers., 721, XVII, 262.
 — *penetrans* α. *patella* Tode, 721, XVII, 262.
 — *pezioides* α. *rubrofusca* Lam. et DC., 612, XVI, 66.
 — *Placenta* Tode, 514, XV, 195.
 — *platanoides* Pers., 624, XVI, 68.
 — *Podagrariae* Roth, 1155, XX, 16.
 — *polymorpha* Pers., 134, XI, 88; 1433, XXII, 89.

- Sphaeria Pteridis* Rebert., 626, XVI, 68.
 — *punicæ* Schmidt, 821, XVIII, 354.
 — *Pupula* Fries, 510, XV, 194.
 — *purpurea* Fries, 611, XVI, 65.
 — *Pustula* Pers., 1155, XX, 15.
 — *radicans* Tode, 516, XV, 196.
 — *rhytismoides* Bab. et Berk., 618, XVI, 66.
 — *Ribis* Tode, 820, XVIII, 354.
 — *Rousseliana* Desm., 621, XVI, 67.
 — *rubiformis* Sow., 615, XVI, 66.
 — *rubra* W., 517, XV, 196.
 — *rugosa* Grev., 615, XVI, 66.
 — (*Depazea*) *salicicola* Fries, 213, XII, 81.
 — *Sambucii* Pers., 967, XIX, 395.
 — *scabra* Kunze et Schm., 617, XVI, 66.
 — *stilbostoma* γ. *conferta* Fries, 624, XVI, 68.
 — *stribuloides* Menegh., 1944, XXVI, 166.
 — *strobilina* Curr., 1335, XXI, 211.
 — *suffulta* Nees, 1154, XX, 15.
 — *thelebola* Fries, 1315, XXI, 207.
 — *thelena* Fries, 505, XV, 193.
 — *trichella* Fries, 1620, XXIII, 217.
 — *typhina* Pers., 133, XI, 88.
 — *Ulmi* Duv., 1319, XXI, 208.
 — *unicaudata* Berk. et Br., 1921, XXVI, 159.
 — *verrucosa* Grev., 615, XVI, 66.
 — *xylomoides* DC., 1319, XXI, 208.
Sphaerocarpus chrysospermus Bull., 5, IX, 120.
 — *cylindricus* Bull., 404, XV, 170.
 — *fragiformis* Bull., 404, XV, 170.
 — *parvulus* Hass., 533, XV, 200.
Sphaerococcus confervoides Ag., 547, XV, 204.
Sphaeronema Mercurialis Lib., 1196, XX, 22.
 — *Spinella* Kalchbr., 830, XVIII, 356.
Sphaeroplea annulina Ag., 1020, XIX, 410.
 — — — var. *Braunii* Kirchn., 435, XV, 179;
 1020, XIX, 410.
Sphaeropsis Visci Sacc., 1472, XXII, 96.
Sphaerotheca Castagnei Lév., 119, XI, 85;
 119 d, XXII, 101.
 — *Epilobii* Sacc., 1310, XXI, 206.
 — *gigantiasca* Bäuml., 1917, XXVI, 159.
 — *Humili* Schröt., 119, XI, 85.
 — *mors-uvæ* Berk. et Curt., 1813, XXV, 226.
 — *tomentosa* Otth., 1917, XXVI, 159.
Sphaerosma pygmaeum Rabenh., 639, XVI, 76.
Sphagnum acutifolium Ehrh., 1572, XXII,
 119.
 — — — var. *versicolor* Warnst., 1573, XXII,
 119.
 — *Austini* Sulliv., 194, XI, 100.
 — *Ångströmii* C. Hartm., 284, XII, 96.
 — *ceylanicum* Mitt., 1590, XXII, 122.
 — *compactum* DC. var. *imbricatum* Warnst.,
 1674, XXIII, 231.
 — *contortum* var. *obesum* Wils., 1576, XXII,
 119.
 — *cuspidatum* Ehrh., 1574, XXII, 119.
Sphagnum cuspidatum Ehrh. var. *falcatum*
 193, XI, 100.
 — — — var. *submersum* Schpr., 1575, XXII,
 119.
 — *cymbifolium* Ehrh., 283, XII, 96; 482, XV,
 189.
 — *fuscum* Kling., 481, XV, 189.
 — *Gedeanum* Dz. et Mckb., 1589, XXII, 121.
 — *gracilescens* Hampe, 1069, XIX, 423.
 — *imbricatum* Hornsch., 194, XI, 100.
 — *laxifolium* C. Müll., 193, XI, 100.
 — *Lindbergii* Schimp., 393, XIII, 471.
 — *longistolo* C. Müll., 1068, XIX, 423.
 — *medium* Limp., 391, XIII, 470.
 — — — var. *virescens* Warnst., 1067, XIX,
 422.
 — *molluscum* Bruch, 483, XV, 189.
 — *obesum* var. *plumulosum* Warnst., 1576,
 XXII, 119.
 — *obtusifolium* var. *tenellum* 483, XV, 190.
 — *platyphyllum* Warnst., 286, XII, 96.
 — *recurvum* Palis., 283, XIII, 472.
 — — subsp. *mucronatum* Russ., 283 b, XIII,
 472.
 — — var. *mucronatum* Warnst., 283 b, XIII,
 472.
 — *rigidum* Schimp., 1674, XXIII, 231.
 — *rubellum* Wils., 285, XII, 96.
 — *sericeum* C. Müll., 1291, XX, 46.
 — *squarrosum* Pers., 392, XIII, 470; 392 b,
 XV, 215.
 — *tenellum* Ehrh., 483, XV, 190.
Sphenella angustata Kütz., 1008, XIX, 405.
Sphenolobus politus Steph., 1881, XXV, 298.
Sphinctrina turbinata E. Fries, 351, XIII,
 460.
Spirosphaeria Chelidonii Rabenh., 417, XV, 172.
Spiridens aristifolius Mitt., 1799, XXIV,
 291.
Spirogyra communis Kütz., 850, XVIII, 362.
 — — — var. *mirabilis* Kirchn., 1842, XXV, 234.
 — *crassa* Kütz. var. *maxima* Hansg., 851, XVIII,
 362.
 — *dubia* Kütz., 533, XV, 200.
 — *gracilis* Kütz., 333, XV, 200.
 — *majuscula* Kütz., 550, XV, 205.
 — *maxima* Witttr., 851, XVIII, 362.
 — *mirabilis* Kütz., 1842, XXV, 234.
 — *nitida* Lk., 850, XVIII, 362.
 — *quadrata* Pelit., 335, XIII, 455.
 — *tenuissima* Kütz., 859, XVIII, 364.
 — *ternata* Rip., 1207, XX, 26.
 — *velata* Nordst., 1505, XXII, 103.
 — *Weberi* Kütz., 1745, XXIV, 280.
 — sp., 239, XII, 87.
Spirotaenia parvula Archer, 1345, XXI,
 215.
Splachnum ampullaceum L., 97, IX, 142.

- Splachnum sphaericum* L. f., 197, XI, 101.
 — *tenue* Dicks., 1782, XXIV, 288.
 — *urceolatum* Brid., 893, XVIII, 374.
Spondylantha aphylla Presl., 11, IX, 123.
Spongia vermicularis Scop., 348, XIII, 459.
Sporisorium Colchici Lib., 906, XIX, 380.
Sporochnus Agardhi Mont., 1512, XXII, 104.
 — *filiformis* Ag., 1512, XXII, 104.
Sporodictyon Schaererianum var. *theleodes* Arn., 579, XV, 211.
 — *theleodes* 579, XV, 211.
Sporonema Platani Bäuml., 989, XIX, 400.
 — *strobilianum* Desm., 1335, XXI, 211.
Sporormia ambigua Niessl, 823, XVIII, 353.
Squamaria chrysoleuca Nyl., 48, IX, 131.
 — *fulgida* Oliv., 1978, XXVI, 177.
 — *Lamarckii* Nyl., 1549, XXII, 114.
 — *lentigera* Nyl., 162, XI, 94.
 — *saxicola* f. *Garovaglii* Nyl., 566, XV, 209.
 — *vulgaris* Zanard., 1516, XXII, 105.
Staganospora fragariae Briard. et Har., 1471, XXII, 96.
 — *strobilina* Sacc., 1335, XXI, 211.
 — *subseriata* Sacc. var. *Moliniae* Trail., 982, XIX, 398.
Stammaria Equiseti Sacc., 628, XVI, 68.
 — *Persoonii* Fuck., 628, XVI, 69.
Stapfia cylindrica Chod., 749, XVII, 271; 749b, XVIII, 365.
Staurostrum bifidum Ralfs., 854, XVIII, 363.
 — *brachiatum* Ralfs., 854, XVIII, 363.
 — *cruciatum* Heimerl, 854, XVIII, 369.
 — *dejectum* Breb., 539, XV, 203; 1019, XIX, 409.
 — *furcatum* var. f. *Rabenh.*, 639, XVI, 76.
 — — f. *spinosa* Nordst., 639, XVI, 76.
 — *Heimerlianum* Lüttkem. var. *spinulosum* 854, XVIII, 363.
 — *muricatum* Breb., 541, XV, 203.
 — *paradoxum* Meyen, 737, XVII, 267.
 — *scabrum* Breb., 539, XV, 203; 542, XV, 203.
 — *spinosum* Ralfs., 639, XVI, 76.
 — *spongiosum* Breb., 539, XV, 203.
 — *tumidum* Breb., 853, XVIII, 362.
 — — var. *polonica* Lüttkem., 853, XVIII, 362.
 — sp., 78, IX, 138.
Staurothele clopima var. *catalepta* A. Zahlbr., 1853, XXV, 238.
 — *hymenogonia* A. Zahlbr., 177, XI, 97.
Steinia geophana Stein., 365, XIII, 464.
 — *luridescens* Körb., 365, XIII, 464.
Stemonitis elegans Trent., 3, IX, 119.
 — *ferruginea* Ehrenb., 401, XV, 169.
 — *leucostyla* Pers., 3, IX, 119.
 — *typhina* Wigg., 402, XV, 169.
 — — Willd., 401, XV, 169.
 — *typhoides* DC. et Lam., 402, XV, 169.
Stenocybe byssacea Nyl., 173, XI, 96.
 — — f. *tremulicola* Steiner, 63, IX, 135.
 — *tremulicola* Norrl., 63, IX, 135.
Stereocaulon alpinum Laur., 152, XI, 91.
 — *azoreum* Nyl., 767, XVII, 276.
 — *corallinoides* Hoffm., 358, XIII, 462.
 — — E. Fries, 355, XIII, 461; 355b, XVI, 85.
 — *granulosum* Laur., 767, XVII, 276.
 — *leporinum* Th. Fries, 767, XVII, 276.
 — *proximum* var. *gracilius* Müll. Arg., 667, XVI, 84.
 — *sphaerophoroides* Tuckerm., 767, XVII, 275.
 — *tomentosum* E. Fries, 1655, XXIII, 226.
 — — β . *alpinum* Th. Fries, 152, XI, 91.
 — — δ . *azoreum* Schaer., 767, XVII, 275.
 — — var. *campestre* Körb., 1655, XXII, 226.
 — — * *alpinum* α . *verrucosum* Th. Fries, 152, XI, 92.
Stereodon revolutus Mitt., 899, XVIII, 375.
Stereum acerinum Sacc., 730, XVII, 261.
 — *avellanium* Fries, 1139, XX, 12.
 — *Boryanum* Fries, 1805, XXV, 224.
 — *Coryli* Pers., 1139, XX, 12.
 — *fasciatum* Fries, 943, XIX, 390.
 — *ferrugineum* Fries, 1307, XXI, 206.
 — *lobatum* Fries, 1805, XXV, 224.
 — *Ostrea* Nees, 1805, XXV, 224.
 — *pyrrhinum* Mont., 1905, XXVI, 156.
 — *perlatum* Berk., 1805, XXV, 224.
 — *purpureum* Pers., 1306, XXI, 206.
 — *rubiginosum* Fries, 1307, XXI, 206.
 — *rugosum* Pers., 1139, XX, 12.
 — *sanguinolentum* Fries, 1140, XX, 12.
 — — Som., 1139, XX, 12.
 — *Sprucei* Berk., 1805, XXV, 224.
 — *tabacinum* Fries, 1141, XX, 12.
 — (*Pleuropus*) *versicolor* Fries var. *illyricum* G. Beck, 319, XIII, 446.
Sterigmatocystis Welwitschiae Henn., 837, XVIII, 385.
Sterrocolax decipiens Schmitz, 1756, XXIV, 282.
Sticta amplissima Rabenh., 1661, XXIII, 228.
 — (sect. *Stictina*) *anthraspis* Ach., 1545, XXII, 112.
 — (sect. *Eusticta*) *aurata* Ach., 1861, XXV, 241.
 — *cetrarioides* Bab., 877, XVIII, 371.
 — *damaecornis* var. *dichotoma* Nyl., 1241, XX, 35.
 — *demutabilis* f. *laevis* Krph., 1241, XXI, 222.
 — *dichotoma* Del., 1241, XX, 35.
 — *glomulifera* Del., 1661, XXIII, 228.
 — *Jägeri* Roum., 247, XII, 89.
 — *Mülleri* Hmp., 877, XVIII, 371.
 — *scrobiculata* Ach., 561, XV, 207.
Stictina anthraspis Nyl., 1545, XXII, 112.

Stictina faveolata Nyl., 1545, XXII, 112.
 — *scrobiculata* Nyl., 561, XV, 207.
Stictis conicola Hazsl., 630, XVI, 69.
 — (*Lasiostictis*) *conigena* Sacc. et Berl., 630, XVI, 69.
 — *fimbriata* Schw., 630, XVI, 69.
 — *Lecanora* Fries, 1925, XXVI, 160.
 — *ocellata* Fries, 1925, XXVI, 160.
 — *sphaeroides* Niessl, 818, XVIII, 354.
Stiftia squamaria Nards., 1516, XXII, 106.
Stigmalidium venosum Nyl., 377, XIII, 467.
Stigmatea depauperata Schröt., 969, XIX, 396.
 — *fragariae* Tul., 1834, XXV, 231.
 — *Pongamiae* Racib., 1918, XXVI, 159.
 — *Robertiana* Fries, 1721, XXIV, 274.
Stigonema indica Schmidle, 858, XVIII, 364.
 — *informe* Kütz., 746, XVII, 270.
Stilbella Rehmiana Lindau, 1838, XXV, 232.
 — *resinae* Lindau, 1838, XXV, 232.
Stilbospora bullata Lk., 31, IX, 128.
Stilbum fimentarium Berk. et Br., 1337, XXI, 211.
 — *Rehmianum* Rabenh., 1838, XXV, 232.
 — *resinae* Rabenh., 1838, XXV, 232.
 — *resinarium* Peck., 1838, XXV, 232.
Streblonema aecidioides Fosc., 545, XV, 204.
Strickeria Kochii Körb., 968, XIX, 395.
Stypopodium attenuatum Kütz., 1510, XXII, 104.
 — *flavum* Kütz., 1510, XXII, 104.
Suriraya ovalis Breb. var. *minuta* Van Heurck, 1844, XXV, 235.
Surirella (*Suriraya*) *ovalis* Breb. var. *angusta*, *minuta*, *ovata*, *pinnata* 1008, XIX, 405.
 — *ovata* var. *ovalis* Kirchn., 1844, XXV, 235.
Swartzia inclinata Ehrh., 1268, XX, 42.
Sychnogonia Bayrhopfferi Körb., 179, XI, 97.
Symphosiphon Hoffmannii Kütz., 1341, XXI, 213.
Synchytrium Anemones Woron., 202, XII, 75.
 — *aureum* Schröt., 1197, XX, 23.
 — *decipiens* Farlow, 1198, XX, 23.
 — *Mercurialis* Fuck., 1196, XX, 22.
 — (*Leucochytrium*) *montanum* Zopf, 840, XVIII, 358.
 — *Phegopteridis* Juel, 1451, XXII, 92.
 — *pilificum* Thomas, 1340, XXI, 212.
 — *Succisae* De Bary et Woron., 1000, XIX, 402.
 — *Taraxaci* De Bary et Woron., 1629, XXIII, 219.
Synechoblastus nigrescens Anzi, 270, XII, 94.
 — — Trev., 1659, XXIII, 227.
 — *vespertilio* Hepp, 1659, XXIII, 227.
Synedra Ulna Ehrenb., 534, XV, 201; 741, XVII, 269; 1844, 1845, XXV, 235.

Synedra Ulna Nitzsch, 1008, XIX, 405.
 — — — var. *amphirhynchus* 1008, XIX, 405.
 — — — var. *obtusa* 1008, XIX, 405.
 — — — var. *spathulifera* 1008, XIX, 405.
 — — — var. *splendens* 1008, XIX, 405.
 — — — var. *subaequalis* 1008, XIX, 405.
Syntrichia montana Nees, 1680, XXIII, 232.
 — *pulvinata* Jur., 1679, XXIII, 232.
Syrrophodon Hobsoni Hook. et Grev., 1896, XXV, 251.
 — *tristichus* Nees, 1592, XXII, 122.
Systegium crispum Schpr., 1376, XXI, 223.
Tabellaria flocculosa Ag., 1844, XXV, 235.
Taonia Atomaria J. Ag., 1510, XXII, 104.
Tapesia fusca Fuck., 1926, XXVI, 160.
Taphridium Umbelliferarum Lagerh. et Juel, 1630, XXII, 219.
Taphrina aurea Fries, 1718, XXIV, 273.
 — *Insititiae* Johans, 1719, XXIV, 273.
 — *oreoselina* Mass., 1630, XXIII, 219.
 — *populina* Fries, 1718, XXIV, 273.
 — *Rostrupiana* Giesenh., 1146, XX, 13.
 — *Umbelliferarum* Rostr., 1630, XXIII, 219.
Tayloria tenuis Schpr., 1782, XXIV, 288.
Taxithelium turgidellum Par., 1996, XXVI, 181.
Teichospora pezizoides Sacc. et Speg., 968, XIX, 396.
 — *Rabenhorstii* Sacc., 968, XIX, 396.
Telaranea nematodes Howe var. *longifolia* Howe, 1571, XXII, 118.
Telephora sanguinea Pers., 343, XIII, 458.
Tesselina pyramidata Dum., 181, XI, 98.
Tetraxis pellucida Hedw., 584, XV, 212.
Tetraplodon urceolatus Bryol. europ., 893, XVIII, 374.
Tetraspora cylindrica Ag., 749, XVII, 271.
 — — — f. *enteromorphoides* Lagerh., 749, XVII, 271.
 — *gelatinosa* Desv., 339, XIII, 457.
 — *lubrica* Ag., 340, XIII, 457.
Thalloidima coeruleonigricans Poetsch., 754, XVII, 273.
 — *vesiculare* Mass., 754, XVII, 273.
Thamnidium floridulum Thur., 647, XVI, 78.
Thecaphora affinis Schneider, 1112, XX, 4.
 — *melanogramma* Lev., 905, XIX, 380.
Thecospora areolata Magnus, 934, XIX, 388.
 — *Pirolae* Karst., 935, XIX, 389.
 — *Vacciniorum* Karst., 1418, XXII, 85.
Thelecarpon prasinellum Nyl., 373, XIII, 465.
 — *suberellum* Nyl. f. *subcylindricum* Arn., 374, XIII, 466.
Thelenella modesta Nyl., 751, XVII, 272.
Thelephora acerina Pers., 713, XVII, 261.
 — *carnea* Gmel., 320, XIII, 447.
 — *cinerea* Pers., 1711, XXIV, 271.

- Thelephora Comedens* Nees, 1803, XXV, 224.
 — *Corium* Pers., 1142, XX, 13.
 — *corrugata* Fries, 714, XVII, 261.
 — *corylea* Pers., 1139, XX, 12.
 — *fasciata* Schwein., 943, XIX, 390.
 — *gigantea* Fries, 1602, XXIII, 214.
 — *incarnata* Pers., 1804, XXV, 224.
 — *obscura* Pers., 1905, XXVI, 156.
 — *olivacea* Fries, 1601, XXIII, 213.
 — *Padi* Pers., 714, XVII, 261.
 — *pallida* Pers., 318, XIII, 446.
 — *pavonia* Web., 1060, XIX, 421.
 — *pergamena* Pers., 1602, XXIII, 214.
 — *purpurea* Schum., 1306, XXI, 206.
 — *quercina* Pers., 320, XIII, 447.
 — *rubiginosa* Schrad., 1307, XXI, 206.
 — *rugosa* Pers., 1139, XX, 12.
 — *sanguinolenta* Alb. et Schw., 1140, XX, 12.
 — *tabacina* Fries, 1141, XX, 12.
Thelidium epipolytropum Mudd., 970, XIX, 396.
 — *minimum* Arn., 65, IX, 135.
Thelopsis rubella Nyl., 179, XI, 97.
Theloschistes chrysophthalmus Th. Fries, 157, XI, 92.
 — *parietinus* 1057, XIX, 421.
Thelotrema clausum Schaer., 446, XV, 182.
 — *clopinum* γ. *cataleptum* Hepp, 1853, XXV, 238.
 — *exanthemica* Ach., 446, XV, 182.
 — *gralectoides* Mass., 655, XVI, 82.
 — *lepadinum* Ach., 255, XII, 91; 255, XIII, 468.
 — *leucaspis* Kphbr., 361, XIII, 463.
 — *sepultum* Hepp, 578, XV, 211.
Thrombium stigmatellum Wallr., 1223, XX, 29.
Thuidium abietinum Bryol. europ., 679, XVI, 87.
 — *Philiberti* Limp., 1092, XIX, 426.
 — *tamariscellum* B. et Sacc., 1994, XXVI, 181.
 — *tamariscinum* Bryol. europ., 1893, XXV, 250.
Thwaitesia Duriei Mont., 1504, XXII, 103.
Thysanomitrium uncinatum Jäg., 1690, XXIII, 234.
Tilletia destruens Lév., 801, XVIII, 349.
Timmia bavarica Hazsl., 1387, XXI, 225.
Tolypella intricata Leonh. f. *elongata* Mgl., 434, XV, 178; 434b, XVIII, 365.
Tolypothrix allochroa Bor., 1850, XXV, 237.
 — *lanata* Wartm., 149, XI, 91.
 — *Naegeli* Kütz., 1850, XXV, 237.
 — *penicillata* Thur., 148, XI, 91; 1850, XXV, 236; 1850b, XXVI, 168; 1949, XXVI, 167.
Tomasellia arthonioides Mass., 68, IX, 136.
Toninia coeruleonigricans Th. Fries, 754, XVII, 273.
 — (sect. *Thalloidima*) *coeruleonigricans* Th. Fries, 754b, XX, 41.
Tornabenia chrysophthalma Mass., 157, XI, 92.
Torrubia pistillariaeformis Cook., 1817, XXV, 227.
Tortella fragilis Limp., 890, XVIII, 373.
 — *inclinata* Limp., 498, XV, 192.
 — *squarrosa* Limp., 196, XI, 101; 196, XV, 215.
Tortula cuneifolia Roth, 1884, XXV, 249.
 — *Drumondi* Mitt., 890, XVIII, 373.
 — *inclinata* Hedw., 498, XV, 192.
 — *javanica* Broth., 1395, XXI, 226.
 — *latifolia* Bruch, 1885, XXV, 249.
 — *montana* Lindb., 1680, XXIII, 232.
 — *nitida* Lindb., 889, XVIII, 373.
 — *papillosa* Wils., 1079, XIX, 424.
 — *pulvinata* Limp., 1679, XXIII, 232.
 — *revoluta* Schrad., 891, XVIII, 373.
 — *ruralis* Ehrh., 1681, XXIII, 233.
 — *subulata* Hedw., 1273, XX, 43.
Torula bulbiger Bon., 1482, XXII, 98.
 — *Epilobii* Corda, 1481, XXII, 98.
 — *rubella* Bon., 1482, XXII, 98.
 — *Triticii* Corda, 1482, XXII, 98.
Trabutia crotonicola Rehm, 652, XVI, 68.
Trachyderma plumbeum Norm., 357, XIII, 462.
 — *triplophyllum* Norm., 358, XIII, 462.
Trachylia californica Tuck., 1952, XXVI, 169.
 — *tympanella* E. Fries, 352, XIII, 461.
 — *viridula* Nyl., 172, XI, 96.
Trachyloma indicum Mitt., 1991, XXVI, 180.
Trachypus bicolor Rw. et Hornsch., 1992, XXVI, 181.
 — — — var. *hispidus* Card., 1993, XXVI, 181.
 — *hispidus* Par., 1993, XXVI, 181.
Trachyspora Alchemillae Fuck., 1402, XXII, 82.
Trametes aphanopoda Reich., 1910, XXVI, 157.
 — *Avellanea* Bres., 1910, XXVI, 157.
 — *odorata* Fries, 311, XIII, 445.
Trematodon ambiguus Hornsch., 1987, XXVI, 180.
 — *sardini* Schpr., 1990, XXVI, 180.
Tremella Auricula judae L., 1419, XXII, 86.
 — *cruenta* Sm., 343, XIII, 458.
 — *helvelloides* DC. et Lam., 1713, XXIV, 272.
 — *rufa* Jacq., 1713, XXIV, 272.
 — *Urticae* Pers., 839, XVIII, 358.
Trentepohlia aurea Mart., 1342, XXI, 213.
 — — — var. *tomentosa* Hansg., 344, XIII, 458.
 — *Bleischii* Wille, 343, XIII, 458.
 — *jolithus* Wallr., 235, XII, 85.
 — *lagenifera* Wille, 1210, XX, 26.
 — *monila* de Wild. f. *hyalina* Schmdl., 858, XVIII, 364.
 — *odorata* var. *oleifera* de Toni, 732, XVII, 266.
 — *oleifera* Krass., 732, XVII, 266.

- Trentepohlia radicans* G. de Beck, 635, XVI, 73.
 — *umbrina* Bor., 345, XIII, 458; 345b, XIX, 410.
 — *virgatula* Farl., 1751, XXIV, 281.
Triblidium quercinum Pers., 523, XV, 197.
Trichia chrysosperma DC., 5, IX, 120.
 — *cinerea* Bull., 407, XV, 170.
 — *gregaria* (Retz), 5, IX, 120.
 — *leucopodia* Bull., 3, IX, 119.
 — *nitens* Pers., 5, IX, 120.
 — *rubiformis* Pers., 406, XV, 170.
 — *scabra* Rostaf., 405, XV, 170.
Trichobasis Betae Lév., 1104, XX, 2.
 — *Epilobii* Berk., 923, XIX, 385.
 — *Iridis* Cooke, 915, XIX, 383.
 — *oblongata* Berk., 812, XVIII, 352.
 — *Parnassiae* Cooke, 1103, XX, 2.
 — *Pirolae* Berk., 935, XIX, 389.
 — *Primulae* Cooke, 913, XIX, 382.
 — *Symphyti* Lév., 1117, XX, 5.
Trichoceras clavatum Kütz., 743, XVII, 269.
Trichocladia Baileyi Strtn., 877, XVIII, 371.
Trichocolea tomentella Nees, 885, XVIII, 373.
Trichodesmium Phoenicis Chev., 907, XIX, 381.
Tricholea tomentella Dum., 885, XVIII, 372.
Trichopeziza calyculaeformis Rehm, 1617, XXIII, 217.
 — *dumorum* Sacc., 1614, XXIII, 216.
 — *echinulata* Rehm, 1728, XXIV, 275.
 — *nidulus* Fuck., 1446, XXII, 91.
 — *nivea* Fuck., 1729, XXIV, 275.
Trichospora Kochii Ell. et Everh., 968, XIX, 396.
Trichostelium aequoreum Fleisch., 1899, XXV, 251.
Trichostomum aloides Schultz, 497, XV, 192.
 — *crispulum* Bruch var. *majus* Vel., 1578, XXII, 120.
 — *flavovirens* Bruch, 1579, XXII, 120.
 — *glaucescens* Hedw., 782, XVII, 278.
 — *lanuginosum* Hedw., 673, XVI, 85.
 — *litorale* Mitt., 494, XV, 191.
 — *mutabile* Bruch, 1579, XXII, 120.
 — *nitidum* Schimp., 889, XVIII, 373.
Triphragmium Ulmariae Link, 101, XI, 81.
Trochilia petiolaris Rehm, 1726, XXIV, 274.
Trullula pirina Bres., 836, XVIII, 357; 1434, XXII, 89.
Tryblidium pineum Fries, 958, XIX, 393.
Trypethelium virens Tuck., 1022, XIX, 411.
Tuber aestivum Vitt., 724, XVII, 263.
 — *obtextum* Sprg., 1607, XXIII, 215.
Tubercularia fasciculata 1163, XX, 17.
 — *persicina* Ditm., 12, IX, 125.
 — *vulgaris* Tode, 1500, XXII, 101.
Tuberculina persicina Sacc., 12, IX, 125.
Tubulina cylindrica Lam. et DC., 404, XV, 170.
Tubulina fragiformis Pers., 404, XV, 170.
Turbinaria conoides Kütz., 1509, XXII, 104.
 — *denudata* Bory, 1509, XXII, 104.
 — *vulgaris* var. *conoides* J. Ag., 1509, XXII, 104.
Tylostoma atrum Bolla, 1915, XXVI, 158.
Tympanis amphibola Karst., 818, XVIII, 354.
 — *aucupariae* Wallr., 1164, XX, 17.
 — *conspersa* Fries, 1164, XX, 17.
 — *Frangulae* Fries, 959, XIX, 393.
Tyndaridea stagnalis Hassk., 1504, XXII, 103.
Ulothrix subtilis Kütz., 535, XV, 202.
 — *zonata* Kütz., 240, XII, 87.
 — — — b. var. *valida* 240, XIII, 460.
Ulva Atomaria Good. et Woodw., 1510, XXII, 104.
 — *compressa* L., 731, XVII, 266; 1741, XXIV, 279.
 — *cylindrica* Wahlenbg., 749, XVII, 271.
 — *fluviatilis* Sommers., 83, IX, 139.
 — *gelatinosa* Vauch., 339, XIII, 457.
 — *granulata* L., 88, IX, 140.
 — *incrassata* Huds., 1501, XXII, 102.
 — *intestinalis* L., 436, XV, 179.
 — *involvens* Savi, 649, XVI, 79.
 — *lubrica* Roth, 340, XIII, 457.
 — *multifida* Sm., 1270, XX, 28.
 — *polypodioides* DC., 1511, XXII, 104.
 — *serrata* DC., 1510, XXII, 104.
 — *squamaria* Roth, 1516, XXII, 106.
Ulvella radians Schmidle, 649, XVI, 79.
Umbilicaria anthracina Hoffm., 1958, XXVI, 170.
 — *arctica* Nyl., 1960, XXVI, 172.
 — *atropruinosa* var. *anthracina* E. Fries, 1958, XXVI, 171.
 — — — var. *cinerascens* Nyl., 1958, XXVI, 171.
 — — — var. *reticulata* E. Fries, 1957, XXVI, 170.
 — *Dillenii* Tuck., 1541, XXII, 111.
 — *erosa* Hoffm., 1959, XXVI, 171.
 — *hypoborea* 461, XV, 185.
 — *leiocarpa* DC., 1958, XXVI, 171.
 — *phaea* Tuck., 1656, XXIII, 226.
 — *polymorpha* γ. *arctica* Schaer., 1960, XXVI, 172.
 — *proboscidea* var. *arctica* E. Fries, 1960, XXVI, 172.
 — *pustulata* Hoffm., 356, XIII, 461.
 — *reticulata* Nyl., 1957, XXVI, 170.
 — *varia* δ. *arctica* Leight, 1960, XXVI, 172.
Uncinula Aceris Sacc., 123, XI, 86.
 — *australiana* Mc. Alp., 963, XIX, 394.
 — *bicornis* Lév., 123, XI, 86.
 — *Bivonae* Lév., 962, XIX, 394.
 — *clandestina* Schröt., 962, XIX, 394.
 — *Prunastri* Sacc., 122, XI, 86.
 — *Salicis* Wint., 121, XI, 86.

- Uncinula Wallrothii* Lév., 122, XI, 86.
Urceola Ebuli Quel., 526, XV, 199.
Urceolaria calcarea α . *farinosa* Flk., 1776, XXIV, 286.
 — α . *b. farinosa* Schaer., 1776, XXIV, 286.
 — *Lamarckii* DC., 1549, XXII, 113.
 — *verrucosa* Ach., 254, XII, 91.
Uredinopsis filicina Magn., 936, XIX, 389.
Uredo Aegopodii Schum., 1304, XXI, 205.
 — *Alchemillae* Pers., 1402, XXII, 81.
 — *ambigua* DC., 26, IX, 127; 1105, XX, 2.
 — *Andropogonis* Ces., 36, IX, 129.
 — *antherarum* DC., 10, IX, 123.
 — *Anthyllidis* Grev., 824, XVIII, 353.
 — *apiculata* α . *Trifolii* Strauss, 14, IX, 125.
 — — *Aretii* Strauss, 1406, XXII, 82.
 — *appendiculata* Schleich., 1126, XX, 8.
 — — γ . *Genistae tinctoriae* Pers., 1107, XX, 2.
 — *Arenariae* Schum., 40, IX, 130.
 — *arillata* δ . *Colchici* Wallr., 906, XIX, 380.
 — *Asphodeli* DC., 706, XVIII, 258.
 — *Athamanthae* DC., 931, XIX, 388.
 — *Bardanae* Strauss, 1406, XXII, 82.
 — *Betae* β . *Convolvuli* Pers., 1119, XX, 6.
 — *Betonicae* Strauss, 1413, XXII, 84.
 — *Bidentis* Henn., 937, XIX, 389.
 — *bifrons* DC., 15, IX, 125.
 — *Bliti Bivona* 112, XI, 83.
 — *bonariensis* Speg., 806, XVIII, 351.
 — *bullata* Pers., 31, IX, 128.
 — *calystegiae* Desm., 1119, XX, 6.
 — *campanulae* Pers., 815, XVIII, 353.
 — *candida* β . *Tragopogi* Pers., 111, XI, 83.
 — *carbo* DC., 801, XVIII, 349.
 — *caricis* Pers., 908, XIX, 381.
 — — Schum., 1411, XXII, 84.
 — *carpophila* Schum., 908, XIX, 381.
 — *chaerophylli* Kirchn., 1121, XX, 7.
 — *Chelidonii* Schwein., 1114, XX, 4.
 — *Chrysanthemi* Roze, 932, XIX, 388.
 — *Cichoriacearum* Sprgl., 917, XIX, 384.
 — *cincta* β . Strauss, 1104, XX, 2.
 — *circaeae* Schum., 705, XVII, 258.
 — *clavata* Schum., 708, XVII, 259.
 — *Colchici* Link, 906, XIX, 380.
 — *confluens* Lam., 1113, XX, 4.
 — — Schum., 1116, XX, 5.
 — — var. *mercurialis* Mart., 1116, XX, 5.
 — — β . *mercurialis perennis* Pers., 1116, XX, 5.
 — *Conii* Strauss, 929, XIX, 387.
 — *convalliarum* Spreng., 1122, XX, 7.
 — *Convolvuli* Strauss, 1119, XX, 6.
 — *crustacea* Berk., 815, XVIII, 353.
 — *Cynapii* var. *cicutae majoris* DC., 929, XIX, 387.
 — *Cytisi* Strauss, 1107, XX, 2.
 — *Decaisneana* Lév., 1108, XX, 3.
 — *decipiens* var. β . Strauss, 908, XIX, 381.

- Uredo delphinii* Wallr., 709, XVIII, 260.
 — *Dentariae* Alb. et Schw., 921, XIX, 385.
 — *destruens* Duby, 801, XVIII, 349.
 — *dianthicola* Hariot, 1138, XX, 12.
 — *Epilobii* DC., 923, XIX, 385.
 — *Erythronii* DC., 912, XIX, 382.
 — *excavata* DC., 1102, XX, 1.
 — *Fabae* η . *Medicaginis falcatae* DC., 14, IX, 125.
 — *falcaria* Spreng., 916, XIX, 383.
 — *fallax* Corda, 12, IX, 125.
 — *farinosa* var. *Salicis capreae* Pers., 20, IX, 126.
 — *ficariae* Schum., 19, IX, 126.
 — *Gentianae* DC., 1118, XX, 6.
 — — Strauss, 1118, XX, 6.
 — *gyrosa* Rebert., 106, XI, 82.
 — *Hedysari obscuri* DC. et Lam., 1903, XXVI, 156.
 — *Helianthi* Schwein., 1407, XXII, 83.
 — *Helioscopiae* Pers., 1113, XX, 4.
 — *Hydrocotyles* Mont., 806, XVIII, 350.
 — *hypericorum* DC., 23, IX, 127.
 — *Hysterium* Strauss, 917, XIX, 384.
 — *Iridis* DC., 915, XIX, 383.
 — *Laburni* DC., 1107, XX, 3.
 — *Ledi* Alb. et Schwein., 1707, XXIV, 271.
 — *Leguminosarum* Link γ . *glycyrrhizae* Rabenh., 1111, XX, 3.
 — *Lespedezae* Thüm., 1902, XXVI, 155.
 — *limbata* var. *Iridis* Rabenh., 915, XIX, 383.
 — *linearis* var. *Polypodii* Pers., 1135, XX, 11.
 — *longissima* Sowerby, 6, IX, 120.
 — *Lycotoni* Kalchbr., 1702, XXIV, 270.
 — *macrospora* Desm., 812, XVIII, 352.
 — *Melampyri* Rebert., 107, XI, 82.
 — *melanogramma* DC., 905, XIX, 380.
 — *minuata* Pers., 708, XVII, 259.
 — *muricella* var. *Conii* Rabenh., 929, XIX, 387.
 — — var. *Oreoselini* Rabenh., 808, XVIII, 351.
 — *muscaria* Duby, 17, IX, 126.
 — *myrrhidis* Opiz, 1121, XX, 7.
 — *oblonga* Grev., 812, XVIII, 352.
 — *Oreoselini* Strauss, 808, XVIII, 351.
 — *Padi* Kunze 934, XIX, 388.
 — *Parnassiae* West., 1103, XX, 2.
 — *Phaseoli* Strauss, 13, IX, 125.
 — *Phragmitis* Schum., 30, IX, 128.
 — *Pimpinella* Strauss, 27, IX, 127.
 — *pinguis* DC., 708, XVII, 259.
 — *Pirolae* Mart., 935, XIX, 389.
 — *polymorpha* var. γ . Strauss 1113, XX, 4.
 — *Polypodii* f. *Phegopteris* Wint., 936, XIX, 389.
 — — β . *Dryopteridis* Moug. et Nestl., 1134, XX, 11.
 — *porphyrogenita* Linde, 934, XIX, 388.
 — *Porri* Sow., 26, IX, 127.
 — *Primulae* DC., 913, XIX, 382.
 — *proeminens* Duby, 1114, XXII, 81.

- Uredo prunastri* DC., 34, IX, 129.
 — *Pseudocyperi* Rabenh., 908, XIX, 381; 1411, XXII, 84.
 — *Pulsatillae* Steud., 709, XVII, 260.
 — *punctata* DC., 1113, XX, 4.
 — *pustulata* α. *Epilobii* Pers., 1133, XX, 10.
 — — γ. *Vaccinii* Alb. et Schw., 1418, XXII, 86.
 — *quincunx* Strauss, 918, XIX, 384.
 — *Rhododendri* DC., 1132, XX, 10.
 — *Rosae* Pers., 708, XVII, 259.
 — — *centifoliae* Pers., 708, XVII, 259.
 — *Rubi idaei* Pers., 106, XI, 82.
 — *Rumicis* Schum., 15, IX, 125.
 — *Scillarum* Grev., 17, IX, 126.
 — *Scirpi* Coss., 910, XIX, 381.
 — *Scrophulariae* Lasch, 16, IX, 126.
 — *segetum* γ. DC., 908, XIX, 381.
 — — Pers., 9, IX, 122.
 — — δ. *Arrhenatherae* Opiz, 901, XIX, 379.
 — *segetum* δ. *Panici miliacei* Sacc., 801, XVIII, 349.
 — *sepium* Spreng., 1119, XX, 6.
 — *Serratula* Schum., 1130, XX, 9.
 — *striola* Strauss, 30, IX, 128.
 — *suaveolens* Pers., 1130, XX, 9.
 — *Symphyti* Lam., 1117, XX, 5.
 — *Terebinthii* DC., 1108, XX, 3.
 — *Thesii* Duby, 811, XVIII, 352.
 — *tremellosa* var. *Pulsatillae* Strauss 709, XVII, 260.
 — *Ulmariae* Schum., 301, XI, 81.
 — *urceolatum* DC., 908, XIX, 381.
 — *Vacciniorum* DC., 1418, XXII, 85.
 — *vagans* α. *Epilobii tetragoni* DC., 923, XIX, 385.
 — *Valerianae* Schum., 1103, XX, 2.
 — *verrucosa* Strauss, 803, XVIII, 350.
 — *violacea* Pers., 10, IX, 123.
 — *Violarum* DC., 1404, XXII, 83.
Urocystis Colchici Fuck., 909, XIX, 380.
 — *pusilla* Cooke et Tech., 905, XIX, 380.
Uromyces Aconiti Fuck., 1702, XXIV, 270.
 — — *Lycocotoni* Wint., 1702, XXIV, 269.
 — *Alchemillae* Schröt., 1402, XXII, 81.
 — *ambiguus* Fuck., 1105, XX, 2.
 — *Anthyllidis* Hariot, 1302, XXI, 205.
 — — Schröt., 814, XVIII, 352.
 — *appendiculatus* Link, 13, IX, 125.
 — — Rabenh., 1111, XX, 3.
 — *Astragalii* 1417, XXII, 85.
 — *Betae* Kühn, 1104, XX, 2.
 — — Wint., 1104, XX, 2.
 — *Bidentis* Lagerh., 937, XIX, 389.
 — *borealis* Peck, 1903, XXVI, 156.
 — *calystegiae* De Bay, 1119, XX, 6.
 — *caryophyllinus* 1138, XX, 12.
 — *Chenopodii* Schröt., 1106, XX, 2.
 — *concentricus* Lév., 17, IX, 126.
Uromyces Conii Karst, 929, XIX, 387.
 — *Cytisii* Voss., 1404, XXII, 82.
 — *Dactylidis* Oth., 909, XIX, 381.
 — *Erythronii* Pass., 912, XIX, 382.
 — — Wint., 912, XIX, 382.
 — *Euphorbiae Corniculatae* Jard., 1417, XXII, 85.
 — *excavatus* Magn., 1102, XX, 1.
 — *Ficariae* Fuck., 19, IX, 126; 19 b, XVII, 264.
 — *fulgens* Bub., 1404, XXII, 82.
 — *Gageae* G. Beck, 18, IX, 126.
 — *Genistae-tinctoriae* Wint., 1107, XX, 2; 1111, XX, 3; 1302, XXI, 205.
 — — Schröt., 1107, XX, 3.
 — *Geranii* Aut. pp., 1403, XXII, 82.
 — *giganteus* Speg., 1106, XX, 2.
 — *glycyrrhizae* Magn., 1111, XX, 3.
 — *graminis* Cooke, 909, XIX, 381.
 — *Hazlinskii* De Toni, 1903, XXVI, 156.
 — *Hedysari* Fuck., 1903, XXVI, 156.
 — — *obscuri* Carestia et Piccone, 1903, XXVI, 156.
 — *Heliotropii* Svedinsky, 1109, XX, 3.
 — *Hordei* Niels, 1128, XX, 9.
 — *Ipomaeae* Thüm., 1137, XX, 12.
 — *Iridis* Lév., 915, XIX, 383.
 — *Junci* Tulasn., 35, XIII, 449.
 — *Kabatianus* Bub., 1403, XXII, 82.
 — *Laburni* Fuck., 1107, XX, 3.
 — *Lespedezae* Peck, 1902, XXVI, 155.
 — — *procumbentis* Lagerh., 1902, XXVI, 155.
 — *lineolatus* Schröt., 910, XIX, 381.
 — *Medicaginis falcatae* Wint., 14, IX, 125.
 — *muscari* Lév., 17, IX, 126.
 — *oblongatus* Fischer, 812, XVIII, 352.
 — *Ononidis* Pass., 1302, XXI, 205.
 — *Ornithogali* f. Wint., 18, IX, 126.
 — *Phaseoli* Wint., 13, IX, 125.
 — *Pisi* 1417, XXII, 85.
 — *proeminens* Lév., 1401, XXII, 81.
 — *Rumicis* Wint., 15, IX, 125.
 — *Salsolae* Reich, 1110, XX, 3.
 — *Scillarum* Lév., 17, IX, 126.
 — *Scirpi* Lagerh., 910, XIX, 381.
 — *Scrophulariae* Berk. et Broome, 10, IX, 125.
 — — Wint., 911, XIX, 382.
 — *scutellatus* Wint., 1102, XX, 2.
 — *striatus* Schröt., 14, IX, 125; 1417, XXII, 85.
 — *Terebinthii* Wint., 1108, XX, 3.
 — *Trifolii* Wint., 1111, XX, 3.
 — *Valerianae* Fuck., 1103, XX, 2.
 — *Verbasci* Niessl, 16, IX, 126; 911, XIX, 382.
Urophycetis bohemica Bub., 701, XVII, 257.
 — *Kriegeriana* P. Magn., 909, XIX, 401.
 — *Rubsaameni* P. Magn., 908, XIX, 401.
Ursinella margaritifera Turp., 534, XV, 201.

- Usnea aspera* Wainio, 1253, XX, 38.
 — *barbata* Wainio, 1051, XIX, 419.
 — — var. *aspera* 1253, XX, 38.
 — — var. *ceratina* 1666, XXIII, 229.
 — — var. *florida* E. Fries, 1051, XIX, 419.
 — — var. *hirta* E. Fries, 1051, XIX, 419.
 — — var. *sorediifera* Arn., 1555, XXII, 115.
 — *ceratina* Ach., 1666, XXIII, 229.
 — *florida* Hoffm., 1051, XIX, 419; 1051 b, XXVI, 178.
 — — var. *hirta* Ach., 1052, XIX, 419.
 — — var. *sorediifera* Arn., 1555, XXII, 115.
 — *hirta* Hoffm., 1052, XIX, 419; 1052 b, XX, 41.
 — *implexa* Hoffm., 1048, XIX, 418.
 — *longissima* Ach., 1254, XX, 38.
 — *milliaria* Tayl., 1253, XX, 38.
 — *trichodea* Ach., 1556, XXII, 115.
Ustilago antherarum Fries, 10, IX, 123.
 — *americana* Speg., 8, IX, 121.
 — *Bistortarum* Schröt., 8, IX, 122.
 — *bosniaca* G. v. Beck, 8, IX, 121; IX, Taf. II, Fig. L
 — *bromivora* Fisch. de Waldh., 1901, XXVI, 155.
 — *Carbo* Tulasne, 9, IX, 122; 901, XIX, 379.
 — — *β. destruens* Tul., 801, XVIII, 349.
 — — var. *vulgaris α. bromivora* Tul., 1901, XXVI, 155.
 — *Caricis* Fuck., 908, XIX, 381.
 — *Cissi* Tul., 11, IX, 123.
 — *destruens* Schlecht., 801, XVIII, 349.
 — — var. *Digitariae* Sacc., 902, XIX, 380.
 — — var. *foliicola* Hausm., 905, XIX, 380.
 — *echinata* Schröt., 1101, XX, 1.
 — *Ischaemi* Fuck., 7, IX, 121.
 — *longissima* Sow., 6, IX, 120; 6b, XXI, 212.
 — *marginalis* Lév., 8, IX, 122.
 — *miliacei* Wint., 801, XVIII, 349.
 — *perennans* Rostr., 901, XIX, 379.
 — *plumbea* Rostr., 1136, XX, 11.
 — *Rabenhorstiana* Kühn., 902, XIX, 379.
 — *segetum* Link, 9, IX, 122; 901, XIX, 379.
 — *Selurine* Rabenh., 902, XIX, 380.
 — *subinclusa* Korn., 1701, XXIV, 269.
 — *urceolatum* Tul., 908, XIX, 381.
 — *verrucosa* Vestergren, 1101, XX, 1.
 — *violacea* Gray, 10, IX, 123.
 — *Welwitschiae* Bres., 837, XVIII, 358.

Valsa Eutypa Nitschke, 1922, XXVI, 160.
 — *fragiformis* Scop., 517, XV, 196.
 — *hypodermia* Fries, 521, XV, 197.
 — *Junesii* Carr., 624, XVI, 68.
 — *Kunzei* Fries, 973, XIX, 397.
 — *nivea* Fries, 719, XVII, 262.
 — *platanoides* Berk., 624, XVI, 68.
 — *punctulata* Auersw., 512, XV, 195.

Valsa turgida Auersw., 512, XV, 195.
 — — Fries, 1431, XXII, 88.
Valvaria exanthemica DC., 446, XV, 182.
Variolaria amara Ach., 257, XII, 91.
 — *corrugata* Bull., 523, XV, 197.
 — *hemisphaerica* Flk., 1039, XIX, 416.
 — *laetea* Pars., 569, XV, 209.
 — *laevigata* Darb., 1038, XIX, 415.
 — *Melogramma* Bull., 1316, XXI, 208.
Vaucheria clavata Heer, 1814, XXV, 234.
 — *dichotoma* Ag., 637, XVI, 75; 637b, XXVI, 168.
 — — Hass., 848, XVIII, 361; 1841, XXV, 234.
 — *geminata* DC., 1014, XIX, 408.
 — — Walz, 1841, XXV, 234.
 — *globifera* de Bary, 637, XVI, 75.
 — *ornithocephala* Ag., 846, XVIII, 361.
 — — Hass., 848, XVIII, 361; 1841, XXV, 234.
 — *orthocarpa* Heer, 1841, XXV, 234.
 — *polysperma* Hass., 846, XVIII, 361.
 — *pyriformis* Kütz., 637, XVI, 75.
 — *racemosa* DC., 847, XVIII, 361.
 — *sericea* Lyngb., 846, XVIII, 361.
 — *sessilis* DC., 848, XVIII, 361.
 — — — var. *repens* Rabenh., 1841, XXV, 234.
 — *Ungeri* Thur., 848, XVIII, 361; 1841, XXV, 234.
Venturia chlorospora Karst., 520, XV, 197.
 — *inaequalis* Wint., 520, XV, 197.
 — *Straussii* Sacc. et Roum., 824, XVIII, 355.
Vermicularia Dematium Fries, 1456, XXII, 93.
 — *gloeosporioides* Penz., 1625, XXIII, 218.
 — *trichella* Fries, 1620, XXIII, 217.
Verpa bohemica Schröt., 951, XIX, 391.
Verrucaria acrotella 1852, XXV, 238.
 — (sect. *Euverrucaria*) *acrotella* Ach., 1641, XXIII, 222.
 — *aeruginella* Nyl., 861, XVIII, 365.
 — *aethiobola* Wahlb., 467, XV, 186.
 — *albissima* Nyl., 1353, XXI, 218.
 — *analepta* Nyl., 1523, XXII, 108.
 — *analeptoides* Nyl., 1354, XXI, 218.
 — *apetala* Krph., 580, XV, 211.
 — *aquatilis* Mudd, 1851, XXV, 237.
 — *biformis* Born., 375, XIII, 466.
 — *brachyspora* Arn., 1852, XXV, 238.
 — *calciseda* Steiner, 446, XV, 182.
 — — var. *purpurascens* Leight., 1643, XXIII, 223.
 — *chlorotica* Hepp, 467, XV, 186.
 — — f. *illenata* Nyl., 180, XI, 98.
 — *cinerea* var. *cartilaginea* Nyl., 1645, XXIII, 223.
 — *coerulea* DC., 1969, XXVI, 174.
 — *conoidea* E. Fries, 376, XIII, 467.
 — — *δ. subsquamea* Gar., 178, XI, 97.

- Verrucaria controversa* β . *nigrescens* Krph., 1352, XXI, 217.
- *daedalea* Stzbgr., 1645, XXIII, 223.
 - *enteroleuca* Sprg., 1359, XXI, 219.
 - *epidermidis* Ach., 1353, XXI, 218.
 - — var. *fallax* Nyl., 268, XII, 93.
 - — var. *platypyrenia* Carr., 1355, XXI, 218.
 - *epiphylla* Nyl., 1524, XXII, 108.
 - *epipolytropa* Cromb., 970, XIX, 396.
 - *fallax* Nyl., 268, XII, 93.
 - *flectigena* Nyl., 469, XV, 187.
 - *fuscoatra* Wallr., 1352, XXI, 218.
 - *Hoffmannii* Hepp, 1643, XXIII, 223.
 - *Hookeri* Borr., 372, XIII, 465.
 - (sect. *Euverrucaria*) *hydrella* Ach., 1642, XXIII, 222.
 - *hydrella* Körb., 467, XV, 186.
 - — β . *aethiobola* Mass., 467, XV, 186.
 - — *vera* Hepp, 467, XV, 186.
 - *hymenogonia* Nyl., 177, XI, 97.
 - *illinata* Nyl., 180, XI, 98.
 - (sect. *Euverrucaria*) *integra* Nyl. var. *obductilis* Nyl., 1351, XXI, 217.
 - *laevata* Körb., 1951, XXVI, 169.
 - *libricola* Nyl., 1357, XXI, 219.
 - *Margacea* 1. *aethiobola* Nyl., 467, XV, 186.
 - — var. *hydrella* Nyl., 1642, XXIII, 222.
 - (sect. *Euverrucaria*) *marmorea* Arn. var. *Hoffmanni* Arn., 1643, XXII, 223.
 - *minima* Mass., 65, IX, 135.
 - *muralis* Leight., 177, XI, 97.
 - *myricae* Nyl., 861, XVIII, 365.
 - (sect. *Lithoidea*) *nigrescens* Pers., 1352, XXI, 217.
 - *nitida* Schrad., 862, XVIII, 366.
 - — var. *minor* Gar., 1854, XXV, 238.
 - — var. *nitidella* Flk., 1854, XXV, 238.
 - *nitidella* Nyl., 1854, XXV, 228.
 - *oxyspora* Nyl., 1353, XXI, 218.
 - *pallida* Nyl., 1522, XXII, 107.
 - *papillosa* Flk., 1852, XXV, 237.
 - — f. *acrotella* Arn., 1641, XXIII, 222.
 - (sect. *Euverrucaria*) *papillosa* var. *thallassina* A. Zahlbr., 1852, XXV, 237.
 - — *pinguicula* Mass., 1761, XXIV, 283.
 - *platypyrenia* Nyl., 1355, XXI, 218.
 - *plumbea* var. *pinguicula* Nyl., 1761, XXIV, 283.
 - *praetermissa* Anzi, 1951, XXVI, 169.
 - *pulchella* Borr., 1855, XXV, 239.
 - *punctiformis* var. *atomaria* Schaer., 468, XV, 186.
 - — var. *ptelaodes* Ach., 444, XV, 180.
 - *purpurascens* Hoffm., 1643, XXIII, 223.
 - — a. *Hoffmanni* Körb., 1643, XXIII, 223.
 - *rhyponia* Ach., 1021, XIX, 411.
 - (sect. *Euverrucaria*) *rupestris* DC. var. *hypophaea* Stnr. et A. Zahlbr., 1521, XXII, 107.

- Verrucaria rupestris* var. *integra* Nyl., 1351, XXI, 217.
- — var. *purpurascens* Schaer., 1643, XXIII, 223.
 - *sepulta* Nyl., 578, XV, 211.
 - *submersa* Hepp, 1642, XXIII, 222.
 - (sect. *Euverrucaria*) *submersa* Hepp, 1762, XXIV, 283.
 - *tephroides* var. *cartilaginea* 1645, XXIII, 223.
 - *thelena* E. Fries, 579, XV, 211.
 - *theleodes* Sommerf., 579, XV, 211.
 - *umbrina* f. *acrotella* Wainio, 1641, XXIII, 222.
 - *velana* A. Zahlbr., 580, XV, 211.
 - Vibrio acerosus* Schrk., 229, XII, 84.
 - Vidalia volubilis* J. Ag., 646, XVI, 78; 646b, XXIII, 222.
 - Volubilaria mediterranea* Lam., 646, XVI, 78.
 - Volutella Buxi* Berk., 1476, XXII, 97.
 - Volvox morum* Müll., 338, XIII, 456.
 - Vuilleminia comadens* 1803, XXV, 224.
 - Webera cruda* Bruch, 1685, XXIII, 233.
 - *elongata* Schwäg., 585, XV, 212; 585b, XXIII, 236.
 - *Halleriana* Hedw., 98, IX, 142.
 - *nutans* Hedw. var. *sphagnetorum* Schimp., 893, XVIII, 374.
 - Weisia calcarea* C. Müll., 486, XV, 190.
 - *crispata* Jur., 1579, XXII, 120.
 - *fugax* Hedw., 887, XVIII, 373.
 - *longipes* Sommerf., 195, XI, 100.
 - *nigrita* Hedw., 676, XVI, 86.
 - *rutilans* Lindb., 394, XIII, 471.
 - *viridula* Hedw., 484, XV, 190.
 - Wilsoniella Jardini* B., 1990, XXVI, 180.
 - Wrangelia penicillata* Ag., 644, XVI, 77.
 - *tenera* Ag., 644, XVI, 77.
 - *verticillata* Kütz., 644, XVI, 77.
 - Xanthidium armatum* Rabenh., 650, XVI, 80.
 - — var. *intermedium* Schröd., 539, XXV, 202.
 - *Brébissonii* Ralfs. var. *basidentatum* 853, XVIII, 363.
 - *furcatum* Ehrenb., 639, XVI, 76.
 - — Ralphe, 650, XVI, 80.
 - Xanthocarpia ochracea* Mass. et de Not., 166, XI, 95.
 - Xanthoria candelaria* Arn. f. *fulva* Arn., 1780, XXIV, 287.
 - — Arn. f. *laceratula* Arn., 669, XVI, 85.
 - (*Candelaria*) *concolor* Th. Fr., 670, XVI, 85.
 - *lychnaea* δ . *pygmaea* f. *fulva* A. Zahlbr., 1780, XXIV, 287.
 - *parietina* Th. Fries, 1050, XIX, 420.
 - — — var. *ectanea* Th. Fr., 1559, XXII, 116.
 - — — var. *imbricata* Beltr., 1979, XXVI, 177.

Xylaria hungarica Hazsl., 135, XI, 88.
 — *longipes* Nitschk., 135, XI, 88.
 — *polymorpha* Grev., 134, XI, 88.
 — — var. *integra* Schulzer, 1433, XXII, 89.
 — *Readeri* F. de Müll., 136, XI, 89.
Xylographa incerta Mass., 1024, XIX, 412.
 — *parallela* E. Fries, 1024, XIX, 412.
 — — f. *elliptica* Nyl., 1025, XIX, 412.
Xyloma acerinum Pers., 207, XII, 79.
 — *betulinum* Fries, 1159, XX, 16.
 — *Campanulae* DC., 1174, XX, 19.
 — *Juglandis* DC., 730, XVII, 264.
 — *Liriodendri* Kunze, 729, XVII, 264.
 — *Onobrychidis* DC., 1458, XXII, 93.
 — *pezioides* Pers., 209, XII, 80.
 — *repandum* Alb. et Schw., 961, XIX, 394.
 — *salicinum* Pers., 208, XII, 79.
 — *Solidaginis* Fries, 920, XIX, 385.
 — *ulmeum* Mart., 1319, XXI, 208.
 — *Virgaureae* DC., 920, XIX, 384.

Zanardinia collaris Crou., 642, XVI, 77.
 — *Prototypus* Nard., 642, XVI, 77.
Zeora cenisia var. *transcendens* Anzi, 51, IX, 132.
 — *sordida* a. *glaucoma* Körb., 1242, XX, 35.
 — *sulphurea* Körb., 1042, XIX, 417.
Zonaria Atomaria Ag., 1510, XXII, 104.

Zonaria collaris Ag., 642, XVI, 77.
 — *Squamaria* Ag., 1516, XXII, 105.
Zonotrichia brunnea Rabenh., 332, XIII, 449.
Zwackhia involuta Körb., 554, XV, 206.
 — *viridis* Poetsch, 554, XV, 206.
Zygnema cruciatum Ag., 79, IX, 138.
 — — Kütz., 1504, XXII, 103.
 — *ericetorum* Hansg., 1744, XXIV, 279.
 — *maximum* Hass., 851, XVIII, 362.
 — *mirabile* Hass., 1842, XXV, 234.
 — *orbiculare* Kütz., 851, XVIII, 362.
 — *quadratum* Hass., 335, XIII, 455.
 — *stagnale* Kütz., 1504, XXII, 103.
 — *stellinum* Ag. var. *stagnale* Kirchn., 1504, XXII, 103.
 — *tenuissima* Hass., 859, XVIII, 364.
 — sp. ster., 428, XV, 177.
 — sp., 238, XII, 87.
Zygodon gracilis Wils., 1382, XXI, 224.
 — *Mougeotii* Bryol. europ., 1084, XIX, 425.
 — *rupestris* Lindb., 1380, XXI, 224; 1382, XXI, 224.
 — — var. *viridissimus* Brown, 1379, XXI, 223.
 — — — var. *dentatus* Breidl., 1381, XXI, 224.
 — — — var. *rupestris* Hartm., 1380, XXI, 224.
Zygogonium ericetorum Kütz., 1744, XXIV, 279.

